

การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำ
ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว



สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

สารนิพนธ์

เรื่อง

การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำ
ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว



ผู้เขียน: สุนันท์

นางสาวพิพนธ์ สุ่มหิรัญ
ผู้วิจัย

ผู้พิมพ์: นันท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรียา มั่นคง,
Ph.D. (Gerontological Nursing)
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก

ผู้พิมพ์: สุวัฒน์

อาจารย์กุสุมา สุวัฒน์สมบัติ,
Ph.D. (Nursing)
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม

ผู้พิมพ์: นพ

ศาสตราจารย์บรรจง นโศภวิริยะ,
พ.บ.
คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้พิมพ์: นพ

รองศาสตราจารย์อรสา พันธุ์ภักดี,
พช.ค.
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สารนิพนธ์

เรื่อง

การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำ
ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

พิพนธ์ สุ่มหิรัญ

นางสาวพิพนธ์ สุ่มหิรัญ
ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงศกา กรีทอง,
พช.ค.

กรรมการสอบสารนิพนธ์

กฤษณา คุณวัฒนศิริ

อาจารย์กฤษณา คุณวัฒนศิริ,
Ph.D. (Nursing)

กรรมการสอบสารนิพนธ์

อาจารย์วรรณภา ประไพพานิช,

Ph.D. (Nursing)

ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์

สุเมธ นันทะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา มั่นคง,
Ph.D. (Gerontological Nursing)

กรรมการสอบสารนิพนธ์

ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ,

ท.บ.

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน,

ท.บ.

คณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจากคณาจารย์หลายท่านและบุคคลอื่นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง และอาจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่สละเวลาให้คำแนะนำ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและให้ความช่วยเหลือต่างๆด้วยความกรุณา รวมทั้งให้กำลังใจนักศึกษามาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วรรณภา ประไพพานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา กรีทอง ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสารนิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำสั่งสอนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลตากสิน คุณนันทวัน จาตุรันตนิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คุณอรสา หจิมรักษา หัวหน้าหน่วยงานคลินิกเบาหวาน และคุณจินตนา ประกองพยาบาลหน่วยงานวิสัญญี ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ศึกษาได้เข้าศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คุณศิริพรรณ ปิติมานะอารี หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการทำสารนิพนธ์ตลอดมา ขอขอบคุณคุณไพลิน มะลิดา และน้องๆ เจ้าหน้าที่พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลตากสิน ที่ได้ให้การช่วยเหลือและเสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่แทนขณะที่ผู้ศึกษาอยู่ในระหว่างการศึกษา และรวมถึงเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท รหัส 50 ที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดมา

สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย เป็นกำลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆ ด้านจนกระทั่งสารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้

รพีพันธุ์ สุ่มศิริณู

การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลว

A LITERATURE REVIEW RELATED TO THE MANAGEMENT FOR REDUCING
READMISSION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

รพีพันธุ์ สุ่มหิรัญ 5036189 RAAN/M

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : สุปรีดา มั่นคง, Ph.D. (GERONTOLOGICAL NURSING),
กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, Ph.D. (NURSING)

บทคัดย่อ

การกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นปัญหาสำคัญ ส่งผล
กระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสะท้อนถึงคุณภาพการดูแลรักษา
ของโรงพยาบาล การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็น
เรื่องสำคัญที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษา
ซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2534-2551 เป็นงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง จัดอยู่ในระดับ A จำนวน 23 เรื่อง ระดับ B
จำนวน 13 เรื่อง และระดับ C จำนวน 2 เรื่อง

ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบของการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแล
ตนเอง การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลโดยทีมสุขภาพ ผลการศึกษานี้ ทำให้ได้องค์ความรู้ที่สำคัญที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลว และนำไปใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: ภาวะหัวใจล้มเหลว/การกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล/การจัดการ

198 หน้า

A LITERATURE REVIEW RELATED TO THE MANAGEMENT FOR REDUCING
READMISSION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

RAPEEPUN SOOMHIRUN 5036189 RAAN/M

M.N.S. (ADULT NURSING)

THEMATIC PAPER ADVISORY COMMITTEE: SUPREEDA MONKONG, Ph.D.
(GERONTOLOGICAL NURSING), KUSUMA KHUWAWATANASAMRIT, Ph.D.
(NURSING)

ABSTRACT

Readmission in patients with heart failure is an important problem affecting patients physically, mentally, emotionally, socially, and economically, as well as reflecting the hospital's quality of healthcare. Reducing readmission in patients with heart failure is an essential matter contributing to better quality of patients' life and nursing quality improvement. The objective of this study was to collect and analyze research studies related to reducing readmission in patients with heart failure, in order to acquire knowledge for developing nursing practices. The explored data was from the period of 1990-2008. There were a total of 38 research studies consisting of 23 studies in level A, 13 studies in level B, and 2 studies in level C.

The results of this study revealed that reducing readmission in patients with heart failure mostly consisted of 3 components, namely: 1) self-care: supportive educational intervention, 2) continuing care, and 3) healthcare team approach intervention. The results led to significantly better knowledge for nursing practices development for reducing readmission in patients with heart failure, and for providing healthcare for patients with heart failure in the future.

KEY WORDS: HEART FAILURE/READMISSION/MANAGEMENT

198 pages

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	
ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
ขอบเขตของการทบทวนองค์ความรู้	4
นิยามศัพท์	4
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม	
ภาวะหัวใจล้มเหลว	6
การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล	22
ผลกระทบของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล	27
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล	30
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	35
บทที่ 4 ผลการศึกษา	113
บทที่ 5 การอภิปรายผล	137
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	150
บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาไทย	156

สารบัญ (ต่อ)

บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ

รายการอ้างอิง

ประวัติผู้วิจัย

หน้า

172

187

198



สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษาจากฐานข้อมูล คำสำคัญ และช่วงเวลาที่ตีพิมพ์	37
2 จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากการสืบค้นในแหล่งต่างๆ	41
3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	43
4 แสดงเนื้อหาของการให้ความรู้	116
5 แสดงเนื้อหาของการให้ความรู้และฝึกทักษะ	117
6 แสดงองค์ประกอบของการให้ความรู้ และการฝึกทักษะในการดูแลตนเอง	118
7 แสดงวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล	123
8 แสดงวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล	127
9 แสดงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในทีมสุขภาพ	134

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure: CHF) เป็นโรคหัวใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 2005 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว 1,084,000 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่ในผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี ถึง 660,000 คน (American Heart Association, 2008) ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทั้งการมาที่ห้องฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล (Stull, Starling, Haas, & Young, 1999) การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้งผู้ป่วยจะอยู่โรงพยาบาลนาน 7-10 วัน ซึ่งค่ารักษาแต่ละครั้งมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ (Stull et al., 1999) การประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งทางตรงและทางอ้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 เป็นจำนวนเงินสูงถึง 34.8 พันล้านดอลลาร์ (American Heart Association, 2008) นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนการกลับเข้ามารักษากลับในโรงพยาบาลเฉลี่ยคนละ 2.5 ครั้ง (Chin & Goldman, 1997) สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวในประเทศไทยไม่มีใครทราบถึงอุบัติการณ์หรือการระบาดในคนไทย (ปิยะมิตรศรีธรา ก., 2549) แต่ภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังคงพบว่ามีอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ ในปี พ.ศ. 2547, 2548, และ 2549 มีอัตรา 503.1, 530.7, และ 618.5 ตามลำดับ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2550) และจากสถิติผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลตากสินระหว่างปี 2548-2550 รับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวไว้รักษาในโรงพยาบาลเป็นอันดับที่ 1 เช่นกัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือ จาก 143 เป็น 251 คน ต่อปี โดยมีวันนอนเฉลี่ย 7-9 วัน

ในระยะ 30 ปี ที่ผ่านมามีการพัฒนาความรู้และการรักษาใหม่ๆ ที่ทำให้การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวได้ผลดีขึ้นอย่างมาก อาการของผู้ป่วยดีขึ้น และอัตราการตายลดลง แต่ในช่วงที่ผ่านมาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการปานกลางและรุนแรง คือ มีความรุนแรงระดับ 3 และความรุนแรงระดับ 4 (functional class III-IV) ยังมีอัตราการตายเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 15 ในแต่ละปี และต้องเข้า

รับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลถึงร้อยละ 10 ในระยะเวลา 1 เดือน (เกียรติชัย ภูมิปัญญา และคุณหญิง เกษม โชตินัยวัตรกุล, 2549) โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป (อุฟาร์ วงศ์แก้ว และสุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล, 2542; Dykes et al., 2005; Madigan, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเขาวภา บุญเที่ยง, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, และอักรอนงค์ ปราโมช (2546) ซึ่งพบว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ และมีความสัมพันธ์กับอัตราการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลซ้ำที่สูงที่สุด คืออยู่ในช่วง 2-30 ครั้ง

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มักพบในระยะสุดท้ายของโรคหัวใจทุกชนิดและเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ มีการดำเนินโรคที่ไม่แน่นอนว่าจะดีขึ้น คงที่ หรือเลวลง และเนื่องจากพยาธิสภาพที่รุนแรงและเรื้อรังทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการอ่อนล้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากอาการกำเริบ เช่น อาการเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ภาวะปอดบวม น้ำ แขนขาบวม อ่อนเพลีย เมื่อยาล้า ความทนต่อการทำกิจกรรมลดลง (Hunt et al., 2001) ทำให้ต้องกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ซึ่งการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนครอบครัวและประเทศชาติ (เขาวภา บุญเที่ยง, 2545)

การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาล นอกจากการให้ยารักษาแล้วควรมีการดำเนินการจัดทำคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure clinic) (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ แนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เข้าใจเรื่องการจำกัดปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารชนิดต่างๆ การชั่งน้ำหนักตัวอย่างสม่ำเสมอ การประเมินภาวะน้ำเกินในร่างกาย รวมถึงการปรับขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ การสนับสนุนจากสังคมและครอบครัว เพื่อดำรงไว้ซึ่งชีวิตและป้องกันการกำเริบซ้ำของโรค ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ลดอัตราการตาย ลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาล ลดปัญหาเรื่องการครองเตียงในโรงพยาบาล ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าคุ้มทุนในการรักษาพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ลดอัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549; รัสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์, 2546; Harrington, 2008; Hunt et al., 2005; Varughese, 2007)

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้มีการกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเอง เช่น การไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการรับประทานยา การไม่ไปพบแพทย์ตามนัด และขาดการมาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ (जर เพียสุพรรณ, 2545; Vinson, Rich, Sperry, Shan, & McNara, 1990) ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว เช่น ขาดการยอมรับและเห็นคุณค่า สอดคล้องกับการศึกษาของ

เขาวภา บุญเที่ยง และคณะ (2546) ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 90 ราย พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ทางลบกับการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพและการรักษา เช่น การไม่ส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจระหว่างเข้ารับการรักษ การต้องใช้ยา รักษาหลายชนิด การขาดประสิทธิภาพในระบบการจำหน่ายผู้ป่วยและการส่งต่อ (Hamner & Ellison, 2005)

การลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและบ่งชี้ถึงคุณภาพการพยาบาล ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลของสำนักงานพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2547) กล่าวว่า การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล หมายถึง การรับผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยในซ้ำด้วยโรคหรืออาการเดิมภายใน 28 วัน หลังจำหน่ายโดยไม่ได้รับการนัดหมาย โครงการเครื่องชี้วัดคุณภาพนานาชาติ (International Quality Indicator Project: IQIP) ได้แนะนำการบันทึกตัวชี้วัดการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 15 วัน และ 31 วัน ซึ่งการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 15 วัน สะท้อนถึงคุณภาพการดูแลของโรงพยาบาล ขณะที่การกลับเข้ามานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 31 วัน สะท้อนถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549) การประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาพรวม ได้แก่ การประเมินปัญหาการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลรวมทั้งการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ซึ่งการดูแลผู้ป่วยในควรมีความสมบูรณ์ในลักษณะองค์รวม การที่ผู้ป่วยต้องกลับมารักษาเป็นผู้ป่วยในอีกโดยไม่ได้นัดไว้ก่อนสะท้อนถึงความไม่สมบูรณ์ของการดูแลรักษาในครั้งก่อน หรือการไม่ร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย ซึ่งบางปัจจัยอยู่ในความควบคุมของโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากคุณภาพการบริการ และบางปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้ (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549)

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการดูแลผู้ป่วยควรทำตามแนวปฏิบัติที่มีหลักฐาน (evidence-base practice) และมีงานวิจัยที่มีคุณภาพมาอ้างอิง ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีความสามารถในการใช้ผลงานวิจัยที่มีความเจาะจงกับกลุ่มผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวรู้จักดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซ้ำ อันจะนำมาสู่การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ถึงแม้ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว รวมทั้งศึกษาวิจัยถึงวิธีการต่างๆ เพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ให้กลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อป้องกันการกลับเข้ามารักษาซ้ำใน

โรงพยาบาล ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทำการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาล และนำไปใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพของตนเองและสามารถอยู่ที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และนำไปใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ขอบเขตของการทบทวนองค์ความรู้

การทบทวนองค์ความรู้ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเลือกงานวิจัยที่ศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 1990-2008

นิยามศัพท์

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) หมายถึง กลุ่มอาการทางคลินิกที่ซับซ้อน เกิดจากหัวใจที่มีความผิดปกติทั้งโครงสร้างและการทำหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถสูบฉีดโลหิตให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกาย เมื่ออวัยวะต่างๆ ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ มีผลต่อเนื่องให้เกิดการกั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย ทั้งในปอดและระบบไหลเวียนโลหิต อาการและอาการแสดงของโรค คือ อาการเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ภาวะปอดบวม น้ำ แขนขาบวม อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ความทนต่อการทำกิจกรรมลดลง

การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง การที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้มาได้รับการรักษาซ้ำทั้งการมารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบซ้ำของภาวะหัวใจล้มเหลว หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ได้นัดหมาย

การจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง การปฏิบัติการที่นำมาใช้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล



บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. ภาวะหัวใจล้มเหลว
2. การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล
3. ผลกระทบของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ล้มเหลว

1. ภาวะหัวใจล้มเหลว

ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลภาวะหัวใจล้มเหลวที่ประกอบด้วย ความหมาย การแบ่งระยะ และการจำแนกระดับความรุนแรง ชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งซีกซ้ายและซีกขวารวมถึงอาการและอาการแสดง สาเหตุการเกิด การรักษา และการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนี้

ความหมายของภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) หมายถึง กลุ่มอาการทางคลินิกที่ซับซ้อน เกิดจากหัวใจที่มีความผิดปกติทั้งโครงสร้างและการทำหน้าที่ (Hunt et al., 2005; Wingate, 2007) ทำให้ไม่สามารถสูบฉีดโลหิตให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกาย เมื่ออวัยวะต่างๆ ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ หลายอย่าง เช่น การกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้ระดับของพลาสมาแคเทคโกลามีนส์ (plasma catecholamines) สูงขึ้น เกิดการหดตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vasoconstriction) จึงทำให้ความดันของหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral resistance) มากขึ้น มีการเพิ่มของสารต่างๆ ในระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน-อัลโดสเตอโรน (rennin-angiotensin-aldosterone) และการเพิ่มขึ้นของระดับแองจิโอเทนซิน II (angiotensin II) วาโซเพรสซิน (vasopressin) และอัลโดสเตอโรน (aldosterone) ในพลาสมา มีผลต่อเนื่องให้เกิดการกั่งของน้ำและเกลือในร่างกายทั้งในปอดและระบบไหลเวียนโลหิต (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549: 152)

การแบ่งระยะของภาวะหัวใจล้มเหลวตามการดำเนินของโรค

การแบ่งระยะของภาวะหัวใจล้มเหลวตามการดำเนินของโรค (stages of heart failure) แบ่งเป็น 4 ระยะ (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546; Hunt et al., 2001, 2005) ได้แก่

Stage A ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว แต่ยังไม่มี ความผิดปกติของโครงสร้างของหัวใจ ไม่มีอาการและอาการแสดงของหัวใจล้มเหลว ไม่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้ต่อไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโคโรนารี เป็นต้น

Stage B ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโครงสร้างของหัวใจที่ตรวจพบได้ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดงของหัวใจล้มเหลว

Stage C มีความผิดปกติของโครงสร้างหรือการทำงานของหัวใจที่ตรวจพบได้ และผู้ป่วยมีอาการและ/หรือเคยมีอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

Stage D ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของหัวใจล้มเหลวอย่างชัดเจน เป็นภาวะสุดท้ายของหัวใจล้มเหลวซึ่งต้องการการรักษาแบบเจาะจงเป็นพิเศษ เช่น การรักษาทางยาหรือเครื่องมือช่วยเหลืออื่นๆ รอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบ้านพักรับรองเฉพาะกิจ (hospice care)

การศึกษาการพยากรณ์โรคที่มีนัยสำคัญต่ออัตราการเสียชีวิตของแอมมาและคณะ (Ammar et al., 2007) ศึกษากลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 2,029 ราย พบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจะมีความสัมพันธ์กับระยะของภาวะหัวใจล้มเหลวตามการดำเนินของโรค (stages of heart failure) ที่เพิ่มขึ้น และอัตราการรอดชีวิตภายใน 5 ปีของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีระยะของโรคใน stage A stage B stage C และ stage D คือ ร้อยละ 97, 96, 75 และ 20 ตามลำดับ และร้อยละ 25 เสียชีวิตโดยไม่มีอาการเลวลงซึ่งหมายถึงผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน

การจำแนกระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว

ในปี 1964 The New York Heart Association: NYHA (as cite in Hunt et al., 2001, 2005) ได้แบ่งระดับความรุนแรงโดยพิจารณาจากระดับของกิจกรรมที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ (functional class) และอาการที่ปรากฏดังนี้

Class I ไม่มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร การขับถ่าย รวมถึงการเดินการขึ้นบันได การออกกำลังกาย สามารถมีกิจกรรมได้ตามปกติ โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย ใจเต้น ใจสั่น หายใจลำบาก หรือเจ็บหน้าอก

Class II มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายเมื่อได้พัก แต่ถ้ามีกิจกรรมตามปกติ จะทำให้อ่อนเพลีย ใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก หรือเจ็บหน้าอกเล็กน้อย

Class III มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน คือ มีกิจกรรมซึ่งน้อยกว่ากิจกรรมปกติ เช่น อาบน้ำ อ่อนเพลีย ใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก หรือเจ็บหน้าอก แต่จะสบายเมื่อได้พัก

Class IV ไม่สามารถมีกิจกรรมต่างๆ ได้เลย เนื่องจากความไม่สบาย แม้ในขณะที่พักยังมีอาการของการทำงานของหัวใจไม่เพียงพอ หรือมีอาการเจ็บหน้าอก แม้ว่าจะกระทำกิจกรรมเล็กน้อยๆ อาการไม่สบายหอบเหนื่อยจะเพิ่มขึ้น

ชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว

ในปัจจุบันนิยมแบ่งประเภทของภาวะหัวใจล้มเหลวออกเป็น 2 ประเภท (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550; ไพศาล ลิละชัยกุล, 2550; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) เนื่องจากสามารถแยกอาการและอาการแสดงทางคลินิกได้ค่อนข้างชัดเจนและยังสามารถอธิบายพยาธิสรีรวิทยาได้ตรงกับอาการและอาการแสดงทางคลินิก

ภาวะหัวใจซีกซ้ายล้มเหลว (left sided heart failure) สาเหตุมักเกิดจากพยาธิสภาพบริเวณตำแหน่งหัวใจห้องล่างซ้าย โดยหัวใจห้องล่างซ้ายจะออกแรงดันในการบีบเลือดออกจากหัวใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ปริมาณเลือดพอเพียงกับความต้องการของเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย หลังจากที่ใช้กลไกชดเชยมานานช่วงเวลาหนึ่ง หัวใจจะไม่สามารถชดเชยให้ทำงานได้ตามปกติ เลือดจะสะสมอยู่ในหัวใจห้องล่างซ้ายมากขึ้นแล้วไหลย้อนกลับสู่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านไปยังปอดและเส้นเลือดฝอยที่ปอดทำให้ความดันสูงขึ้น ดันโซเดียมและน้ำออกสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ทำให้เกิดน้ำคั่งในปอดมากขึ้นรบกวนกลไกควบคุมการหายใจจนทำให้การหายใจผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการและอาการแสดงที่สำคัญของภาวะหัวใจซีกซ้ายล้มเหลว ดังนี้

1. อาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก (dyspnea) เป็นอาการที่พบบ่อย และมักเป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546) หรือกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาล (Parashall et al., 2001) อาการหอบเหนื่อยเกิดขึ้นเนื่องจาก เกิดการคั่งของเลือดและปอดบวม น้ำ ในระยะแรกของภาวะหัวใจล้มเหลว (function class I) อาการหอบเหนื่อยอาจจะเป็นขณะออกแรงหรือออกกำลังกาย (dyspnea on exertion) ส่วนในระยะท้าย (function class IV) จะพบอาการหอบเหนื่อยได้ถึงร้อยละ 60 (Wingate, 2007) และจะรุนแรงขึ้นจนผู้ป่วยอาจนอนราบไม่ได้เลย ต้องนอนหลับในท่านั่ง (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวยังพบอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากได้อีก ได้แก่ อาการหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกเมื่อนอนราบ (orthopnea) แสดงถึงพยาธิสภาพของภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีความรุนแรงมากขึ้น (ผ่อง

พรรณ อรุณแสง, 2550) และอาการหอบเหนื่อยเป็นพักๆช่วงกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาหายใจหลังจากนอนหลับไปแล้ว (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea: PND) เนื่องจากหายใจไม่ออกอย่างรุนแรง อาการจะหายไปเมื่อลุกนั่งภายใน 30 นาที (พ่องพรรณ อรุณแสง, 2550)

2. อาการไอ ที่พบร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากการถูกกระตุ้นโดยรีเฟล็กซ์จากการมีน้ำคั่งในปอดและหลอดลม ในระยะแรกผู้ป่วยจะไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ ในรายที่มีน้ำท่วมปอดผู้ป่วยจะไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพูหรืออาจพบว่าผู้ป่วยไอเป็นเลือด หากมีการรบกวนของหลอดเลือดแดงภายในปอด อาการไอในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายนี้อาจจะแสดงถึงการเกิด pulmonary emboli ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสเกิดได้ง่าย (พิกุล บุญช่วง, 2541; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545)

3. อาการทางสมอง เช่น อาการสับสน ความจำเสื่อม หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ นอนไม่หลับ และอาการหายใจเร็วสลับช้าหรือหยุดหายใจเป็นระยะ (cheyne strokes respiration) เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันของออกซิเจนและการรับอนไดออกไซด์ในเลือดเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ และเกิดการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ (สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) ซึ่งอาการหายใจเร็วสลับช้าหรือหยุดหายใจเป็นระยะ (cheyne strokes respiration) มักเกิดในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีโรคหัวใจหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองตีบร่วมด้วย (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546) รวมถึงผู้ป่วยสูงอายุที่มีหัวใจเวทริกิลซ้ายล้มเหลว โดยเฉพาะเมื่อได้รับยานอนหลับ (สมจิต หนูเจริญกุล, 2545)

4. อ่อนเพลีย อ่อนล้า และกล้ามเนื้อเปลี่ยนอ่อนแรง (fatigue, weakness) มักจะเกี่ยวข้องกับหัวใจเวทริกิลซ้ายล้มเหลว (สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) เนื่องจากเลือดถูกบีบออกจากหัวใจน้อยลงไม่สามารถไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนและการขนถ่ายของเสียจากการเผาผลาญออกจากร่างกายได้ช้า จึงทำให้ผู้ป่วยอ่อนเพลียได้ง่าย (สมจิต หนูเจริญกุล, 2545; Hunt et al., 2001) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจชักนำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้าได้อีก เช่น การนอนไม่หลับและการพักผ่อนไม่เพียงพอ จากความเครียดความวิตกกังวล (รสสุคนธ์ วาริตสกุล, 2547) และผลจากการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะซึ่งนอกจากจะมีผลทำให้ร่างกายต้องสูญเสียโซเดียมและโปตัสเซียมแล้วยังทำให้ถ่ายปัสสาวะบ่อยได้ (Bennett, Codes, Westmoreland, Castro, & Donnelly, 2000)

5. อาการทางระบบปัสสาวะ อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะหัวใจล้มเหลว เนื่องจากในเวลากลางวันผู้ป่วยจะอยู่ในท่านั่งหรือยืนเป็นส่วนใหญ่ เลือดไปที่ไตน้อย การสร้างปัสสาวะจึงน้อยตาม แต่ในเวลากลางคืน ผู้ป่วยได้นอนพักผ่อนและเลือดไปที่ไตมากขึ้น การสร้างปัสสาวะจึงเพิ่มขึ้น (พ่องพรรณ อรุณแสง, 2550)

ภาวะหัวใจซีกขวาล้มเหลว (right sided heart failure) มักเกิดตามหลังภาวะหัวใจซีกซ้ายล้มเหลว ส่วนหัวใจซีกขวาล้มเหลวนั้นพบได้น้อยซึ่งพบได้ในโรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิดีบ หรือปิดไม่สนิท โรคของปอดและหลอดเลือดเมื่อความต้านทานของหัวใจซีกขวาเพิ่มขึ้น ทำให้ความดันในหลอดเลือดดำทั่วร่างกายสูงขึ้นด้วย เป็นผลให้ความดันเลือดในตับและม้ามมีมากขึ้น (สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) จึงส่งผลให้เกิดอาการและอาการแสดงที่สำคัญของภาวะหัวใจซีกขวาล้มเหลว ดังนี้

1. อาการบวม (edema) ในลักษณะการ “กดบุ๋ม” หรือ pitting edema เป็นอาการแสดงเริ่มแรกของภาวะหัวใจซีกขวาล้มเหลว (ไพศาล สิละชัยกุล, 2550) ในระยะแรกอาจมองเห็นไม่ชัดแต่จะทราบโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักตัว โดยทั่วไปอาการบวมจะเกิดในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีของเหลวเกินทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2-4 กิโลกรัม (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546) และเมื่อภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มความรุนแรงขึ้นจะสังเกตเห็นอาการบวมชัดเจน บางรายอาจบวมทั้งตัว รวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ หน้าอก แขน ใบหน้า และมักจะเกิดอาการท้องมานในรายที่ลิ้นไตรคัสปิดีบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและมีการหดตัว (สมจิต หนูเจริญกุล, 2545)

2. หลอดเลือดดำที่คอโป่งพอง (jugular vein distention) เนื่องจากเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนไม่สามารถไหลเข้าได้สะดวก ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของความดันหลอดเลือดดำที่คอ (ปิยะมิตร ศรีธรา ข., 2549)

3. ตับม้ามโต และกดเจ็บจากการที่เลือดไม่สามารถไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ ทำให้เลือดคั่งตามอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะเลือดจะคั่งอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ของตับมากทำให้เยื่อหุ้มตับยืดขยายออก ผู้ป่วยจึงมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง หรือเจ็บบริเวณชายโครงขวา (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545)

4. อาการทางระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากการคั่งของเลือดในทางเดินอาหารจะทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้และท้องอืด (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550)

นอกจากอาการและอาการแสดงเฉพาะที่เกิดในภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ละข้างดังกล่าวแล้ว อาจมีอาการและอาการแสดงอื่นๆร่วมด้วย (ขจร เพ็ญสุพรรณ, 2545) เช่น เหงื่อออกมากผิดปกติ (diaphoresis) อาการเย็นตามปลายมือปลายเท้าหรืออาการเขียวคล้ำ (cyanosis) ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (cardiac arrhythmia) อาการผอมแห้งขาดอาหาร (cardiac cachexia) ซึ่งพบได้ในระยะท้ายของภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นผลจากการมีเมตาบอลิซึมสูง ลำไส้สูญเสียโปรตีนและเบื่ออาหาร ภาวะจิตสับสนที่แย่ลงเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่และความเครียดจากการที่ต้องจำกัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่ตนเองต้องการได้

สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว

สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมีความสำคัญต่อการรักษาพยาบาล และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย (ขจร เพ็ญสุพรรณ, 2545) ซึ่งการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดได้จากหลายสาเหตุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สาเหตุพื้นฐานและสาเหตุชักนำ (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545; Fonarow et al., 2008) ดังนี้

1. สาเหตุพื้นฐาน (underlying cause) อาจจะเริ่มต้นจากความผิดปกติของหัวใจข้างใดข้างหนึ่ง แล้วจึงเหนี่ยวนำให้เกิดหัวใจล้มเหลวทั้ง 2 ข้าง อาจเป็นมาแต่กำเนิดและเกิดภายหลังก็ได้ (ไพศาล ลีละชัยกุล, 2550) สาเหตุเหล่านี้ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) เป็นสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมากที่สุดถึงร้อยละ 80 และพบ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยที่มีหัวใจห้องล่างซ้ายทำหน้าที่ผิดปกติ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550; Hunt et al., 2001) เนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีแรงบีบตัวลดลง หรือโรคที่ไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจแต่เป็นสาเหตุทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจ การได้รับสารพิษกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจโดยไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic dilated cardiomyopathy) ซึ่งโรคเหล่านี้จะทำให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง (ไพศาล ลีละชัยกุล, 2550; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545; Hunt et al., 2001)

2. สาเหตุชักนำ (precipitating cause) นอกจากสาเหตุพื้นฐานดังกล่าวแล้ว ผู้ป่วยอาจมีชีวิตอยู่ได้นานโดยไม่ปรากฏอาการ แต่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงขึ้นหากมีสาเหตุชักนำที่ทำให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลว ได้แก่

2.1 ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (arrhythmia) พบได้ในโรคหัวใจชนิดต่างๆ มากมาย เช่น โรคหัวใจรูมาติก โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจเนื่องจากคอกอหอยพอกเป็นพิษ (ไพศาล ลีละชัยกุล, 2550) ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติในรูปแบบต่างๆ เป็นผลให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง ซึ่งถ้ารุนแรงจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตกระทันหัน การเกิดก้อนอุดตันภายในหลอดเลือดแดงของปอด (pulmonary embolism) จะทำให้มีการเพิ่มความดันในหลอดเลือดแดงของปอดอย่างเฉียบพลัน ทำให้หัวใจห้องล่างขวามีเลือดคั่งและขยายใหญ่ขึ้น เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมากขึ้น

2.2 การติดเชื้อเกือบทุกชนิดจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546) เนื่องจากการติดเชื้อทำให้ผู้ป่วยมีไข้ หัวใจเต้นเร็ว การเผาผลาญในร่างกายสูงขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของคนที่เป็นโรคหัวใจต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น จากการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีระดับความรุนแรงของโรคสูงและปานกลาง พบว่า อาการกำเริบซ้ำร้อยละ 23

เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ ซึ่ง 1 ใน 3 ของการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อที่ปอด (Opasich et al., 1996) และ ร้อยละ 12 ของการมาโรงพยาบาลในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีสาเหตุจากการติดเชื้อที่ปอด (Ghali, Kadakia, Cooper, & Ferlinz, 1988)

2.3 ภาวะโลหิตจางเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ เนื่องจากมีจำนวนเม็ดเลือดแดงลดลงความสามารถในการขนส่งออกซิเจนไปสู่เซลล์เนื้อเยื่อหัวใจต้องทำงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณเลือดและเพิ่มออกซิเจนในเซลล์และเนื้อเยื่อ

2.4 สาเหตุจากต่อมธัยรอยด์เป็นพิษและการตั้งครรภ์ ทั้ง 2 ภาวะนี้ทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นหัวใจจึงต้องทำงานหนักมากขึ้น จนไม่สามารถรับภาระหนักต่อไปได้ เกิดหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุด

2.5 การปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม (inappropriate reduction of therapy) เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546) ทำให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดอาการมากขึ้น ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น ได้รับเกลือมากเกินไปและภาวะไม่สมดุลของระดับโซเดียมและโปแตสเซียมในซีรัม การออกกำลังกายมากเกินไป สภาพอารมณ์ที่ผิดปกติ เช่น เครียด ดีใจ เสียใจ การลดขนาดหรือหยุดรับประทานยาเอง และสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศที่ร้อนและชื้นเกินไป เป็นต้น

นอกจากนี้สาเหตุชักนำอาจเกิดจากการรักษาพยาบาลได้ เช่น การได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำมากเกินไปจะทำให้เกิดการสะสมปริมาณของน้ำในร่างกาย และมีการไหลเวียนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำถ้าคำนวณผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ปริมาณของสารน้ำที่เข้าไปมีมากเกินไปหัวใจจะรับภาระไม่ไหวจนหัวใจล้มเหลวได้ (ไพศาล ลีละชัยกุล, 2550)

จากการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวของโพนารอว์ และคณะ (Fonarow et al., 2008) ในระหว่างปี ค.ศ. 2003-2004 ศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 48,612 ราย จาก 259 โรงพยาบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว มีทั้งสาเหตุพื้นฐานและสาเหตุชักนำ ดังนี้ สาเหตุพื้นฐานที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ภาวะหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 22.9 สาเหตุที่พบบรองลงมา คือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 15.9 ส่วนสาเหตุชักนำที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ (pneumonia/respiratory process) ร้อยละ 15.3 สาเหตุที่พบบรองลงมา คือ ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (arrhythmia) ร้อยละ 13.5 และการไม่ปฏิบัติตามการรักษาในเรื่องของอาหารและการรับประทานยา ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 5.2 ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยร้อยละ 61.3 มีสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าหนึ่งสาเหตุ

ดังนั้น การรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรค้นหาสาเหตุทั้งสาเหตุพื้นฐานและสาเหตุชักนำที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้น เพื่อนำไปวางแผนในการป้องกันและให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า หลักในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว คือ กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งสาเหตุพื้นฐานและสาเหตุชักนำ (ประสาธน์ เหล่าถาวร ชาญ ศรีรัตนสถาวร ชนรัตน์ ชุนงาม และขจรขาวไพศาล, 2541; ปิยะมิตร ศรีธรา ข., 2549; Hunt et al., 2001) ลดการทำงานของหัวใจ (ปิยะมิตร ศรีธรา ข., 2549; ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550; สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) เพิ่มความสามารถในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ (ปิยะมิตร ศรีธรา ข., 2549; ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545; Hunt et al., 2001) ลดจำนวนน้ำและเกลือที่มากเกินไปในร่างกาย (Hunt et al., 2001) และลดแรงต้านของหัวใจ (สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว การรักษาสาเหตุพื้นฐานและสาเหตุชักนำ เช่น ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในกรณีหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน จะได้รับการรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และในกรณีลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วจะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือแก้ไขความพิการของลิ้นหัวใจ หรือการรักษาสาเหตุชักนำที่ให้อาการผู้ป่วยเลวลง เช่น ภาวะติดเชื้อ ภาวะช็อค และภาวะเครียด เป็นต้น

2. การลดการทำงานของหัวใจ (decrease cardiac workload) โดยให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อรักษาพลังงานของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยนอนพักในท่ายกศีรษะสูง 45 องศา การให้ออกซิเจนอย่างเพียงพอและลดการใช้ออกซิเจนของร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพร่างกายโดยการให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ ปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ได้แก่ การทำกิจกรรมต่างๆ การใช้สารเสพติด การรับประทานยา การขับถ่าย การป้องกันการติดเชื้อ และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

3. เพิ่มความสามารถในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจโดยใช้ยาเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ เช่น ยาโดบูตามีน (dobutamine) โดปามีน (dopamine) อีพิเนฟริน (epinephrine) และไอโซโพรเทอรินอล (isoproterenol) เป็นต้น ซึ่งต้องผสมในสารน้ำและหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ การผสมยาจะผสมในน้ำเกลือ 0.9% หรือ 5 เปอร์เซ็นต์เดกซ์โตรสในน้ำ ห้ามผสมในสารละลายอัลคาไลน์ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550) สำหรับยาที่มีชื่ออยู่เพียงตัวเดียว คือ ไดจอกซิน (digoxin) ซึ่งเป็นยา

จิตาลิส (digitalis) ตัวหนึ่ง ยาจิตาลิสจะช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีฤทธิ์ของยาจิตาลิสที่เพิ่มการบีบตัวของหัวใจ เกิดจากการยับยั้งโซเดียม-โปแตสเซียม อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Na-K ATPase activity) ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวได้แรงขึ้น ดังนั้นปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีจึงเพิ่มขึ้น ระดับยาจิตาลิสเพื่อการรักษาและระดับเป็นพิษค่อนข้างจะใกล้เคียงกันจึงควรประเมินอาการพิษจากยาอยู่เสมอ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550) และการให้ยาจิตาลิสควรให้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยเพศหญิง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยไตเสื่อม และผู้ป่วยที่มีโปแตสเซียมต่ำ (ประสาท เหล่าถาวร และคณะ, 2541; อุพาร วงศ์แก้ว และสุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล, 2542) เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ digitalis intoxication ความไวของกล้ามเนื้อหัวใจจะเพิ่มขึ้น

4. ลดจำนวนน้ำและเกลือที่มากเกินไปในร่างกาย (negative fluid balance) การดื่มน้ำและเกลือที่ทิ้งออกจากร่างกายโดยการให้ยาขับปัสสาวะและจำกัดน้ำดื่ม จำกัดเกลือที่รับประทาน เพื่อให้อาการบวมยุบลงและน้ำหนักลดลง ยาที่ใช้ได้ผลดี คือ ยาขับปัสสาวะจะลดจำนวนการคั่งของเลือดและน้ำในระบบไหลเวียนของร่างกาย ผลข้างเคียงของยาขับปัสสาวะจะทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย แขนขาอ่อนแรง เป็นตะคริว และผลข้างเคียงของยาขับปัสสาวะยังพบว่า ทำให้เกิดอาการความดันโลหิตต่ำในขณะยืน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ท้องผูกและปัสสาวะออกมาก

5. ลดแรงต้านของหัวใจโดยใช้ยายขยายหลอดเลือด (vasodilator) อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ ยาที่ขยายหลอดเลือดดำเพื่อลด preload ทำให้ลดการคั่งของเลือดในปอดและในหัวใจ ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีขึ้น ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ ไนเตรท (nitrates) หรือ มอร์ฟีน (morphine) กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ขยายหลอดเลือดแดง ทำให้แรงต้านทานส่วนปลายลดลง เป็นการลด afterload ทำให้หัวใจบีบตัวได้ง่ายขึ้น ส่งผลทำให้ cardiac output เพิ่มขึ้น ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ ไนโตรพรัสไซด์ (nitroprusside) ไนเตรท ในขนาดสูง และไฮดราลาซีน (hydralazine) เป็นต้น

ยาหลายกลุ่มมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงรวมกัน จึงใช้ได้ผลดีในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ยาที่นิยมใช้ ได้แก่ โซเดียมไนโตรพรัสไซด์ (sodium nitroprusside) เอซีอีอินฮิบิเตอร์ (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor: ACEI) จากการศึกษาของฮอยท์และโบวลิง (Hoyt & Bowling, 2001) พบว่าการนำยากลับ Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ระดับความรุนแรงของโรคในระดับ 3 และระดับ 4 สามารถลดอัตราการตายและลดการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลได้ และเป็นที่ยอมรับว่ายาในกลุ่ม ACEI ใช้รักษาได้ผลดีในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีหัวใจล่างซ้ายเสียหายที่ (left ventricular dysfunction)

การรักษาด้วยกลุ่มยาเบต้าบล็อกเกอร์ (β -blocker) ในปัจจุบันเกือบจะถือได้ว่า β -blockers เป็นยามาตรฐานในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ทั้งๆที่สมัยก่อนยากลุ่มนี้ถือเป็นข้อห้ามในการใช้รักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว (ปิยะมิตร ศรีธรา ข., 2549) เนื่องจากฤทธิ์ของยามีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลง ผู้ป่วยบางรายอาจมีประสิทธิภาพการทำงานและหน้าที่ของหัวใจและหลอดเลือด (hemodynamic) ลดลง จากข้อมูลการศึกษาที่มากขึ้นในปัจจุบันพบว่า ยาดังกล่าวสามารถใช้รักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวได้ผลดีมาก โดยทำให้หัวใจมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิตได้ (Tendera & Ochala, 2001) ในปัจจุบันมี β -blocker บางชนิดเท่านั้นที่ใช้ได้ผลในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว จากข้อมูลการวิจัยและที่ใช้แพร่หลายมีอยู่ 3 ชนิด (ปิยะมิตร ศรีธรา ข., 2549) ได้แก่ bisoprolol, carvedilol, และ metoprolol แต่ละชนิดจะให้ผลการรักษาได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการเลือกใช้ β -blocker บางชนิดอาจได้ประโยชน์ในการลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้มากกว่าอีกชนิดหนึ่ง เช่น การศึกษาของلوبมีเยอร์ และคณะ (Lobmeyer et al., 2007) ศึกษาแบบ prospective study ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 54 ราย ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป NYHA function class II-III, ejection fraction น้อยกว่าร้อยละ 40 และได้รับการรักษาด้วยยาแอสอีอินฮิบิเตอร์ (ACEI) มาสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า 4 สัปดาห์ วัดผลด้วยการทำ echocardiogram ก่อนและหลังได้รับยา metoprolol รักษา 5-6 เดือน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของ left ventricular function ผลการศึกษาพบว่า ยา metoprolol ช่วยเพิ่ม ejection fraction ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ได้ β -blocker หลังได้รับยา ACEI สามารถลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้มากกว่าการให้ ACEI เพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด การดูแลรักษาจึงมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อลดอัตราการตาย ชะลอความก้าวหน้าของโรค ควบคุมไม่ให้เกิดอาการกำเริบ คงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้ประโยชน์คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ปิยะมิตร ศรีธรา ข., 2549; รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์, 2546) ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการใช้ยารักษา แต่การบำบัดรักษา ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย หากผู้ป่วยขาดการดูแลตนเองทั้งทางด้านการจัดการตนเอง การใช้ยา และการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิต และการกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ความก้าวหน้าของโรคที่รุนแรงขึ้น การเกิดอาการกำเริบซ้ำ และความเสื่อมถอยของภาวะสุขภาพ ส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การบำบัดรักษาได้ผลดียิ่งขึ้นและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย นั่นคือ ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว

การดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

การดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต้องเน้นให้ผู้ผู้ป่วยสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ โดยต้องมีการดูแลตนเองเพื่อการรักษาสุขภาพ (self-care maintenance) การดูแลตนเองเพื่อจัดการกับอาการ (self-care management) และการสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเอง (self-care confidence) (จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิริลักษณ์, ปุณยวีร์ ประเสริฐไทย, อรุณศรี จันทร์ประดิษฐ์, และวงรัตน์ ใสสุข, 2551) การพัฒนาแนวทางการจัดการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจะต้องให้ผู้ผู้ป่วยได้พัฒนาสมรรถนะในการดูแลตัวเองที่จำเป็นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลตนเองเพื่อการรักษาสุขภาพ การดูแลตนเองเพื่อจัดการกับอาการ และการสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเอง ดังนี้

การดูแลตนเองเพื่อการรักษาสุขภาพ การดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีสุขภาพดี ช่วยชะลอความก้าวหน้าของโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และควบคุมไม่ให้ภาวะหัวใจล้มเหลวมีอาการกำเริบซ้ำหรือรุนแรงขึ้น ผู้ป่วยและผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการบำบัดรักษาที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การลดและควบคุมน้ำหนักตัว ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปทำให้ร่างกายมีเผาผลาญอาหารมากขึ้น มีผลทำให้หัวใจทำงานหนักเพิ่มขึ้น จากการศึกษาของมารอติและคณะ (Mariotti, Castrogiovanni, Canale, Borelli, & Rondinini, 2008) ศึกษาผลของการลดน้ำหนักต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่มีรูปร่างอ้วนและมีน้ำหนักเกิน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่มีรูปร่างอ้วนและมีน้ำหนักเกินจำนวน 34 ราย เข้าโครงการอาหารลดน้ำหนัก มีระยะการติดตาม 6 เดือน โดยประเมินผลก่อนและหลังเข้าโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวและดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p < .04$ และ $p < .005$ ตามลำดับ ระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว (NYHA functional class) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p < .02$ และค่า LVEF เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p < .05$

2. การรับประทานอาหาร ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ เนื่องจากเกลือโซเดียมมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำกลับ ซึ่งจะเพิ่มปริมาตรของเหลวในร่างกายและทำให้เกิดอาการบวม ในผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อยสามารถให้โซเดียมได้ 3 กรัมต่อวัน อาการรุนแรงปานกลางไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน ถ้ามีอาการรุนแรงมากขึ้นให้ลดโซเดียมเหลือ 500-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550) การรับประทานอาหารที่มีกากเพื่อไม่ให้เกิดภาวะท้องผูก และไม่ควรเบ่งถ่ายอุจจาระในขณะที่ท้องผูก เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มเลือดที่ออกจากเวนทริเคิลทันทีทันใด ซึ่งจะมีผลทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550; สมจิต หนูเจริญกุล, 2545) การจำกัดน้ำดื่มเพื่อลดการคั่งของน้ำในร่างกาย จะจำกัดในรายที่มีอาการ

บวมและปัสสาวะออกน้อย โดยให้จำนวนน้ำที่ได้รับมีความสมดุลกับจำนวนน้ำที่ขับออกมา โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำกัดน้ำประมาณ 2 ลิตรต่อวัน ในผู้ที่มีอาการรุนแรงมากอาจให้น้ำเพียง 1 ลิตรต่อวัน (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550) และชั่งน้ำหนักตัวอย่างสม่ำเสมอทุกวันเพื่อประเมินอาการบวมและภาวะน้ำเกิน นอกจากนี้ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เนื่องจากสารเหล่านี้จะกระตุ้นให้หัวใจทำงานมากขึ้น รวมทั้งการงดสูบบุหรี่เนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ เป็นสารที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจหดเกร็งตัว และในบุหรี่ยังมีสารคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งขัดขวางกระบวนการนำพาออกซิเจนทำให้การนำออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อลดลง และเกิดคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในกระแสเลือด ทั้งสารนิโคตินและสารคาร์บอนไดออกไซด์ในบุหรี่ยังมีผลทำให้เกิดภาวะการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมากขึ้น (ปิยะมิตร ศรีธรา, ปิยทัศน์ ทัศนาวินันท์ และสาธิต ชีพอุดมวิทย์, 2548)

3. การออกกำลังกาย ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถออกกำลังกายได้ตามความสามารถของตนเองและควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิช, 2546) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและลดอัตราการกลับเข้ามารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ (ปิยะนุช รักพานิชย์, 2549; วิศาล คันธารัตนกุล, 2548) จากการศึกษาของอมราวดี บุญยรัตน์ (2550) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 30 เรื่อง พบว่าการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมี 3 รูปแบบ คือ 1) การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ได้แก่ การปั่นจักรยานอยู่กับที่ การเดินหรือการเดินบนสายพาน การว่ายน้ำ และการออกกำลังกายแบบไทชิและการบริหารร่างกายในน้ำอุ่น จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7-59 ซึ่งมากกว่าการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน 2) การออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ยางยืด ใช้เครื่องมือ และการฝึกหายใจ จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 8-18 และ 3) การออกกำลังกายแบบผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-17 และพบว่าการออกกำลังกายทุกชนิดทำให้คะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งการฝึกการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ โดยจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

4. การทำกิจกรรม ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเหนื่อยง่ายเวลามีกิจกรรมจึงควรทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับภาวะร่างกาย เช่น ในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว (FC I-III) สามารถทำงานและทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ และมีข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมดังนี้ การนั่งทำกิจกรรมจะทำให้เหนื่อยน้อยกว่าการยืน การทำไปพักไปจะช่วยทำไม่เหนื่อย และไม่ควรทำกิจกรรมหลังอาหาร

ทันที ส่วนในผู้ที่มีอาการรุนแรงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FC IV) ควรทำกิจกรรมที่ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การบริหารข้อต่อต่างๆ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550) นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ภูเขาสูงหรือที่ร้อนจัด และผู้ป่วยที่มีอาการมากควรหลีกเลี่ยงการโดยสารเครื่องบินระยะไกล (รังสฤษฎ์ กาญจนะวนิชย์, 2546)

5. การมีเพศสัมพันธ์ มีผลทำให้หัวใจทำงานมากขึ้น ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง คือ ระดับ 3-4 อาจมีอาการทรุดหนักหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ การใช้ยาอมใต้ลิ้น (sublingual nitrate) ก่อนอาจช่วยลดอาการเหนื่อยหอบได้ (รังสฤษฎ์ กาญจนะวนิชย์, 2546) หรือการงดการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นปกติ

6. การพักผ่อน การพักผ่อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพราะทำให้หัวใจทำงานลดลง และลดความต้องการการใช้ออกซิเจน (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550) การทำจิตใจให้สบาย หลีกเลี่ยงการเกิดความเครียด อารมณ์โกรธหรือตกใจง่ายโดยการหาสิ่งผ่อนคลาย เช่น การนั่งสมาธิ การอ่านหนังสือ การฟังเพลง ผู้ป่วยควรได้รับการผ่อนคลายโดยการพบปะพูดคุยกับบุคคลรอบข้าง มีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นหรือการไปเที่ยวกับครอบครัว ได้ระบายความเครียดหรือความรู้สึกกับบุคคลที่ไว้วางใจ

7. การปฏิบัติตามการรักษา ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามตัวอย่างเหมาะสมต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้การทำงานของหัวใจที่เหลือนอยู่มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงแผนชีวิตบางอย่าง เพื่อให้มีการปฏิบัติตัวสอดคล้องกับแผนการรักษา และหลีกเลี่ยงปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมากขึ้น ผู้ป่วยควรมาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ให้รุนแรงขึ้น ติดตามความก้าวหน้าของโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกำเริบซ้ำของโรค และควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ป้องกันได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ควรได้รับทุกปี และโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส (pneumococcus) ควรได้รับทุก 5 ปี (Harrington, 2008)

8. การใช้ยา ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรสนใจรับรู้ผลข้างเคียงของยาที่ใช้รักษา และรับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพราะยาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เพิ่มขึ้น และลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ จากการศึกษารายงานวิจัยหลายๆ รายงาน พบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ขาดความรู้ในเรื่องยาและรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง จะทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลวมีอาการรุนแรงขึ้นและต้องกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Anderson et al, 2006; Armola & Topp, 2001; Hamner & Ellison, 2005; Vinson et al., 1990) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องทราบเกี่ยวกับยาในเรื่องของชื่อ ขนาด คุณสมบัติ วิธีใช้ และฤทธิ์ข้างเคียงของยา ซึ่งกลุ่มยาที่สำคัญและเป็นมาตรฐานที่ใช้รักษา

ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวตามข้อเสนอนี้และแนวทางการรักษาของ American College of Cardiology และ American Heart Association: ACC/AHA (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549; Hunt et al., 2005; Wingate, 2007) มีดังนี้

1. ยาช่วยเพิ่มแรงในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจที่สำคัญ คือ ดิจิตาลิส (digitalis) เป็นยาที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวแรงขึ้น ทำให้ปริมาณเลือดออกจากหัวใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยต้องมีการดูแลตนเอง คือ การจับชีพจรก่อนรับประทานยาทุกครั้ง ถ้ามีชีพจรเต้นอัตราน้อยกว่า 60 ครั้งต่อนาทีควรรับประทานยา ควรรับประทานยาตามขนาดและชนิดเดียวกันทุกครั้งที่ได้รับจากแพทย์ ไม่ควรเปลี่ยนขนาดยาเองหรือหยุดรับประทานยาเมื่อมีอาการดีขึ้น รับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังรับประทานอาหารทันที

2. ยาขับปัสสาวะ เป็นยาช่วยลดการคั่งของน้ำและเกลือโซเดียมในร่างกาย โดยเพิ่มการขับน้ำและโซเดียมออกทางไต ชนิดของยาและขนาดของยาที่ใช้จึงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวและหน้าที่ของไต (ประสาธน์ เหล่าถาวร และคณะ, 2541) ยาขับปัสสาวะส่วนใหญ่เป็นยาพวกไทอะไซด์ (thiazide) ฟูโรซีไมด์ (furozemide) และสไปโรโนแลคโตน (spironolactone) เมื่อผู้ป่วยได้รับยาขับปัสสาวะอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากผลข้างเคียงของยาได้ เช่น การเสียสมดุลของอิเล็กโตรไลต์ โดยเฉพาะโปแตสเซียมต่ำ หรือการได้รับยาขับปัสสาวะขนาดสูงอาจจะขับปัสสาวะออกมากเกินไปทำให้ความดันโลหิตต่ำ ซึ่งผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวในขณะที่ได้รับยานี้ คือ รับประทานอาหารที่มีโปแตสเซียมสูง เช่น ส้มกล้วย ถั่วมีฝัก เมล็ดธัญพืช งา และผักที่มีใบ เป็นต้น (Creason, 2001) สังเกตอาการบวมของตนเองบริเวณใบหน้าและบริเวณอวัยวะส่วนปลาย เช่น หลังเท้า หลังมือ แขนและขา สังเกตความสมดุลของจำนวนน้ำปัสสาวะที่ขับออกกับจำนวนน้ำดื่มในแต่ละวัน ชั่งน้ำหนักทุกวันในเวลาเดียวกันและควรปัสสาวะก่อนชั่งน้ำหนักทุกครั้ง น้ำหนักไม่ควรเพิ่มหรือลดลงไม่เกิน 0.45-0.9 กิโลกรัมต่อวัน ถ้าเพิ่มหรือลดมากกว่า 2 กิโลกรัมใน 1 วัน ให้รีบมาพบแพทย์ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550)

3. ยาขยายหลอดเลือด เป็นยาช่วยลดแรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายและลดการคั่งของเลือดในหัวใจ ส่วนใหญ่เป็นยาประเภทเอนไซม์อินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitor) ซึ่งผู้ป่วยควรทราบวิธีและขนาดในการใช้ยาที่ถูกต้อง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดรับประทานยาเมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น หลังรับประทานยานั่งพักผ่อนเป็นเวลา 15-20 นาที และไม่ควรมีการเปลี่ยนท่าเร็วเกินไป อาจทำให้เป็นลมได้ เนื่องจากมีภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่า ผู้ป่วยควรทราบระดับความดันโลหิตที่เหมาะสมของตนเอง และควรวัดความดันโลหิตเป็นประจำ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติควรบอกให้แพทย์ทราบ

4. ยาด้านเบต้า (β -blocker) ในปัจจุบันเกือบจะถือได้ว่า β -blockers เป็นยามาตรฐานในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว การให้ยาในขนาดสูงโดยเร็วทำให้อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงขึ้น (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549) ผู้ป่วยที่ได้รับยาด้านเบต้าควรมีการดูแลตนเอง คือทราบวิธีและขนาดในการใช้ยาที่ถูกต้อง และจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดรับประทานยาเมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น หลังรับประทานยาคควรนั่งพักผ่อนเป็นเวลา 15-20 นาที และไม่ควรมีการเปลี่ยนท่าเร็วเกินไปอาจทำให้เป็นลมได้ เนื่องจากมีภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่า วิตัศจรรย์และความดันโลหิตเป็นประจำ ผู้ป่วยควรทราบอัตราการเต้นของหัวใจ และระดับความดันโลหิตที่เหมาะสมของตนเอง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติควรบอกให้แพทย์ทราบ เพื่อระวังอาการภาวะหัวใจล้มเหลวหลังเริ่มรับประทานยา เนื่องจากยาอาจทำให้เกิดภาวะสับสน น้ำคั่ง ส่งผลให้อาการทรุดลงได้ ควบคุมปริมาณน้ำและเกลืออย่างเคร่งครัด โดยชั่งน้ำหนักตัวทุกวัน

การดูแลตนเองเพื่อจัดการกับอาการ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรมีการดูแลตนเองเพื่อจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องเรียนรู้ในการประเมินอาการ การค้นหาภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะเริ่มแรก การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย สามารถแยกแยะอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น และการตัดสินใจจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การปรับเพิ่มขนาดยาขับปัสสาวะ การลดและจำกัดปริมาณเครื่องดื่ม การลดและจำกัดปริมาณโซเดียมในอาหาร การติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สุขภาพเมื่อเริ่มมีอาการบวม หรือเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ และการตัดสินใจมาโรงพยาบาลก่อนวันนัดในกรณีที่ภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงขึ้นเกินความสามารถในการควบคุมหรือลดความรุนแรงได้ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การควบคุมอาการหรือลดความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และลดการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในการดูแลตนเองเพื่อจัดการกับอาการ โดยให้ผู้ผู้ป่วยสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเอง และพบว่าสามารถเพิ่มผลลัพธ์ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้เป็นอย่างดี เช่น การศึกษาของพาร์สัน และคณะ (Prasun, Kocheril, Klass, Dunlap, & Piano, 2005) ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยทำการทดลองแบบสุ่ม แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมจำนวน 31 ราย ได้รับการให้ความรู้แบบปกติ คือ การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การจำกัดโซเดียม การทำกิจกรรม การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ และการประเมินตนเอง โดยผู้ป่วยจะได้รับสมุดบันทึกน้ำหนัก และลงบันทึกน้ำหนักตัวทุกวัน ส่วนกลุ่มทดลอง จำนวน 35 ราย จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเองการดูแลเช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม และจะได้รับความรู้ในการประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ

สารน้ำเกิน และวิธีการปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองที่สัมพันธ์กับอาการและอาการแสดงของภาวะสารน้ำเกิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความทนต่อการทำกิจกรรมและออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการเข้ามารักษาที่ห้องฉุกเฉินในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .015

การสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเอง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถที่จะดูแลตนเองได้สำเร็จ ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนว่าจะปฏิบัติในกิจกรรมที่ต้องกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลงมือปฏิบัติรักษาตนเองได้ นอกจากนี้ความมั่นใจในการดูแลตนเองว่าสามารถประเมินอาการสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลว ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย การประเมินผลลัพธ์วิธีการบำบัดที่ประสบความสำเร็จเมื่อจัดการควบคุมอาการที่เกิดขึ้นเมื่อการดูแลตนเองได้ผลในการรักษาโรคหรือควบคุมอาการของโรค ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น (จอม สุวรรณโณ และคณะ, 2551) จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ช่วยพัฒนาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวให้เกิดความชำนาญในการดูแลตนเองของรีเกลและคณะ (Riegel, Dickson, Goldberg, & Deatruck, 2007) พบว่า มีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพียงร้อยละ 10.3 เท่านั้นที่มีความชำนาญในการดูแลตนเอง และการรับรู้ถึงอาการเตือนในระยะเริ่มแรก คือ ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการดูแลตนเองเพื่อจัดการกับอาการ (self-care management) ในผู้ป่วยที่มีความรู้มาก มีทักษะ และมีประสบการณ์มาก่อน จะมีการดูแลตนเองอยู่ในระดับสูง และความมั่นใจในการดูแลตนเองเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองและผลลัพธ์ นอกจากนี้ความสามารถในการดูแลตนเองด้านการแสวงหาและดำรงไว้ซึ่งความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ เครือข่ายทางสังคม และแหล่งสนับสนุนจากชุมชนนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่ด้วยความมั่นใจ และผู้ป่วยสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันถ่วงทีเมื่อเกิดอาการกำเริบขึ้น

ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีภาวะสุขภาพที่เสื่อมถอยและความสามารถในการทำหน้าที่ลดลง จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีการปฏิบัติตัวที่ยุ่งยากและซับซ้อนหลายประการ การดูแลตนเองจึงเป็นภาระหนักสำหรับผู้ป่วยซึ่งไม่อาจทำให้สำเร็จได้โดยผู้ป่วยเพียงลำพัง จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองให้กับญาติผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ซึ่งนับว่าเป็นภาระหนักสำหรับญาติผู้ดูแลเช่นกัน ที่ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย ต้องมีภาระหนักกับการเฝ้าระวังอาการ การประเมินอาการและการจัดการกับอาการที่ผิดปกติ การรักษาที่ซับซ้อน และมีการดูแลตนเองที่เคร่งครัด เช่น การ

รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำ การจัดการเรื่องน้ำ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้น เช่น การต้องแยกทำอาหารเฉพาะผู้ป่วย คือ อาหารที่มีโซเดียมต่ำ การเลือกซื้ออาหารที่มีโซเดียมต่ำ และการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยที่บ้าน (Dunbar, Clark, Quinn, Gary, & Kaslow, 2008) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวสามารถลดอัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง และช่วยให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือบุคคลที่ตนรัก การอยู่ลำพังไม่มีครอบครัวสนับสนุนช่วยเหลือ หรือการแยกตัวจากสังคม ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือมีการดูแลตนเองในระดับต่ำ (Dunbar et al., 2008; Riegel et al., 2007) สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพ์ใจ อนุจะโปะ (2547) วรินทร์ เวียงโอสถ (2547) และนิภาพร ประจัญบาน (2550) ซึ่งพบว่าการส่งเสริมความสามารถของผู้ป่วยในการดูแลตนเองและส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้

ดังนั้นสิ่งสำคัญในการควบคุมโรคนอกจากการรักษาแล้ว ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจึงจำเป็นต้องพึ่งพาครอบครัว ผู้ดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ซึ่งต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ เพื่อช่วยให้การดูแลตนเองประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะถ้าการดูแลตนเองล้มเหลว จะทำให้ไม่สามารถควบคุมโรคได้ เกิดอาการกำเริบและนำไปสู่การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบและนำไปสู่ปัญหาที่สำคัญต่างๆ ตามมา

2. การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (outcome indicators) หมายถึง ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายอันเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการดูแล หรือการปฏิบัติการพยาบาล ตัวชี้วัดผลลัพธ์นี้มีพื้นฐานหรือพัฒนามาจากมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการดูแล การบริหารการดูแล และการใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล เป็นผลลัพธ์ด้านผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (payer outcomes) ซึ่งผลลัพธ์นี้จะนำมาสู่การปรับปรุงแบบแผนการดูแล โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มคุณภาพและการลดค่าใช้จ่ายในการดูแล (สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2547)

ปัจจุบันการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ที่นำมาใช้ประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งแนวคิดเรื่อง “การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล” แลนด์ดรัมและวีเอนริช (Landrum & Weinrich, 2006) เสนอแนะว่า ควรประกอบด้วย 1) การให้คำจำกัดความของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลควรมีความชัดเจน เพื่อให้แตกต่างจากการรับ

ผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลตามปกติ 2) การวินิจฉัยโรคทางคลินิกในการรับผู้ป่วยกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาล ควรใช้ระบบการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (diagnostic-related group: DRG) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จำแนกผู้ป่วยตามการวินิจฉัยโรคหรือความเจ็บป่วยที่มีความคล้ายคลึงกัน และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกำหนด DRG สำหรับกลุ่ม ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ DRG 127 (Dahl & Penque, 2000; Armola & Topp, 2001; Lagoe, Noetscher, & Murphy, 2001) 3) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการรับผู้ป่วยกลับเข้ามา รักษาซ้ำใน โรงพยาบาลอาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามเหตุผลของการรับผู้ป่วยกลับเข้ารับรักษาซ้ำ เช่น เป็น ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการเข้ามารักษาในโรงพยาบาลในครั้งก่อน เป็นโรคเดิมที่กลับเป็นซ้ำ เป็น การวางแผนการรักษา และไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคที่เป็นอยู่ 4) การกำหนดระยะเวลาการ กลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลหลังจำหน่ายครั้งสุดท้าย อาจมีความแตกต่างกัน เช่น 1-7 วัน, 8-30 วัน และ 30-31 วัน เป็นต้น และ 5) แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อนำมาประเมินการกลับเข้ามา รักษาซ้ำใน โรงพยาบาล ได้จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล บันทึกรายงานการรักษาผู้ป่วย ข้อมูลผู้ป่วยขณะ จำหน่าย แบบรายงานการรับผู้ป่วยกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาล และข้อมูลจากคำบอกเล่าของ ผู้ป่วยหรือสมาชิกในครอบครัว

นอกจากนี้ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกก็คือ อัตราการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาล ควรวิเคราะห์จำแนกตามกลุ่มโรคที่พบว่ามีการการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลบ่อยๆ จึงจะได้ อัตราที่มีความหมาย (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549; Lagoe et al, 2001; Landrum & Weinrich, 2006) โครงการเครื่องชี้วัดคุณภาพนานาชาติ (International Quality Indicator Project: IQIP) ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นจากการทำงานของ Mary Hospital Association ในประเทศ สหรัฐอเมริกา มีบทบาทในการช่วยโรงพยาบาลต่างๆหาโอกาสพัฒนาคุณภาพ ปัจจุบัน IQIP ให้บริการแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วโลกในการประมวลผลข้อมูลกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพ และได้ แนะนำการบันทึกตัวชี้วัดการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาล ภายใน 15 วัน และ 31 วัน ในกลุ่ม โรคดังต่อไปนี้ คือ congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pneumonia, และ acute myocardial infarction (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549; Lagoe et al, 2001) เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังและมีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ามา รักษาซ้ำใน โรงพยาบาล (Lagoe et al, 2001; Landrum & Weinrich, 2006) และควรมีการทบทวนเพื่อค้นหา สาเหตุของการกลับเข้ามา รักษาซ้ำซึ่งอาจดำเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2547)

อย่างไรก็ตามคำจำกัดความของคำว่า “การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล” หรือ “readmission” ยังไม่มีความเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาและการวัดผล (Landrum & Weinrich, 2006) จากการทบทวนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่า มีผู้ให้ความหมายของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลแตกต่างกันตามการศึกษา และพบอุบัติการณ์ของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลดังนี้

ขจร เพ็ญสุพรรณ (2545) ให้ความหมายของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง การที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลด้วยการเจ็บป่วยซ้ำจากภาวะหัวใจล้มเหลวภายในระยะเวลา 1 ปี และประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) จำนวนครั้งของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล โดยอาศัยความถี่ที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้เข้มารักษาซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี 2) ระยะเวลาการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลหลังจากจำหน่ายครั้งล่าสุด โดยกำหนดระยะเวลาการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน ระยะเวลาระหว่าง 31-90 วัน ระยะเวลาระหว่าง 91-150 วัน และระยะเวลามากกว่า 150 วัน และ 3) ระดับสมรรถภาพของหัวใจโดยประเมินจากระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว (The New York Heart Association: NYHA functional class) จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 2.91 ครั้ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่กลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 1 ปี 1 ครั้ง ร้อยละ 37.1 ระยะเวลากลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายหลังจากจำหน่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน ร้อยละ 54.3 และระดับสมรรถภาพของหัวใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับริช และคณะ (Rich et al., 1995) ซึ่งกล่าวไว้ว่าระยะเวลาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล คือ ภายใน 30 วัน หลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

นิภาพร ประจันบาน (2550) ให้ความหมายของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการกลับเข้รับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินหรือที่รับไว้ในโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบซ้ำของภาวะหัวใจล้มเหลว โดยนับตั้งแต่วันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจนถึง 28 วัน หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และจากการศึกษาพบผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบปกติมีการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวถึงร้อยละ 50 ส่วนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ มีการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวร้อยละ 27.8

วินสัน และคณะ (Vinson et al., 1990) ให้ความหมายของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง การที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงเวลา 90 วัน และจากการศึกษา พบผู้ป่วยที่มีกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวย้อยละ 47

ลากู และคณะ (Lagoe et al., 2001) ให้ความหมายของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยในอย่างน้อยที่สุด 1 วัน 2) กลับเข้ามารักษาซ้ำภายใน 30 วัน หลังจากการจำหน่าย 3) กลับเข้ามารักษาซ้ำโดยไม่ได้วางแผน และ 4) การวินิจฉัยโรค เป็นโรคเดียวกับการเข้ารับรักษาในครั้งก่อน และจากการศึกษาพบผู้ป่วยที่มีกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวในปี 1998 ร้อยละ 41 และในปี 1999 ร้อยละ 34

ฮามเนอร์และอิลิสัน (Hamner & Ellison, 2005) ให้ความหมายของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล หมายถึง การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 เดือนโดยไม่ได้วางแผน และจากการศึกษา พบผู้ป่วยที่มีกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวย้อยละ 40

โครงการเครื่องชี้วัดคุณภาพนานาชาติ (International Quality Indicator Project: IQIP) ได้แนะนำการบันทึกตัวชี้วัดการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 15 วัน และ 31 วัน ซึ่งการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 15 วัน สะท้อนถึงคุณภาพการดูแลของโรงพยาบาล ขณะที่การกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 31 วัน สะท้อนถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549) ส่วนในระบบการพัฒนาคูณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลของสำนักงานการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (2547) ได้กำหนดตัวชี้วัดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลระดับชาติซึ่งเสนอโดย “คณะวิจัยเครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ)” ในโครงการ Hospital Accreditation มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการรักษาพยาบาลในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประเมินปัญหาการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล รวมทั้งการวางแผนจำหน่าย มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนาระบบการรายงาน รวมทั้งการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศทางการพยาบาล เพื่อให้เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงระดับคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน และได้ให้ความหมายของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล หมายถึงการรับผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยในซ้ำด้วยโรคหรืออาการเดิมภายใน 28 วัน หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับการนัดหมาย

จากรายงานการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่าการให้ความหมายการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ของผู้วิจัยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเป็นตัวกำหนด โดยอยู่ในช่วง 28 วัน ถึง 1 ปี ซึ่งอนุวัฒน์ ศุภชุตikul (2545) กล่าวว่า “ตัวชี้วัดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลนี้เป็นสิ่งที่ต่างประเทศใช้และทดสอบกันมาจนเป็นที่ยอมรับ การกำหนดเวลา 28 วัน หรือ 30 วัน จะไม่แตกต่างกัน เพียงแต่การนัดหมายนั้นมักจะนัดเป็นสัปดาห์มากกว่านัดเป็นเดือน จึงใช้ 4 สัปดาห์ในการกำหนดเวลาแทนที่จะเป็น 1 เดือน ส่วนการกำหนด เป็น 60 วัน หรือ 90 วัน จะไม่มีประโยชน์ เพราะผู้ป่วยอาจกลับมาด้วยธรรมชาติของโรคที่กำเริบขึ้นได้” ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ผู้ศึกษาจึงให้ความหมายของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง การที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้ามารับการรักษาซ้ำทั้งการมารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบซ้ำของภาวะหัวใจล้มเหลวหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 28 วัน โดยไม่ได้รับการนัดหมาย

เครื่องชี้วัดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลนี้เป็นการประเมินคุณภาพการดูแลรักษาว่าได้ทำอย่างเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งหากเพียงพอและเหมาะสมผู้ป่วยจะต้องไม่กลับมารักษาซ้ำอีก แต่ถ้าแพทย์ผู้รักษาเห็นว่าธรรมชาติของโรคจะต้องนำผู้ป่วยกลับเข้ามาอนรักษาก็กี่จะวางแผนให้กลับมานอนโรงพยาบาลใหม่ (อนุวัฒน์ ศุภชุตikul, 2545) และปัจจัยที่เป็นสาเหตุนำไปสู่การต้องรับผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลนั้นมีหลายปัจจัย ซึ่งบางปัจจัยอยู่ในความควบคุมของโรงพยาบาลอันเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการบริการ เช่น การให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลก่อนเวลาอันสมควร การไม่วางแผนให้การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลที่ดีพอ ความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยไม่ดีพอ เป็นต้น และบางปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้ป่วย เช่น เชื้อชาติ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลอาจพยายามลดความถี่ของการรับผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลงได้ นั่นคือ การยืดระยะเวลาที่ผู้ป่วยไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลออกไป (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ, 2543) ส่วนแหล่งข้อมูลของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้จากทะเบียนผู้ป่วยในของแต่ละหอผู้ป่วย และแบบบันทึกรายงานผู้ป่วยกลับเข้ารักษาซ้ำใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ซึ่งจะรายงานเป็นอัตราร้อยละในแต่ละเดือน สำหรับวิธีการคำนวณที่เป็นมาตรฐาน คือ จำนวนผู้ป่วยในที่ต้องรับกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน หลังจากออกจากโรงพยาบาลในเดือนหนึ่งๆ คูณ ด้วย 100 หาคด้วย

จำนวนผู้ป่วยในที่กำหนดทั้งหมดในเดือนก่อนหน้านั้น (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ, 2543; สำนัก
การพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2547)

อัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน =

$$\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยที่กลับเข้ามารักษาซ้ำด้วยโรค / อาการเดิม ภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย} \times 100}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่กำหนดทั้งหมดในเดือนก่อนหน้า}}$$

3. ผลกระทบของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดของการเข้ามารักษาในโรงพยาบาลและมีความสัมพันธ์กับอัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สูงขึ้น ซึ่งการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงองค์กร ได้ดังนี้

1. ตัวผู้ป่วย

1.1 ด้านร่างกาย เนื่องจากผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้งมีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น (NYHA FC III หรือ IV) (Armola & Topp, 2001) จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานและเหนื่อยล้า จากอาการของโรคที่กำลังกำเริบซ้ำและรุนแรงขึ้นส่งผลให้ต้องกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง อาการที่พบบ่อย และมักเป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ หรือกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล คือ อาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, 2546; Parashall et al., 2001) ซึ่งในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจะพบอาการเหนื่อยหอบรุนแรงมากขึ้นในผู้ป่วยที่มี NYHA FC III หรือ IV ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง เมื่อออกแรงเพียงเล็กน้อย หรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆก็จะหอบเหนื่อย (Oxberry & Johnson, 2008) และการศึกษาของสตัล และคณะ (Stull et al., 1999) พบว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือมาที่ห้องฉุกเฉิน อาการมักจะกำเริบขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นซ้ำๆ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีหัวใจห้องล่างโป่งพอง (dilated cardiomyopathy: DCM) ทำให้ความสามารถในการบีบตัวลดลง (systolic dysfunction) เกิดการคั่งของน้ำ สูญเสียพลังงาน และหายใจลำบาก (สมชาย หรรษคุณาชัย, 2546) และอาการมักจะกำเริบซ้ำขณะนอนหลับในตอนกลางคืน ทำให้รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วย (ปราณี กาญจนวงศ์, 2550) ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของผู้ป่วยพบเห็นบ่อย และต้องนำผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉิน

นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยที่กลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพให้ความสนใจที่จะหาวิธีการต่างๆ เพื่อจัดการและป้องกันการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ทั้งการรักษาด้วยการใช้ยา การทำผ่าตัดหรือหัตถการต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาซึ่งไม่คงที่ และอาจต้องใช้ปริมาณที่สูงขึ้นจากเดิมหรือใช้หลายๆวิธีร่วมกัน ทำให้ผู้ป่วยต้องอดทนต่อวิธีการดูแลรักษาและต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดูแลตนเองที่ต้องเข้มงวดขึ้น

1.2 ด้านจิตใจและอารมณ์ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อต้องกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ผู้ป่วยหลายคน จะมีความคิดเหมือนว่า “ใกล้ตาย” และไม่สามารถกลับไปทำงานได้ (Stull et al., 1999) จะเกิดความวิตกกังวล กลัว มีความรู้สึกสูญเสียพลังอำนาจ และมีความมีคุณค่าในตนเองลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอาการของโรคที่กำลังเรื้อรังและรุนแรงซึ่งคุกคามถึงชีวิตความสามารถในการทำกิจกรรมลดลงต้องพึ่งพาผู้อื่น รวมทั้งอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลรวมถึงการผ่าตัด การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วยส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถปรับตัวกับภาวะเครียดต่างๆ ได้ ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ท้อแท้สิ้นหวังและมีโอกาสฆ่าตัวตายได้ (Bennett et al., 2000)

2. ด้านสังคม ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อไม่สามารถควบคุมอาการได้ก็จะต้องกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบด้านสังคม คือ ผู้ป่วยจะแยกตัวและรู้สึกโดดเดี่ยวเกิดความรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นหรือด้อยกว่า จึงต้องแยกตัวออกจากสังคม และจะยิ่งเป็นมากขึ้นเมื่ออาการกำเริบซ้ำบ่อย และการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยต้องถูกแยกออกจากครอบครัวและสังคมที่ตนรัก ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล แล้วยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผู้ดูแล ที่ต้องแยกตัวจากผู้ป่วยและต้องแยกจากสังคมรอบข้าง เพราะต้องคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

3. ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและมีอัตราการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสูง (Dahl & Penque, 2000; Creason, 2001) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องบุคลากร เทคโนโลยี และค่าบริการเสริมอื่นๆ อีกทั้งการมารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สูญเสียเวลาทำงานหรือต้องออกจากงาน และจากภาวะสุขภาพที่เสื่อมถอย มีภาวะโรครุนแรง ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ มีภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยจึงไม่สามารถการกลับไปทำงานได้ตามปกติ (Phillips, Harrison, & Houck, 2005) ทำให้ขาดรายได้ ส่วนด้านครอบครัว ผู้ดูแลต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล จึงทำให้สูญเสียเวลาทำงานหรือต้องออกจากงานเช่นเดียวกัน หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างผู้ดูแลแทน และจากที่ผู้ป่วยอยู่ในวัยทำงาน คือในช่วงอายุ 20-64 ปี ถึงร้อยละ 8.9 (Phillips et al., 2005) ทำให้ขาดกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

และสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา จากการศึกษาของฟิลลิปส์ และคณะ (Phillips et al., 2004) ศึกษาแบบวิเคราะห์ห่อภิณ (meta-analysis) พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีภาวะหัวใจล้มเหลวและกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 6 เดือนหลังจำหน่าย และค่ารักษารวมถึงร้อยละ 60 ของการจ่ายเงินประกันสุขภาพของรัฐบาล

4. องค์การ อัตราการกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อองค์กร เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลขององค์กรที่สำคัญประการหนึ่ง มักเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณภาพการดูแลรักษาไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่น ความไม่เพียงพอของอัตรากำลัง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และจำนวนเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ และถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการเบิกจ่ายค่าดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล แต่บางองค์กรยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเช่นกัน เช่น ในปี 1994 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 840,000 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีจำนวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยเกือบ 7 วัน และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเฉลี่ย 5,104 ดอลลาร์ ขณะที่ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลจ่ายเงินให้องค์กร 4,610 ดอลลาร์ (Dahl & Penque, 2000) สอดคล้องกับการศึกษาของครีตัน (Creason, 2001) ทำการศึกษา ณ St Mary's Health System ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาด 407 เตียง ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าภาวะหัวใจล้มเหลว คือ 1 ใน 3 ของระบบการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG 127) ที่มีการกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 30 วันมากที่สุด และการรับผู้ป่วยเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลรักษาโดยรวมเฉลี่ย 4,614 ดอลลาร์ กับจำนวนเงินเฉลี่ยที่โรงพยาบาลจะได้รับคืน 3,975 ดอลลาร์ และเนื่องจากการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ DRG ถ้าผู้ป่วยกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมภายในเวลา 14 วันจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้การกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่บ่อยครั้ง ยังส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีต่อผู้ให้บริการหรือองค์กรได้อีกด้วย

จากการศึกษาเกี่ยวกับการกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่า มีอัตราของการกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสูง รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนครอบครัว องค์กรและประเทศชาติ จึงมีผู้สนใจทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและลดการกลับเขามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยที่สามารถควบคุมได้

1. ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานด้านประชากร เช่น เชื้อชาติ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ดังนี้

เชื้อชาติ คนผิวดำเมื่อมีอาการป่วยมักจะมารักษาซ้ำ และมีอัตราการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลมากกว่าคนผิวขาว (Hamner & Ellison, 2005; Anderson et al., 2006)

อายุ พบว่า การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป (อุพาร วงศ์เกล้า และสุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล, 2542; Dykes et al., 2005)

เพศ ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน บางการศึกษาพบว่าเพศหญิงมีอัตราการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลมากกว่าเพศชาย (Vinson et al., 1990)

สถานภาพสมรส ผู้ป่วยที่ไม่แต่งงานหรืออยู่คนเดียว จะเพิ่มการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Hamner & Ellison, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลัททิก และคณะ (Luttik, Jaarsma, Veeger, & van Veldhuisen, 2006) ทำการศึกษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 179 ราย ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลและอัตราการตายของผู้ป่วยที่แต่งงานและอยู่กับคู่สมรสน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่แต่งงานหรืออยู่คนเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่แต่งงานและอยู่กับคู่สมรสมีความแตกต่างกับผู้ป่วยที่ไม่แต่งงานหรืออยู่คนเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากการศึกษาของแอนเดอร์สัน และคณะ (Anderson et al., 2006) เป็นการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 1986-2004 จำนวน 31 เรื่อง พบว่า งานวิจัยเกือบทั้งหมดรายงานว่า เชื้อชาติ อายุ เพศ และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของจอร์ เพียสุพรรณ (2545) ทำการศึกษาเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เคยมีประวัติกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 35 ราย พบว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

2. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สามารถควบคุมได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาสรุปได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย ปัจจัยด้านบริการสุขภาพ ปัจจัยด้านจิตสังคมและผู้ดูแล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย ได้แก่ ด้านสรีรวิทยา (physiologic) และการมีโรคร่วม (comorbidity) ปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นตามอาการ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (atrial fibrillation) ระดับโซเดียมที่สูงขึ้น การมีความดันหลอดเลือดในปอดสูงขึ้น (pulmonary hypertension) หรือจำนวนของภาวะโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคถุงลมโป่งพอง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง (Anderson et al., 2006; Armola & Topp, 2001; Hamner & Ellison, 2005)

ข้อบ่งชี้ทางคลินิก (clinical parameters) และภาวะการทำหน้าที่ (functioning domain) ได้แก่ การพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลกิจวัตรประจำวัน การสูญเสียการได้ยินและการมองเห็น การสูญเสียการรู้คิด และ NYHA functional class ระดับ IV จะมีค่า Ejection Fraction (EF) ลดลงและการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น (Anderson et al., 2006; Armola & Topp, 2001) จากการศึกษาของวินสัน และคณะ (Vinson et al., 1990) ศึกษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่กลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาล จำนวน 161 ราย จากโรงพยาบาลขนาด 550 เตียง ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยมี functional class ระดับ III-IV มากกว่าร้อยละ 60 สอดคล้องกับการศึกษาของสจ๊วต และแอล แมน (Schwarz & Elman, 2003) ศึกษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ดูแล จำนวน 156 คู่ จากโรงพยาบาลชุมชน 2 โรงพยาบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความสัมพันธ์ของภาวะโรคหัวใจและภาวะการทำหน้าที่ของร่างกายเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำนายการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย ได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา จากการศึกษาของแวน เดอ วอล และคณะ (van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst, & van Veldhuisen, 2007) ศึกษาถึงสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในเรื่องของการรับประทานยา อาหาร และการชั่งน้ำหนัก พบว่า ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามแผนการรับประทานยา เนื่องจาก อาการปัสสาวะมากในตอนกลางคืน ร้อยละ 57 ไม่ปฏิบัติตามแผนการรับประทานอาหาร เนื่องจาก รสชาติของอาหาร ร้อยละ 51 และการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ร้อยละ 33 และไม่ชั่งน้ำหนักเนื่องจากลืม ร้อยละ 26

จากการศึกษาของจอร์ เพียสุพรณ์ (2545) ทำการศึกษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เคยมีประวัติกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 35 ราย พบว่า ปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตน ด้านการรับรู้ประโยชน์การรักษา และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเป็นตัวทำนายการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปัจจัยความเชื่อด้านการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาล

($r = 0.39, p < .05$) ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องทำให้ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลง ($r = -0.39, p < .05$)

การศึกษาเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ของเขาวภา บุญเที่ยง (2545) ศึกษาผู้ป่วยสูงอายุภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีประวัติกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจำนวน 90 ราย จาก 3 โรงพยาบาลในภาคกลางของประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมสุขภาพที่ดีทำให้อัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = -.261, p < .01$) และจากการศึกษาของสจ๊วต และคณะ (Stewart, Vandenbroek, Pearson, & Horowitz, 1999) ศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในหน่วยโรคหัวใจ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 97 ราย พบว่า มีผู้ป่วยถึงร้อยละ 50 รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวินสัน และคณะ (Vinson et al., 1990) ศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 161 ราย จากโรงพยาบาลขนาด 550 เตียง ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีข้อบ่งชี้จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ คือ จากการไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารร้อยละ 18 การรับประทานยาร้อยละ 15 และขาดการมาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการร้อยละ 20

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า ขาดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง และไม่พึงพอใจในชีวิตจะเพิ่มการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Anderson et al., 2006; Hamner & Ellison, 2005; Vinson et al., 1990)

3. ปัจจัยด้านบริการสุขภาพ การดูแลรักษาของโรงพยาบาล (medications regimen) และความครอบคลุมในการดูแลรักษาระหว่างอยู่โรงพยาบาล มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล เช่น จากการศึกษาย้อนหลังในปี 1998 ในโรงพยาบาลขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบรายกรณี การส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ การใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วย การรักษาด้วยยาเอซีอีอินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitor) และ Beta blockers การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเอง การวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย จะช่วยลดอัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Armola & Topp, 2001) และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการขาดการแนะนำผู้ป่วยและญาติ ในเรื่องชนิดของยาที่รับประทาน วิธีรับประทานยา ผลข้างเคียงของยาที่ต้องรับมาโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยขาดความรู้ในเรื่องยาและการปฏิบัติตัว และไม่ปฏิบัติ

ตามแผนการรักษาจะเพิ่มการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Anderson et al., 2006; Armola & Topp, 2001; Hamner & Ellison, 2005)

การศึกษาของเขาวภา บุญเที่ยง (2545) พบว่า ผู้ป่วยมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมด้านการสังเกตอาการถึงร้อยละ 100 ซึ่งร้อยละ 68.89 เกิดจากการขาดความรู้ สอดคล้องกับการศึกษาของฮามเนอร์ และอิลสัน (Hamner & Ellison, 2005) ทำการศึกษาเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 557 ราย จากโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้รักษาซ้ำภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ได้แก่ ขาดการส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจในระหว่างการรักษาอยู่โรงพยาบาล ($\chi^2 = 14.1, p < .05$) จุดที่รับผู้ป่วยไว้รักษา เช่น จากแผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจและการส่งต่อมารักษา ($\chi^2 = 11.88, p < .05$) ซึ่งพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 61 เข้มารักษาในโรงพยาบาลโดยผ่านแผนกฉุกเฉินและมีประวัติการกลับเข้มารักษาซ้ำมากกว่าแผนกอื่น สิทธิการรักษา เช่น สิทธิการรับรองการรักษาจากรัฐบาล การทำประกันชีวิต และการจ่ายค่ารักษาเอง ($\chi^2 = 15.3, p < .05$) ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่มีสิทธิการรับรองการรักษาจากรัฐบาลมีประวัติการกลับเข้มารักษาซ้ำมากกว่าผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตและจ่ายค่ารักษาเอง การใช้ยารักษาหลายชนิด ($\chi^2 = 4.2, p < .05$) และการจำหน่ายโดยการส่งต่อสู่ศูนย์สุขภาพชุมชน ($\chi^2 = 5.6, p < .05$)

4. ปัจจัยด้านจิตสังคมและผู้ดูแล การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และครอบครัว คือ แหล่งประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในชุมชน โดยเฉพาะผู้ดูแลซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วย เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและผู้ป่วยสามารถขอความช่วยเหลือได้ จากการศึกษาของ เขาวภา บุญเที่ยง (2545) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมช่วยให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .636, P < .001$) และการสนับสนุนทางสังคมทำให้การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = -.184, P < .05$) สอดคล้องกับการศึกษาของสจ๊วต และแอลแมน (Schwarz & Elman, 2003) พบว่า ความเครียดของผู้ดูแลและภาวะซึมเศร้าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำนายการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากการทบทวนรายงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวข้างต้น พบว่า การเจ็บป่วยด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง และผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (เขาวภา บุญเที่ยง, 2546; Schwarz & Elman, 2003; Vinson et al., 1990) นอกจากนี้ยังพบว่า การกลับเข้มารักษาซ้ำของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยรวมกัน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้

ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล อัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณภาพการดูแลรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สมบูรณ์ เกิดความผิดพลาด หรือมีปัญหาจากการรักษาในครั้งก่อน ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายสูงทั้งผู้รับบริการและองค์กร ปัจจุบันจึงมีหลายประเทศให้ความสำคัญและพยายามหาแนวทางในการป้องกัน หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม อีกทั้งผู้ป่วยจะต้องมีความสามารถในการดูแลตนเอง ได้ถูกต้องและต่อเนื่อง มีภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม และที่สำคัญคือ ความสามารถของพยาบาลในการจัดการเพื่อลดการกลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาล

จากการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวค่อนข้างมาก แต่แนวทางในการป้องกันการกลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวยังมีน้อย วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อทบทวนหลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การสืบค้นแหล่งข้อมูล
2. การคัดเลือกข้อมูลที่จะนำมาศึกษา
3. การประเมินคุณภาพและวิเคราะห์หลักฐานทางวิชาการ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ทางคลินิก
4. นำหลักฐานทางวิชาการที่รวบรวมได้และผ่านการประเมินคุณภาพแล้วมาประมวลเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

การสืบค้นแหล่งข้อมูล

1. การสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ OVID, CINAHL, Pubmed, Science Direct, Cochrane จากวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลและวิชาชีพอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ <http://library.ra.mahidol.ac.th>, www.thaiheart.org, www.AHCPR.org (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น www.AHRQ.gov), www.americanheart.org. จากการทบทวนงานวิจัยจากประเทศต่างๆพบว่าในระหว่างปี ค.ศ. 1990-2000 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เป็นการศึกษาที่มีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (randomized controlled trials, RCT) จำนวนมาก และต่อมาภายหลังปี ค.ศ. 2000 ได้นำผลการทดลองที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาเป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล และมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงกำหนดปีที่ใช้ในการสืบค้นตั้งแต่ ค.ศ. 1990-2008 โดยใช้ระยะเวลาการสืบค้นข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 และคำสำคัญ (key word) ที่ใช้ในการสืบค้น

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล การจัดการและการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล congestive heart failure, congestive heart failure and readmission, congestive heart failure and rehospitalization, congestive heart failure and unplanned readmission, prevention and readmission and congestive heart failure, Guideline and management and congestive heart failure, readmission and management and congestive heart failure, Guideline and congestive heart failure, Management and congestive heart failure, Readmission in heart failure

2. การสืบค้นด้วยมือ (manual search) จากตำรา วิทยานิพนธ์ วารสารทางการแพทย์ วารสารทางเภสัช และวารสารสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องสมุดวิชาเขตราชวิถี ห้องสมุดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอสมุดกลาง และสืบค้นจากเอกสารอ้างอิง (reference) ของหลักฐานทางวิชาการ

การคัดเลือกข้อมูลที่จะนำมาศึกษา

การคัดเลือกข้อมูลที่จะนำมาศึกษามีวิธีการ คือ เลือกหัวข้อวิจัยและหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องโดยการอ่านบทคัดย่อ (Abstract) ในแต่ละเรื่องและเลือกงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงนำบทคัดย่อเหล่านั้นมาหารายงานวิจัยฉบับเต็ม (full text) โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria) และเกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) เป็นงานวิจัยหรือบทความที่มีคุณสมบัติดังนี้

เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)

1. มีงานวิจัยฉบับเต็ม (full text) ซึ่งตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1990-2008 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2. เกี่ยวกับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากอาการที่กำเริบซ้ำด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
3. เกี่ยวกับการจัดการหรือการป้องกันเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)

งานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี

จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากฐานข้อมูลต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษาจากฐานข้อมูล คำสำคัญ และช่วงเวลาที่ตีพิมพ์

ฐานข้อมูล	คำสำคัญ	ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์	จำนวนงานวิจัยที่สืบค้น	จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือก
มหาวิทยาลัยมหิดล	ภาวะหัวใจล้มเหลว	2534-2551	6	1
	ภาวะหัวใจวาย		1	-
	ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน		2	-
	การกลับเข้มารักษาซ้ำ		2	-
	ในโรงพยาบาล			
	การจัดการและการกลับเข้มารักษาซ้ำ		147	-
	รวม			1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ภาวะหัวใจล้มเหลว	2534-2551	15	1
	ภาวะหัวใจวาย		5	-
	ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน		1	-
	การกลับเข้มารักษาซ้ำ		0	-
	ในโรงพยาบาล			
	การจัดการและการกลับเข้มารักษาซ้ำ		45	-
	รวม			1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ภาวะหัวใจล้มเหลว	2534-2551	10	-
	ภาวะหัวใจวาย		43	-
	ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน		9	-
	การกลับเข้มารักษาซ้ำ		0	-
	ในโรงพยาบาล			
	การจัดการและการกลับเข้มารักษาซ้ำ		82	-
	รวม			0

หมายเหตุ: นับจำนวนงานวิจัยที่ไม่ซ้ำ

ตารางที่ 1 จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษาจากฐานข้อมูล คำสำคัญ และช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ (ต่อ)

ฐานข้อมูล	คำสำคัญ	ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์	จำนวนงานวิจัยที่สืบค้น	จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือก
มหาวิทยาลัย	ภาวะหัวใจล้มเหลว	2534-2551	0	-
สงขลานครินทร์	ภาวะหัวใจวาย		1	-
	ภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง		0	-
	การกลับเข้ามารักษาซ้ำ		0	-
	ในโรงพยาบาล			
	การจัดการและการ		0	-
	กลับเข้ามารักษาซ้ำใน			
	โรงพยาบาล			
	รวม			0
OID	Congestive heart failure	1990-2008	379	5
	Congestive heart failure		15	4
	and readmission			
	Congestive heart failure		5	1
	and rehospitalization			
	Congestive heart failure		15	-
	and unplanned readmission			
	Prevention and readmission		0	-
	and congestive heart failure			
	Guideline and management		3	1
	and congestive heart failure			
	Readmission and management		2	-
	and congestive heart failure			
	Total			11

หมายเหตุ: นับจำนวนงานวิจัยที่ไม่ซ้ำ

ตารางที่ 1 จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษาจากฐานข้อมูล คำสำคัญ และช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ (ต่อ)

ฐานข้อมูล	คำสำคัญ	ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์	จำนวนงานวิจัยที่สืบค้น	จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือก
CINAHL	Congestive heart failure and readmission	1990-2008	127	2
	Congestive heart failure and rehospitalization		31	1
	Congestive heart failure and unplanned readmission		3	-
	Prevention and readmission and congestive heart failure		4	-
	Guideline and management and congestive heart failure		7	-
	Readmission and management and congestive heart failure		42	1
	Total			4
Pubmed	Congestive heart failure and readmission	1990-2008	143	3
	Congestive heart failure and rehospitalization		59	1
	Congestive heart failure and unplanned readmission		17	-
	Prevention and readmission and congestive heart failure		10	-
	Guideline and management and congestive heart failure		48	2
	Readmission and management and congestive heart failure		71	2
	Total			8

หมายเหตุ: นับจำนวนงานวิจัยที่ไม่ซ้ำ

ตารางที่ 1 จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษาจากฐานข้อมูล คำสำคัญ และช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ (ต่อ)

ฐานข้อมูล	คำสำคัญ	ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์	จำนวนงานวิจัยที่สืบค้น	จำนวนงานวิจัยที่คัดเลือก
ScienceDirect	Congestive heart failure and readmission	1990-2008	9	3
	Congestive heart failure and rehospitalization		3	-
	Congestive heart failure and unplanned readmission		0	-
	Prevention and readmission and congestive heart failure		0	-
	Guideline and congestive heart failure		6	-
	Management and congestive heart failure		14	2
	Total			5
Cochrane	Congestive heart failure	1990-2008	204	2
	Congestive heart failure and readmission		3	1
	Congestive heart failure and rehospitalization		3	-
	Congestive heart failure and unplanned readmission		0	-
	Prevention and readmission and congestive heart failure		0	-
	Management and congestive heart failure		3	-
	Readmission and management		6	-
	Total			3
AHCPR	Readmission in heart failure		5	2
Americanheart	Readmission in heart failure		5	-
Total				35

หมายเหตุ: นับจำนวนงานวิจัยที่ไม่ซ้ำ

จากตารางข้างต้นฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ OVID, CINAHL, Pubmed, ScienceDirect, และ Cochrane มีงานวิจัยและบทความซ้ำกันจำนวนมาก เมื่อคัดเลือกรื่องที่ไม่ซ้ำกันแล้ว พบว่า มีเรื่องที่สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 35 เรื่อง นอกจากนี้ยังสืบค้นด้วยมือได้งานวิจัยเพิ่มอีกจำนวน 3 เรื่อง รวมงานวิจัยทั้งหมด 38 เรื่อง

จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากแหล่งต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากการสืบค้นในแหล่งต่างๆ

แหล่งที่มา	จำนวนหลักฐาน
1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	35
2. การสืบค้นด้วยมือ (manual search)	
- วิทยานิพนธ์ไทย	-
- วารสารไทย	1
- วารสารต่างประเทศ	2
รวม	38

การประเมินคุณภาพของหลักฐานทางวิชาการ

ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

การประเมินคุณภาพในด้านระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ Evidence-Based Medicine & Clinical Practice Guidelines ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2544) ซึ่งมีการแบ่งระดับหลักฐานทางวิชาการไว้ 4 ระดับ ดังนี้

Level A: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากการรวบรวมงานวิจัยมาวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-analysis) ของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (randomized controlled trials, RCT) หรืองานวิจัยเดี่ยวที่เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (randomized controlled trials, RCT)

Level B: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากการรวบรวมงานวิจัยมาวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-analysis) ของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (randomized controlled trials, RCT) อย่างน้อย 1 เรื่อง หรืองานวิจัยเดี่ยวที่มีการออกแบบรัดกุม แต่เป็นงานกึ่งทดลองหรืองานวิจัยเชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม

Level C: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่เป็นงานเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์หรือเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายอื่นๆ

Level D: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ ตำราและเอกสารทางวิชาการต่างๆ

การพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ทางคลินิก

การวิเคราะห์หลักฐานทางวิชาการในด้านความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ทางคลินิกพิจารณาตามเกณฑ์ของโพลิตและคณะ (Polit, Beck, & Hungler, 2001) มีหลักการดังนี้

1. ผลงานวิจัยที่นำมาศึกษาตรงกับประเด็นของปัญหาที่กำลังศึกษาอยู่ (clinical relevance)
2. ผลงานวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ (scientific-merit) โดยพิจารณาจากการออกแบบงานวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการวัดตัวแปร การใช้สถิติในการวิเคราะห์ ความตรงภายใน ความตรงภายนอก รวมทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของระเบียบวิธีวิจัย
3. แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานไปใช้ในการปฏิบัติ (implementation potential) ประกอบด้วย
 - 3.1 ผลงานที่จะนำไปใช้มีความเหมาะสม (transferability of findings) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน่วยงาน กลุ่มผู้ป่วยและปรัชญาการดูแลของเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ
 - 3.2 มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ (feasibility of implementation) โดยคำนึงถึงพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้โดยมีเอกสิทธิ์ ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
 - 3.3 ต้องมีความคุ้มค่า (cost-benefit ratio) ผลงานวิจัยที่จะนำไปใช้นั้นเกิดประโยชน์มากเพียงพอ คุ้มกับค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการปฏิบัติในรูปแบบเดิม

จากการสืบค้นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ทั้งของไทยและต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวม 38 เรื่อง มีงานวิจัยที่อยู่ในระดับ A จำนวน 23 เรื่อง ระดับ B จำนวน 13 เรื่อง และระดับ C จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำไปใช้ทางคลินิกตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้จัดหมวดหมู่และแสดงไว้ในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 1 Effect of moderate or intensive disease management program on outcome in patients with heart failure.	วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการภาวะหัวใจล้มเหลว ชื่อ The Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH) ในเรื่อง อัตราการตายและการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 18 เดือน	วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการภาวะหัวใจล้มเหลว ชื่อ The Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH) ในเรื่อง อัตราการตายและการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 18 เดือน	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว NYHA FC II-IV อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,023 ราย สถานที่ Department of cardiology, University of Medical Groningen, Netherlands.	-ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 71 ปี ระหว่างการศึกษาร้อยละ 50 มีภาวะหัวใจล้มเหลวเล็กน้อยและร้อยละ 50 มีภาวะหัวใจล้มเหลวปานกลางถึงรุนแรง -อัตราการเข้ารับการรักษานี้ในโรงพยาบาลหรืออัตราการตายด้วยสาเหตุจากภาวะหัวใจล้มเหลว ของผู้ป่วยกลุ่ม intensive support น้อยกว่ากลุ่ม basic support และกลุ่ม control คือ ร้อยละ 38, 41 และ 42 ตามลำดับ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .52$) -ในกลุ่ม control มีอัตราการตายจากทุกสาเหตุร้อยละ 29 และมีแนวโน้มจะลดลงในกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม (ร้อยละ 27 ในกลุ่ม basic support และร้อยละ 24 ในกลุ่ม intensive support) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .39$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ -มีการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ข้อจำกัดของงานวิจัย -วิธีการจัดการในกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม อาจไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษา
ผู้เขียน Jaarsma et al. (2008)	การออกแบบวิจัย RCT Level A		การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มโดยการจัดเลือกแบบสุ่ม คือ กลุ่ม basic support จำนวน 348 ราย ได้รับการดูแลจาก cardiologist และพยาบาล ภาวะหัวใจล้มเหลว (HF nurse) ในขณะที่อยู่โรงพยาบาลและที่คลินิก ผู้ป่วยนอกเพื่อสนับสนุนให้ความรู้ กลุ่ม intensive support จำนวน 353		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 1 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ราย ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู้ป่วย กลุ่ม basic support และจะได้รับ ติดตามดูแลหลังจำหน่ายจากพยาบาล โดยในเดือนแรกจะโทรศัพท์เยี่ยม สัปดาห์ละครั้ง และไปเยี่ยมบ้าน 2 ครั้ง รวมทั้งได้รับการดูแลจากสหสาขา วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย นักกายภาพ บำบัด โภชนาการ และนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่ม control จำนวน 348 ราย ได้รับ การดูแลแบบปกติจากแพทย์เฉพาะ ทางโรคหัวใจ (cardiologist)	-ในช่วงเวลา 18 เดือน การเข้ามารักษา ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้งจาก ทุกสาเหตุร้อยละ 55 จากโรคหัวใจและ หลอดเลือดร้อยละ 64 และจากภาวะ หัวใจล้มเหลวร้อยละ 32 -จำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย กลุ่ม basic support และ กลุ่ม intensive support น้อยกว่ากลุ่ม control คือ 8.0, 9.5 และ 12.0 วัน ($p = .01$) -การกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล หลายครั้งด้วยสาเหตุของภาวะหัวใจ ล้มเหลวไม่แตกต่างกัน	การนำไปใช้ -โปรแกรมการจัดการภาวะ หัวใจล้มเหลวโดยการให้ทีมสห วิชาชีพ คือ พยาบาลภาวะหัวใจ ล้มเหลว แพทย์โรคหัวใจ นักกายภาพบำบัด โภชนาการ และนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วม ดูแลผู้ป่วย -การติดตามผู้ป่วย โดย การเยี่ยม บ้าน โทรศัพท์ การเยี่ยมที่ คลินิกผู้ป่วยนอก

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 2 Pharmacist care of patients with heart failure a systematic review of randomized trials. ผู้เขียน Koshman, Charrois, Simpson, McAlister, & Tsuyuki (2008)	วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเภสัชกร การออกแบบวิจัย A systematic review of randomized trials Level A	กลุ่มตัวอย่าง รายงานการวิจัยแบบ RCT จำนวน 12 เรื่อง มีจำนวนผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 2,060 ราย สถานที่ Centre for Community Pharmacy Research and Interdisciplinary Study, Canada. การดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยค้นหาข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และคัดเลือกงานวิจัยแบบ RCT นำมาประเมินถึงกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเภสัชกร	-จากงานวิจัยจำนวน 12 เรื่อง มีการศึกษา 7 เรื่อง เป็นการศึกษาผลลัพธ์ของดูแลจากเภสัชกร โดยตรง และ 5 เรื่อง ศึกษาผลลัพธ์ของการเข้าร่วมทีมดูแลผู้ป่วยของเภสัชกร -การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเภสัชกรมีความสัมพันธ์กับการลดอัตราการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยจากทุกสาเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (11 เรื่อง, OR = 0.71, 95% CI = 0.54-0.94) และลดอัตราการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยด้วยสาเหตุจากภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (11 เรื่อง, OR = 0.69, 95% CI = 0.51-0.94) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในการลดอัตราการตาย (12 เรื่อง, OR = 0.84, 95% CI = 0.61-1.15) การเข้าร่วมในทีมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของเภสัชกรสามารถลดอัตราการมาโรงพยาบาล (OR =0.42, 95 % CI =0.24-0.74) มากกว่าการได้รับการดูแลจากเภสัชกรโดยตรง (OR =0.89, 95% CI = 0.68-1.17)	ข้อดีของงานวิจัย -เป็นการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งการศึกษารวบรวมเป็นแบบ RCT ข้อจำกัดของงานวิจัย -มีความแตกต่างกันในเรื่องการกำหนดระยะเวลาของการกลับเข้ามารักษา ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -บทบาทของเภสัชกรและการบทบาทของเภสัชกรและการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วย การนำไปใช้ -บทบาทและการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากเภสัชกร

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 3 Inpatient initiation of β -blockade plus nurse management in vulnerable heart failure patients : A randomized study	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ภายใน 6 เดือนหลังจำหน่ายออกจาก โรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ ยา β -blocker ร่วมกับการจัดการทาง การพยาบาลกับกลุ่มที่ได้รับ การดูแลแบบปกติ	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 64 ราย ที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลและมี LVEF $\leq$ ร้อยละ 40 สถานที่ Denver Health, Colorado, USA การดำเนินการวิจัย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม จำนวน 64 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแล แบบปกติ จำนวน 32 ราย และกลุ่ม ทดลองจำนวน 32 ราย จะได้รับ การรักษาดด้วยยา β -blocker คือ carvedilol 3.125 มก. วันละ 2 ครั้ง ก่อนออกจากโรงพยาบาลร่วมกับ การดูแลจากพยาบาลผู้จัดการราย	ผลการวิจัย -ค่าเฉลี่ย LVEF ที่ baseline ของทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน คือ ร้อยละ 23 หลังจาก 6 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย LVEF เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม คือ ร้อยละ 69 และ 48 ($p < .001$) -กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย The New York Heart Association functional class เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม (+16 และ +11 EF unit, $p = .17$) -อัตราการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลภายใน 6 เดือนลดลงร้อยละ 84 โดยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (3 ครั้ง และ 19 ครั้ง, $p = .02$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
ผู้เขียน Krantz, Havranek, Haynes, Smith, Bartelson & Long. (2008)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การรักษาดด้วยยา β -blocker คือ carvedilol 3.125 มก. วันละ 2 ครั้ง ก่อนออกจากโรงพยาบาลร่วมกับ การดูแลจากพยาบาลผู้จัดการราย	ผลการวิจัย -อัตราการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลภายใน 6 เดือนลดลงร้อยละ 84 โดยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (3 ครั้ง และ 19 ครั้ง, $p = .02$)	การนำไปใช้ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา β -blocker หลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดย พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (nurse manager) ช่วยเพิ่มผล ดีขึ้นในการดูแลผู้ป่วยและช่วย ให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ ยา β -blocker รักษา หรือนำ ไปประยุกต์ใช้กับยาอื่นที่มี ความเสี่ยงสูงในกลุ่มอื่นได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 3 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) กรณี (nurse manager) โดยผู้ป่วยจะได้พบกับพยาบาลผู้จัดการรายกรณี 1 ครั้ง ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อสร้างสัมพันธภาพและให้คำปรึกษา หลังจากออกจากโรงพยาบาลภายใน 2 สัปดาห์ จะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน และจะเยี่ยมบ้านทุก 2 สัปดาห์ จนกระทั่งถึงที่วัดอุประสงค์ การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อปรับขนาดของยา β-blocker ตามแนวทางปฏิบัติของการให้การรักษาด้วยยา β-blocker รวมทั้งให้คำปรึกษาและความรู้เรื่องการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การงดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน การเฝ้าระวังเรื่องน้ำหนัก การจำกัดอาหารที่มีโซเดียม และการจัดการกับอาการที่เลวลง รวมทั้งการตัดสินใจจัดการกับอาการที่ผิดปกติ เช่น การปรับยา การปรับเปลี่ยนแผนแผนการดำเนินชีวิต ประเมินผลการศึกษา คือ		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 3 (ต่อ)	การออกแบบวิจัย/ระดับ	การดำเนินการวิจัย (ต่อ) เปรียบเทียบผลลัพธ์ ด้านภาวะการ ทำหน้าที่ด้วย the New York Heart Association functional class, echo cardiogram ขณะอยู่โรงพยาบาลและ หลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 6 เดือน และอัตราการกลับเข้ามารักษา ซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้ม เหลว ภายใน 6 เดือน		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 4 A randomized controlled trial of a community nurse-supported hospital discharge programme in older patients with chronic heart failure.	วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ ความคุ้มค่าต้นทุนของ โปรแกรม การสนับสนุนช่วยเหลือจาก พยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วย สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เรื้อรังหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ในการป้องกันการกลับเข้ามารักษา ซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน และการเพิ่มภาวะการทำหน้าที่	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล น้อยครั้ง จำนวน 105 ราย อายุ 60 ปี ขึ้นไป สถานที่ The medical wards in Prince of Wales Hospital (PWH), a major teaching hospital in Hong Kong.	- ณ เวลา 6 เดือน อัตราการกลับ เข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง สถิติ (กลุ่มทดลองร้อยละ 46 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 57 $p = .233$) ภาวะการทำหน้าที่ (การเดินใน 6 นาที) และค่าใช้จ่าย ในการรักษาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	ข้อดีของงานวิจัย - มีการคัดเลือกแบบสุ่ม ข้อจำกัดของงานวิจัย - การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ได้ นำค่าใช้จ่ายทางอ้อมของ ผู้ป่วยมารวมด้วย ข้อจำกัดของการนำไปใช้ - ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ
ผู้เขียน Kwok, Lee, Woo, Lee, & Griffith. (2008)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มทดลองจำนวน 49 ราย ได้รับ การเชื่อมจากพยาบาลชุมชน คือ ภายใน 7 วัน ก่อนการจำหน่ายจาก โรงพยาบาล และหลังการจำหน่าย		การนำไปใช้ - การได้รับการดูแลและได้รับ การสนับสนุนจากพยาบาล ชุมชนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่ ต้องการการพึ่งพาได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 4 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำกลับบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง วัดผลประสิทธิภาพการเชื่อมโยงบ้าน คือเพื่อให้ผู้ป่วยรักษา เรื่องภาวะสุขภาพ การรับประทานอาหาร แนะนำนำเรื่องอาหาร และผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับพยาบาลชุมชนเมื่อมีอาการผิดปกติทั้งทางพฤติกรรมและโทรศัพท์มือถือ กลุ่มควบคุมจำนวน 56 ราย ได้รับการดูแลแบบปกติ การศึกษามีการประเมินภาวะการทำหน้าที่ด้วยการเดินใน 6 นาที เครื่องมือที่ใช้ประเมินด้านการรู้คิดและภาวะจิตสังคม คือ Abbreviated Mental Test (AMT), General Health Questionnaire (GHQ) และ London Handicap Scale (LHS) การศึกษามีระยะการติดตาม 6 เดือน		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์แต่ละสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 5 Telehome monitoring in patients with cardiac disease who are at high risk of readmission.	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรม Telehome monitoring โดยใช้โปรแกรมระบบ video conference เพื่อเฝ้าระวังเรื่อง การกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 3 เดือน และ 1 ปี คุณภาพชีวิตและภาวะการทำหน้าที่	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน 249 ราย สถานที่ The University of Ottawa Heart Institute, Canada	-โปรแกรม telehome monitoring สามารถลดจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล และการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลทั้งภายใน 3 เดือนและ 1 ปี ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .02, p = .04$ ตามลำดับ) แต่ในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ -สามารถเห็นอาการของผู้ป่วย เช่น หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก -ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมารักษาซ้ำ
ผู้เขียน Woodend et al. (2008)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 121 ราย และผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบจำนวน 128 ราย วิธีการ คือ ใช้ระบบวิดีโอ (video conferencing) ติดต่อสื่อสารกับพยาบาลทุกวัน เพื่อส่งข้อมูล นำหนัก ความดันโลหิต และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องมือ	-สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและภาวะการทำหน้าที่ทั้งในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$)	ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -ใช้ประมาณมาก มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะนำมาใช้ในประเทศไทย

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 5 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย the Minnesota Living with heart failure (LiHf) questionnaire ใช้ประเมินอาการและภาวะการทำ หน้าที่ สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว the Seattle Angina Questionnaire (SAQ) สำหรับภาวะ angina และ Short Form 36 (SF-36) สำหรับ วัดคุณภาพชีวิต		การนำไปใช้ -การใช้ระบบวิดีโอสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในการเฝ้า ระวังและติดตามดูแลผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวหลังจำหน่าย ออกจากโรงพยาบาล

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 6 Effectiveness of visit from community pharmacists for patients with heart failure: HeartMed randomized controlled trial	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยการเยี่ยมบ้านของเภสัชกรชุมชน (community pharmacists)	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 292 ราย อายุ > 18 ปี	-การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลที่หน่วยฉุกเฉินภายใน 6 เดือน ของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม (134 และ 112 ครั้ง, RR = 1.15, 95% CI = 0.89 - 1.48; p = .28) -อัตราการตายในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม (30 และ 24 ราย, hazard ratio = 1.18, 0.69 - 2.03; p = .54)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
ผู้เขียน Holland, Brooksby, Lenaghan, Ashton, Hay, & Smith., et al. (2007)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการจัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 149 ราย และกลุ่มควบคุมจำนวน 143 ราย กลุ่มทดลองจะได้รับการดูแลหลังจากจำหน่ายโดยเภสัชกรชุมชนจะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านภายใน 2 สัปดาห์หลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อพบกับผู้ป่วยและผู้ดูแล ในขณะที่ผู้ป่วยจะให้ความรู้เรื่องภาวะหัวใจล้มเหลวและยาที่ผู้ป่วย	ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยเฉพาะหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล	การนำไปใช้ -การให้การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่บ้าน เฉพาะเภสัชกรชุมชนไม่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลหรือเพิ่มผลลัพธ์ทางคลินิกได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 6 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ได้รับในการรักษา แนะนำเรื่อง อาหาร การออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การเฝ้าระวังอาการผิดปกติโดยผู้ป่วยจะ ได้รับแบบบันทึกอาการและนำบันทึกตัว หลังจากการเยี่ยมครั้งแรก ต่อมา 6-8 สัปดาห์ หลังการจำหน่าย เกณฑ์การประเมินจะเปลี่ยน บ้านผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อประเมินอาการและ ให้คำแนะนำ การประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ที่หน่วยฉุกเฉินภายใน 6 เดือน อัตราการตาย และคุณภาพชีวิตซึ่งวัดด้วย the Minnesota Living with heart failure questionnaire, the EQ-D5 score เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ที่ได้รับการดูแลแบบปกติ		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ห้และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 7 Extending the horizon in chronic heart failure effects of multidisciplinary, home-base intervention relative to usual care.	วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลของการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ ในการเชื่อมบ้าน กับการดูแลแบบปกติ	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 297 ราย อายุ ≥ 55 ปี ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน และมีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ≥ 1 ครั้ง	-อัตราการตายในกลุ่มทดลองน้อยกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (114 ราย และ 132 ราย, $p = .0006$) -ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีอายุยืนมากกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (7 เดือน และ 4 เดือน, $p = .0144$) -อัตราการกลับเข้ารับรักษาโดยไม่ได้วางแผนต่อคนต่อปีในกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .039$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ
ผู้เขียน Inglis, Pearson, Treen, Gallasch, Horowitz, & Stewart (2006)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	สถานที่ Adelaide, South Australia. การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดย การคัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่ม ควบคุมจำนวน 148 ราย ได้รับการ ดูแลแบบปกติ คือ การมาตรวจตาม นัดกับแพทย์เจ้าของไข้ และแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคหัวใจที่คลินิก ผู้ป่วยนอกหลังจำหน่าย 14 วัน	จำนวนวันนอนโรงพยาบาลเมื่อกลับมา รักษาซ้ำของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (กลุ่มทดลอง 8.2 ± 5.5 วันและกลุ่ม ควบคุม 8.8 ± 6.5 วัน) -ค่าใช้จ่ายในการรักษาในกลุ่มทดลอง ลดลง 1,729 ดอลลาร์ต่อปี	การนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ ในการติดตามเยี่ยมบ้าน สามารถ เพิ่มผลลัพธ์มากกว่าการนัดผู้ป่วย มาพบแพทย์ตามนัดที่คลินิก ผู้ป่วยนอก

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 7 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) กลุ่มทดลองได้รับการดูแลเช่นเดียวกับกลุ่มควบคุมร่วมกับการเยี่ยมบ้านหลังจากจำหน่ายภายใน 7-14 วัน โดยพยาบาลและเภสัชกรหรือพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจระหว่างการเยี่ยมผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายการพบทวนความรู้ และประเมินด้านการสนับสนุนทางสังคมหลังจากนั้นจะโทรศัพท์ติดต่อเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาจะประเมินข้อมูลอัตราการตายจากทุกสาเหตุ การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลหลังจากจำหน่ายภายใน 1 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษา การติดตามผู้ป่วยระยะเวลา 10 ปี		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 8 A meta-analysis of the effect of hospital based case management on hospital length of stay and readmission.	วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจประสิทธิผลของระบบ การดูแลแบบการจัดการรายกรณี เปรียบเทียบกับมาตรฐานแบบปกติ ในเรื่องของจำนวนวันนอน และ การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล	กลุ่มตัวอย่าง รายงานการวิจัยแบบ RCT จำนวน จำนวน 12 เรื่อง มีจำนวนผู้ป่วย 2,876 ราย ได้รับการวินิจฉัย คือ heart failure, COPD, frail elder, critical illness, epilepsy, และ stroke ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ	-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยใน แบบการจัดการรายกรณี ของผู้ป่วย โดยรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติทั้งจำนวนวันนอนและการ กลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล -การดูแลผู้ป่วยในแบบการจัดการ รายกรณีในกลุ่มผู้ป่วย heart failure มีประสิทธิผลในการลดจำนวนวัน นอนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (OR = 0.241; 95% CI = 0.012-0.470) แต่ไม่สามารถลดการกลับเข้ามารักษา ซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (OR = 0.749; 95% CI = 0.446 -1.025)	ข้อดีของงานวิจัย -เป็นการรวบรวมงานวิจัยมา วิเคราะห์เชิงปริมาณ จากงาน วิจัยที่เป็นแบบ RCT ข้อจำกัดของงานวิจัย -มีงานวิจัยจำนวนน้อย -การอธิบายถึงวิธีการดำเนินการ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่ชัดเจน ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ป่วยใน -กลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัย โรคแตกต่างกัน การนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ม เหลวแบบ case management มีประสิทธิผลในการลดจำนวน วันนอนโรงพยาบาลได้
ผู้เขียน Kim & Soeken (2005)	การออกแบบวิจัย A meta-analysis Level A	สถานที่ School of nursing, University of Maryland, Baltimore, USA. การดำเนินการวิจัย สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลใน คอมพิวเตอร์, foot note และการ พบกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศึกษามีเกณฑ์ คัดเลือกงานวิจัย คือ 1. เป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. เป็นการดูแลผู้ป่วยใน		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 8 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) 3. เป็นการออกแบบการวิจัยแบบ RCT 4. เป็นข้อมูลที่แสดงถึงผลการวัดผลลัพธ์ ในเรื่องจำนวนวันนอนและการกลับ เข้ามารักษาในโรงพยาบาล ฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้น คือ MEDLINE (1966-2003) CINAHL (1982-2003) และ HealthSTAR (1975-2003) ผลการสืบค้น ได้งานวิจัยที่เป็นภาษา อังกฤษ แบบ RCT จำนวน 12 เรื่อง		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 9 Discharge education improves clinical outcomes in patients with chronic heart failure	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ตาม แบบแผนการจำหน่าย ต่อการกลับ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลภายใน 30 วัน จำนวนวันนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย และอัตราการตายในผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลว	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 223 ราย สถานที่ The University of Michigan Hospital, USA. การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการ คัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 116 ราย ได้รับความรู้ตามปกติ และกลุ่มทดลองจำนวน 107 ราย ได้รับ ความรู้จากพยาบาลเป็นรายบุคคลตาม แบบแผนการจำหน่าย โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง และหลังจากออกจากโรงพยาบาล จะโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล การดูแลตนเองในวันที่ 30, 90 และ 180 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ the Minnesota Living with heart failure	ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีการกลับเข้ารับ รักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) -ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีจำนวนวันนอนโรง พยาบาลน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ ($p < .01$) -อัตราการตายในผู้ป่วยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ($p < .01$) -ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยรวมกับค่า intervention ในกลุ่มทดลองน้อยกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของงานวิจัย -การวัดพฤติกรรมการ ดูแลตนเองไม่ชัดเจน
ผู้เขียน Koelling, Johnson, Cody, & Aaronson (2005)	การออกแบบวิจัย RCT Level A			การนำไปใช้ -การให้ความรู้ยังมีแบบ แผนแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล และการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย หลังการจำหน่าย โดยใช้ โทรศัพท์ สามารถเพิ่มผล ดีพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 10 A systematic review and meta-analysis of studies comparing readmission rates and mortality rates in patients with heart failure	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ อัตราการกลับเข้ามารักษาใน โรงพยาบาลภายใน 90 วัน และ อัตราการตายของกลุ่มผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวที่ได้รับ โปรแกรม การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ การดูแลแบบปกติ	กลุ่มตัวอย่าง รายงานการวิจัยแบบ RCT จำนวน 8 เรื่อง เป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,239 ราย	กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 71.0 – 80.3 ปี -งานวิจัย 5 เรื่อง ใช้การเชื่อมโยงบ้าน อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายหลังการจำหน่าย 3 เรื่อง ใช้การติดตามที่คลินิกภาวะ หัวใจล้มเหลว และถ้าผู้ป่วยเลือกที่จะ ไม่มาที่คลินิก ผู้วิจัยจะใช้วิธีการโทร - ศัพท์ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง และมี งานวิจัย 1 เรื่อง ผู้วิจัยใช้การติดตาม โดยพยาบาลชุมชนเชื่อมโยงบ้านตามความ จำเป็นและมีงานวิจัยอีก 1 เรื่อง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยอื่น คือ ผู้วิจัยใช้การ สื่อสารทางอีเมลล์ ร่วมกับ การโทรศัพท์ -จากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่าโปรแกรม การดูแลผู้ป่วยจากสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการจำหน่าย กับ การติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการจำหน่าย สามารถลดการกลับเข้ามารักษาใน ทุกสาเหตุ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (RR= 0.79, 95% CI=0.68-0.91,	ข้อดีของงานวิจัย -เป็นการรวบรวมงานวิจัยมา วิเคราะห์เชิงปริมาณ จาก งานวิจัยที่เป็นแบบ RCT ข้อจำกัดของงานวิจัย -มีงานวิจัยจำนวนน้อยใน การนำมาวิเคราะห์
ผู้เขียน Gwadrý-Sridher, Flintoft, Lee, Lee, & Guyatt. (2004)	การออกแบบงานวิจัย การรวบรวมงานวิจัย (meta-analysis) แบบ RCT จำนวน 8 เรื่อง Level A	การดำเนินงานวิจัย ทีมผู้ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ ประกอบด้วย พยาบาล เกสซิก, cardiologist และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอายุรศาสตร์ ทำการศึกษาโดย สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PubMed, HealthSTAR, EMBASE และ MEDLINE จากการ สืบค้นด้วยมือ และสืบค้นจากเอกสาร อ้างอิงของงานวิจัย กำหนดปีในการ สืบค้น คือ ปี 1966 – 2000 มีเกณฑ์	การนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรมการดูแลจากสหสาขา วิชาชีพ ซึ่งมีการติดตามผู้ป่วย ภายหลังการจำหน่ายโดยใช้หลาย วิธีร่วมกัน ทั้งการเขียนบ้าน การติดตามที่คลินิกภาวะหัวใจ ล้มเหลว การใช้โทรศัพท์ การใช้อีเมลล์ และใช้พยาบาล	การนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรมการดูแลจากสหสาขา วิชาชีพ ซึ่งมีการติดตามผู้ป่วย ภายหลังการจำหน่ายโดยใช้หลาย วิธีร่วมกัน ทั้งการเขียนบ้าน การติดตามที่คลินิกภาวะหัวใจ ล้มเหลว การใช้โทรศัพท์ การใช้อีเมลล์ และใช้พยาบาล

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 10 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ในการคัดเลือกงานวิจัย ดังนี้ 1. เป็นงานวิจัยแบบ RCT ที่ศึกษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว 2. เน้นโปรแกรมการให้ความรู้ ร่วมกับ การดูแลหลังการจำหน่าย 3. รายงานผลลัพธ์การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ได้วางแผนจากการสืบค้น ได้งานวิจัยแบบ RCT ทั้งหมด 8 เรื่อง และนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ	$p < .001$) แต่ไม่มีผลในการลดอัตรา การตาย (RR= 0.98, 95% CI= 0.72- 1.34, $p < .90$)	การนำไปใช้ (ต่อ) ชุมชน ในการดูแลหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสามารถลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 11 Comprehensive discharge planning with post discharge support for older patients with congestive heart failure.	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อลดค่าใช้จ่าย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว และเพื่อหา อัตราการกลับเข้ารับรักษาใน รพ. สาเหตุการตาย จำนวนวันนอน คุณภาพชีวิต และค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยแบบ RCT จำนวน 18 เรื่อง ผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จาก 8 ประเทศ จำนวน 3304 ราย	ผลการศึกษา -ครั้งหนึ่งของผู้ป่วยที่มีอยู่มากกว่า 65 ปีมีภาวะของหัวใจล้มเหลว กลับเข้ารับรักษาใน โรงพยาบาลภายใน 6 เดือนหลังจำหน่าย ทั้งนี้เป็นผล จากขาดการประเมินความพร้อมเรื่อง การจำหน่าย ความล้มเหลวเรื่องการ ติดต่อสื่อสาร การส่งต่อข้อมูลจาก โรงพยาบาลหลัก มีการวางแผน จำหน่ายที่ไม่สมบูรณ์ ขาดการติดตาม ผู้ป่วย ขาดความร่วมมือในการดูแล ผู้ป่วยและโปรแกรมการวางแผน จำหน่ายไม่มีประสิทธิภาพ -งานวิจัยทั้งหมดเป็นการประยุกต์ ใช้วิธีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวสูงอายุแบบครอบคลุม ร่วมกับ การติดตามดูแลหลังจำหน่าย ระยะเวลาการติดตามอยู่ในช่วง 3-12 เดือน	ข้อดีของงานวิจัย -เป็นการรวบรวมงานวิจัย นาวเคราะห์เชิงปริมาณ จาก งานวิจัยที่เป็นแบบ RCT -กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
ผู้เขียน Phillips et al. (2004)	วัตถุประสงค์ การออกแบบงานวิจัย การรวบรวมงานวิจัย (meta-analysis) แบบ RCT จำนวน 18 เรื่อง Level A	การดำเนินการวิจัย ผู้ศึกษาค้นหาข้อมูลจาก MEDLINE (1996-2003), Cochrane (ทุกปี) และ Social Science Citation Index (1996-2003), เลือกองงานวิจัยที่เป็น ภาษาอังกฤษ ได้ผลงานวิจัยแบบ RCT จำนวน 18 เรื่อง และนำมา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็น ระบบ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการดูแลผู้ป่วยและผลลัพธ์ของ วิธีการดูแลนั้นๆ	ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย สูงอายุ	การนำไปใช้ -การวางแผนจำหน่ายแบบ ครอบคลุมและการติดตาม ดูแลภายหลังการจำหน่ายจาก โรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวสูงอายุ

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 11 (ต่อ)			-จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยแบบครอบครัว ช่วยลดการกลับเข้าโรงพยาบาลได้ การตายในทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น มีการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลง ค่าใช้จ่ายในการรักษามีแนวโน้มแตกต่างกันและลดลง ส่วนจำนวนวันนอนโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาทันทีในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 12 Randomized trial of an education and support intervention to prevent readmission of patient with heart failure.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นระบบต่อการกลับเข้ามารักษาทันทีในโรงพยาบาล อัตราการตาย และค่าใช้จ่ายในการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 88 ราย สถานที่ Yale New Haven Hospital, USA.	ผลการวิจัย -ภายใน 1 ปีหลังจำหน่ายมีผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้งในผู้ป่วยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (25 ราย, ร้อยละ 56.8 และ 36 ราย, ร้อยละ 81.8, $p = .01$) -ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นระบบสามารถลดจำนวนรวมของการกลับเข้ามารักษาทันทีในโรงพยาบาล ได้ร้อยละ 39 (49 ครั้ง และ 80 ครั้ง, $p = .006$) -ค่าใช้จ่ายในการรักษาของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (\$ 14,420 และ \$ 21,935 $p = .02$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ข้อจำกัดของงานวิจัย -การวิเคราะห์ผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายที่ใช้กับกลุ่มทดลองโดยประมาณจากระบบ ร.พ. ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลด้วย การนำไปใช้ -การให้ความรู้และการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นระบบระบบทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและหลังจำหน่ายโดยการเยี่ยมบ้านและการโทรศัพท์
ผู้เขียน Krumholz, Amatruda, smith, Matterna, Rumanis, Redford, Crombie, & Vaccarino (2002)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการศึกษาเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 44 ราย ได้รับการความเข้าใจพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ เป็นรายบุคคลพร้อมกับหนังสือคู่มือ และหลังจากจำหน่ายจะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในรายที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับตามดูแลแบบต่อเนื่อง โดยการโทรศัพท์สัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 12 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) 4 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ 1 ครั้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์และหลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง จนครบระยะเวลาติดตาม 1 ปี กลุ่มควบคุมจำนวน 44 ราย ได้รับการ ดูแลแบบปกติ และได้รับการติดตาม คำสั่งการรักษาของแพทย์		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์แต่ละสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 13 Effect of a standardized nurse case-management telephone intervention on resource use in patient with chronic heart failure.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติวิธีการจัดการการรักษาระดับ การวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ แนะนำผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 358 ราย	อัตราการมาโรงพยาบาล ที่ 3 เดือน: ลดลงร้อยละ 45.7 กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .03$) ที่ 6 เดือน: ลดลงร้อยละ 47.8 กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .01$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดลอกแบบผู้ป่วย -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
ผู้เขียน Riegel et al. (2002)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	สถานที่ 2 Southern California Hospitals, USA. การดำเนินการวิจัย -แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจำนวน 130 ราย ได้รับการดูแลจากผู้จัดการรายกรณี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น ในการแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารและการสังเกตอาการที่ผิดปกติ หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลภายใน 5 วัน และช่วยจัดการกับอาการที่ผิดปกติ เช่น น้ำหนักเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือได้	อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวลดลงร้อยละ 36 กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .03$) ทั้งที่ 3 เดือนและ 6 เดือน -การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล จากทุกสาเหตุ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .06$) ทั้งที่ 3 เดือน และ 6 เดือน -จำนวนวันนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่ 3 เดือน: ลดลงร้อยละ 45.9	การนำไปใช้ -ระบบการจัดการรายกรณี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบอัตโนมัติแนะนำผ่านทางโทรศัพท์และการให้ผู้ป่วยโทรศัพท์ปรึกษาได้ทันทีเมื่อมีปัญหา และลดการมาโรงพยาบาลได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 13 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) เมื่อจำเป็น และกลุ่มควบคุมจำนวน 228 ราย ได้รับการดูแลตามปกติ	กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (0.85 ± 2.3 วัน และ 1.6 ± 3.9 วัน, $p = .06$) ที่ 6 เดือน: ลดลงร้อยละ 46.4 กลุ่ม ทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ (1.1 ± 3.1 วัน และ 2.1 ± 4.6 วัน, $p = .05$) -ค่าใช้จ่ายในการรักษาสำหรับผู้ป่วยใน ที่ 3 เดือนและที่ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 35 และ 45.5 กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .07$)	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์แต่ละสังเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 14 Home-based intervention in congestive heart failure long-term implications on readmission and survival.	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านใน ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่เกี่ยวข้องกับการกลับเข้ารับรักษา ซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 30 วัน อัตราการรอดชีวิต และค่าใช้จ่าย	กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยภาวะหัวใจ ล้มเหลวจำนวน 297 ราย อายุ ≥ 55 ปี สถานที่ Adelaide University South Australia การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกแบบสุ่มแบ่ง เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 149 ราย ได้รับการเยี่ยมบ้านหลังจาก จำหน่ายจากโรงพยาบาลภายใน 7-14 วัน โดยพยาบาลและเภสัชกร เพื่อประเมินอาการ ทบทวนความรู้ แบบแผนการรักษาและแหล่งสนับสนุน เส้นทางสังคม กลุ่มควบคุมจำนวน 148 ราย ได้รับการดูแลแบบปกติ การศึกษาวิเคราะห์การติดตาม 6 ปี	-การศึกษามีระยะการติดตามอยู่ระหว่าง 3-6 ปี ค่ากลางเท่ากับ 4.2 ปี -การเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลใน กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (เฉลี่ย 0.21 กับ 0.37 คนต่อเดือน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .01$) -ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีอายุยืนกว่ากลุ่ม ควบคุม (เฉลี่ย 40 กับ 22 เดือน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) -อัตราการตายในกลุ่มทดลองน้อยกว่า กลุ่มควบคุม (56% กับ 65%) อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ($p = .06$) -ค่าใช้จ่ายในการรักษาของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (325 กับ 660 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ ($p < .01$)	ข้อดีของงานวิจัย -ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจ ล้มเหลวทั้งรายใหญ่และรายสูงอายุ -ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ ≥ 55 ปี และจำหน่ายกลับบ้าน -ไม่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการ วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด หัวใจ

การนำไปใช้

-การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวหลังจำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล มีประโยชน์ใน
การลดการกลับเข้ารับรักษาและ
ผู้ป่วยมีอายุยืนขึ้น

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 15 Randomised controlled trial of specialist nurse intervention in heart failure.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติกร พยาบาลของพยาบาลเฉพาะ ทางสามารถเพิ่มผลลัพธ์ใน การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจ ล้มเหลวหรือหรือไม่	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลด้วยการ ฉุกเฉิน จำนวน 165 ราย สถานที่ The Westren Infirmary, Glasgow, Scotland. การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการ คัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 84 ราย ได้รับการดูแลจาก พยาบาลเฉพาะทางก่อนจำหน่ายออก จากโรงพยาบาลร่วมกับติดตามเยี่ยมบ้าน จากโรงพยาบาลร่วมกับติดตามเยี่ยมบ้าน หลังจำหน่ายและใช้โทรศัพท์ติดต่อเมื่อ จำเป็น กลุ่มควบคุมจำนวน 81 ราย ได้ รับการดูแลแบบปกติ วัดผลลัพธ์การ กลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 1 เดือน อัตราการตาย และจำนวน วันนอนในโรงพยาบาล	การกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล จากทุกสาเหตุของผู้ป่วยกลุ่ม ทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (86 และ 114; p = .018) -การเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ด้วยสาเหตุภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม ควบคุม (19 และ 45; p < .001) -จำนวนวันนอนในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยกลุ่มทดลองน้อยกว่า กลุ่มควบคุม (เฉลี่ย 3.43 และ 7.46 วัน; p = .0051) -อัตราการตายของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 25 และ 25 p = .081)	ข้อดีของงานวิจัย -ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจ ล้มเหลวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดของ การติดตามหลังจำหน่าย นอก แต่เพียงว่า ลดจำนวนครั้งของ การเยี่ยมบ้านลง และเพิ่มการ ติดตามโดยใช้โทรศัพท์ การนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจ ล้มเหลวโดยพยาบาลเฉพาะทาง การติดตามเยี่ยมบ้าน และการ ใช้โทรศัพท์ติดตาม ช่วยเพิ่ม ผลลัพธ์ทางการพยาบาลได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 16 Reducing the cost of frequent hospital admissions for congestive heart failure a randomized trial of home telecare intervention.	วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 3 รูปแบบ ในการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ภายใน 6 เดือน คือ 1. การสื่อสารแบบ 2 ทางโดยใช้ video-conference ผสมผสานกับ electronic stethoscope 2. พยาบาล โทรศัพท์พูดคุย และ 3. การดูแลแบบผู้ป่วยนอกตามปกติ	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จำนวน 37 ราย มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และได้รับการวินิจฉัยว่า CHF สถานที่ The University of California Davis (UCD) Hospital, USA.	-ค่าเฉลี่ยของ SF-36, MLHFQ และ CSQ score ของทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ -ค่าใช้จ่ายในการรักษาของกลุ่ม home telecare (\$ 5,850, SD \$21,094) น้อยกว่ากลุ่ม telephone care (\$ 7,320, SD = \$ 24,440) และน้อยกว่ากลุ่ม usual care (\$ 44,479, SD = \$121,214) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p = .2620$ -การเข้ารักษาที่หน่วยฉุกเฉิน ทั้งกลุ่ม home telecare และกลุ่ม telephone care น้อยกว่ากลุ่ม usual care อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p = .0342$ -การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว หรือจากทุกสาเหตุ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p = .1559$ และ $p = .4590$	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -ผู้ป่วยต้องมีการติดตามต่อเนื่อง โทรศัพท์ที่บ้าน -ใช้งบประมาณมาก
ผู้เขียน Jerant, Azari, & Nesbitt (2001)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม โดยคัดเลือกแบบสุ่ม กลุ่มที่ 1 home telecare จำนวน 13 ราย กลุ่มที่ 2 telephone care จำนวน 12 ราย กลุ่มที่ 3 usual care จำนวน 12 ราย วัดผลลัพธ์การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล การมาที่หน่วยฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายในการรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 16 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) the Minnesota Living with heart failure questionnaire (MLHFQ), the MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), the Folstein Mini-Mental State Examination (MMSE), the 15-Item Geriatric Depression Scale (GDS), the Physical Self-maintenance Scale (PSMS) และ the Symbol Digit Modalities Test (SDMT) การศึกษามีระยะเวลาติดตาม 180 วัน		การนำไปใช้ -การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยที่บ้านโดยการ ใช้ video-conference และใช้โทรศัพท์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและลดการมาที่ห้องฉุกเฉิน

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 17 Randomized, controlled trial of long-term moderate exercise training in chronic heart failure : Effects on functional capacity, quality of life, and clinical outcome.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกาย ต่อการเพิ่มภาวะการทำงานที่ คุณภาพ ชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่ง ส่งผลประโยชน์ถึงผลลัพธ์ทางคลินิก	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการ คงที่จำนวน 99 ราย มีค่า EF $\leq 40\%$ เพศชาย 88 ราย เพศหญิง 11 ราย สถานที่ Department of medicine, Columbia University, USA.	-กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 59 ± 14 ปี และมีภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งเกิดจาก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร้อยละ 85 -ที่ 2 เดือน ผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกออก กำลังกายมี peak VO ₂ และ thallium activity score เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ($P < .001$) คือ ร้อยละ 18 และร้อยละ 24 ตามลำดับ แต่หลังจาก 12 เดือน ไม่เปลี่ยนแปลง	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลว ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย
ผู้เขียน Romualdo, Demetrios, Giovanni, & Augusto. (1999)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มโดยการ คัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 50 ราย ได้รับการฝึกออกกำลัง กาย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ หลังจากนั้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และกลุ่มควบคุมจำนวน 49 ราย ไม่ได้รับการฝึกออกกำลังกาย การศึกษา มีระยะเวลา 14 เดือน โดยก่อนการศึกษา และระหว่างการศึกษาในเดือนที่ 2 และ เดือนที่ 14 ผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการ	-ผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกออกกำลังกาย มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด เพิ่มขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น กว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .001$) -ที่ 2 เดือน และหลังจาก 12 เดือน ผู้ป่วย กลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .001$) -อัตราการตายในผู้ป่วยกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ	การนำไปใช้ -การฝึกออกกำลังกายใน ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ช่วยเพิ่มความสามารถใน การทำงานที่ของร่างกาย คุณภาพชีวิต และผลลัพธ์ ทางคลินิกได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 17 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ประเมินด้วย การตรวจ cardiopulmonary exercise test, echocardiographic study, thallium myocardial scintigraphy และ แบบสอบถามคุณภาพชีวิต	ทางสถิติ (9 ราย และ 20 ราย ตามลำดับ, P = .01) -การกลับเข้ามารักษาน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ในผู้ป่วยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (5 ราย และ 14 ราย ตามลำดับ, P = .02)	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 18 Prolonged beneficial effects of home-based intervention on unplanned readmission and mortality among patients with congestive heart failure.	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการดูแลระยะยาวของการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ได้วางแผน ภายใน 18 เดือน และอัตราการตาย	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ารับรักษาจำนวน 97 ราย สถานที่ The Cardiology Unit Queen-Elizabeth Hospital/University South Australia การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มโดยการคัดเลือกแบบสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 49 ราย และกลุ่มควบคุม 48 ราย กลุ่มทดลองจะได้รับการเยี่ยมบ้านหลังจำหน่าย 1 สัปดาห์โดยพยาบาลและเภสัชกร เพื่อจัดการเรื่องยา ให้ความรู้เรื่องยา วัตถุประสงค์และผลของการให้ยาและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ การศึกษา มีระยะเวลาติดตามนาน 18 เดือน และกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลแบบปกติ	-การเข้ามารักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ได้วางแผนในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (64 และ 125, $p = .02$) -จำนวนวันนอนโรงพยาบาลในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .02$) -ค่าใช้จ่ายในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .02$) -อัตราการตายในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (2 และ 9, $p = .02$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่รักษาด้วยวิธีการใช้ยาและการผ่าตัด -ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกลุ่มควบคุม การนำไปใช้ -การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหลังจำหน่ายสามารถลดค่าใช้จ่ายลดการกลับเข้ารับรักษาและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 19 Effect of a multidisciplinary, home-based intervention on unplanned readmission and survival among patients with chronic congestive heart failure : A randomized controlled study.	วัตถุประสงค์ -เพื่อศึกษาอัตราการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลโดย ไม่ได้วางแผนและอัตราการ ตายภายใน 6 เดือนภายหลัง จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล การออกแบบวิจัย RCT	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลัง ภายหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยา- บาล อายุ ≥ 55 ปี จำนวน 200 ราย สถานที่ Department of Cardiology, Queen Elizabeth Hospital/University of Adelaide and Department of General Practice, University of Adelaide, South Australia, Australia.	ระหว่างการติดตามภายใน 6 เดือน -การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล โดยไม่ได้อำนาจแผนในผู้ป่วยกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (68 และ 118 ครั้ง, $p = .031$) -อัตราการตายในผู้ป่วยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (18 และ 28 ราย, $p = .098$) -จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญ (460 และ 1173 วัน, $p = .02$) -ค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยกลุ่ม ทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย สำคัญ (490,000 และ 922,600 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย, $p = .16$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของงานวิจัย -อาจเป็นไปได้อีกว่ากลุ่มทดลอง ได้รับการดูแลรักษาที่ครอบคลุม จากแพทย์จึงทำให้มีอาการคงที่ ทำให้เกิดอคติว่าไม่ใช้เกิดจาก intervention การนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ม เหลว ภายหลังจากจำหน่ายออก จากโรงพยาบาลโดยใช้สห สาขาวิชาชีพ และติดตามเยี่ยม บ้าน โดยใช้พยาบาลชำนาญ การเฉพาะทางโรคหัวใจ หลังจำหน่าย 7-14 วัน และ
ผู้เขียน Stewart, Marley, & Horowitz (1999)	Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จำนวน 100 รายได้รับ		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 19 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) การดูแล โดยสหสาขาวิชาชีพ มีการเยี่ยมบ้านหลังจำหน่าย 7-14 วัน โดยพยาบาลชำนาญการเฉพาะโรคหัวใจ ระหว่างการเยี่ยมพยาบาลจะประเมินอาการ ให้ความรู้เรื่องโรคและการรักษา แนะนำเรื่องอาหาร การทำกิจกรรม การจัดการกับอาการที่แสบ และแนะนำแหล่งสนับสนุนจากชุมชน หลังจากการเยี่ยมพยาบาลจะส่งรายงานของผู้ป่วยเพื่อปรึกษากับ cardiologist และมีการติดตาม โดยใช้โทรศัพท์ในเดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 และเมื่อผู้ป่วยกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 2 ครั้งภายใน 6 เดือนนี้ จะกลับไปเยี่ยมบ้านอีกครั้ง กลุ่มควบคุมจำนวน 100 ราย ได้รับการดูแลแบบปกติ วัดผลลัพธ์ การกลับเข้ามารักษา และการตายภายใน 6 เดือน	การนำไปใช้ (ต่อ) การติดตาม โดยใช้โทรศัพท์ ช่วยลดอัตราการกลับเข้ามารักษา โดยไม่ได้วางแผน และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา เพิ่มการรอดชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 20 Cost effective management programme for heart failure reduces hospitalization	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ จัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ต่อการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษา	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับรักษา ในโรงพยาบาลจำนวน 190 ราย	อัตราการตายของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (กลุ่มทดลองร้อยละ 30 และ กลุ่มควบคุมร้อยละ 28) -เวลาหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล- balจนถึงกลับเข้ารับรักษาในชุมชน ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ ($p < .05$) -การกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล ภายใน 1 ปี ในกลุ่มทดลองน้อยกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .08$) -ค่าใช้จ่ายในการรักษาของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (US \$1,628 และ US \$3,081 $p = .07$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
ผู้เขียน Cline, Israelsson, Willenheimer, Broms, & Erhardt. (1998)	การออกแบบวิจัย Prospective, randomized trial Level A	สถานที่ University hospital with a primary catchment area of 250,000 inhabitants, Sweden.	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการ คัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 80 ราย ได้รับโปรแกรมการจัด การผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว "ได้แก่ 1. ขณะอยู่โรงพยาบาล ผู้ป่วยและ ผู้ดูแลจะได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ โดยพยาบาล ใช้เวลาครั้งละ 30 นาที 2 ครั้ง และหลังจำหน่าย 2 สัปดาห์ จะ ได้รับการให้ความรู้เป็นกลุ่มที่คลินิก ผู้ป่วยนอกใช้เวลา 1 ชั่วโมงอีก 1 ครั้ง	ข้อจำกัดของงานวิจัย -จำนวนกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 20 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) 2. การสอนผู้ป่วยในเรื่องการปรับขนาดยาขับปัสสาวะตามอาการที่แสดง (น้ำหนักขึ้น บวมบริเวณเนื้อข้อเท้า หอบเหนื่อยและอ่อนล้า) หรือ อาการของภาวะขาดน้ำ (น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว) 3. การติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย โดยนัดผู้ป่วยมาพบแพทย์โดยตรง ที่คลินิกผู้ป่วยนอก กลุ่มควบคุมจำนวน 110 ราย ได้รับการดูแลแบบปกติ การศึกษามีระยะเวลา 1 ปี และผลลัพธ์ คือ ระยะเวลาหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจนถึงกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล จำนวนวันนอน และค่าใช้จ่ายในการรักษา		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาระหว่างผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 21 Effects of a home-base intervention among patients with congestive heart failure discharge from acute hospital care.	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหลังการ จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยพยาบาลและเภสัชกร ต่อการ กลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ภายใน 6 เดือน และอัตราการตาย	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มี ความถี่สูงต่อการกลับเข้ามา รักษา จำนวน 97 ราย สถานที่ The Commonwealth Department of Health and Family Service, Cambera, Australia การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 49 ราย และกลุ่มควบคุม 48 ราย กลุ่ม ทดลองจะได้รับการเยี่ยมบ้าน หลังจำหน่าย 1 สัปดาห์ โดย พยาบาลและเภสัชกร เน้น การ ดูแล เรื่องยา และประเมินการ รับประทานยาโดยตรวจนับเม็ดยา ใช้ระยะเวลาติดตามนาน 6 เดือน	-การเข้ารักษาในโรงพยาบาล ในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (36 และ 63, $p = .03$) -อัตราการตายในกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ ($p = .12$) -การเยี่ยมบ้านมีแนวโน้มในการ ลดปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามา รักษาซ้ำโดยไม่ได้อาสา (OR = 0.4, 95% CI = 0.2-1.1)	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มี ความถี่สูงต่อการกลับเข้า รักษาซ้ำในโรงพยาบาล ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
ผู้เขียน Stewart, Pearson, & Horowitz (1998)	การออกแบบวิจัย RCT Level A			การนำไปใช้ -การเยี่ยมบ้าน โดยพยาบาล และเภสัชกรสามารถนำไป ใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มี ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ดี ช่วย ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดการกลับเข้ารับรักษา ในโรงพยาบาล

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 22 A multidisciplinary intervention to prevent the readmission of elderly patients with congestive heart failure	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการพยาบาลเชิงรุก และการใช้วิธีการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ ต่ออัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 90 วันหลังจำหน่าย คุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่าย	กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวอายุ ≥ 70 ปีจำนวน 282 ราย	-การเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ครั้งในกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .02$) -คะแนนคุณภาพชีวิตในกลุ่มทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .001$) -สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในกลุ่มทดลอง ถึง 460 ดอลลาร์ต่อคน	ข้อดีของงานวิจัย -มีการคัดเลือกแบบสุ่ม -ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของการนำไปใช้ -ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันมาก -จำกัดในเรื่องของระยะเวลาการติดตาม
ผู้เขียน Rich et al. (1995)	การออกแบบวิจัย RCT Level A	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกแบบสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 142 รายและกลุ่มควบคุม 140 ราย โดยกลุ่มทดลองจะได้รับความรู้ในเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลว และการดูแลรักษา มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการติดตามหลังจำหน่ายโดยการเยี่ยมบ้านและการใช้โทรศัพท์ ในระยะเวลา 90 วัน		การนำไปใช้ -วิธีการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยการให้ความรู้ใช้สหวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วย และมีการติดตามเยี่ยมหลังจำหน่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 23 Prevention of readmission in elderly patients with congestive heart failure: results of a prospective, randomized study	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของวิธีการดูแลผู้ป่วยโดยไม่ใช้ยาแบบสหวิชาชีพเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลภายใน 90 วันหลังจำหน่าย	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่มีอายุ ≥ 70 ปี จำนวน 98 ราย	อัตราการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 45.7)	ข้อดีของงานวิจัย - มีการคัดเลือกแบบสุ่ม
ผู้เขียน Rich et al. (1993)	การออกแบบวิจัย Prospective, RCT, with 2:1 assignment. Level A	สถานที่ 550-bed secondary and tertiary care university teaching hospital, USA. การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดย การคัดเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 63 ราย และกลุ่มควบคุม 35 ราย โดยกลุ่มทดลอง จะได้รับการดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ ประกอบด้วยการสอนแบบละเอียดโดย geriatric cardiac nurse ได้รับการดูแลเรื่องของการรักษา โดย geriatric cardiologist	- จำนวนวันนอนโรงพยาบาลในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (4.3 ± 1.1 วัน และ 5.7 ± 2.0 วัน) - การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางลดลงร้อยละ 42.2 (จากร้อยละ 47.6 เป็นร้อยละ 27.5) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p = .10$	ข้อจำกัดของงานวิจัย - จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากัน
				การนำไปใช้ - วิธีการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยการให้ความรู้ใช้สหวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วย และมีการติดตามเยี่ยมหลังจำหน่าย ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 23 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) มีการวางแผนการจำหน่ายโดยการส่ง ปรึกษานักวิชาการทางสังคม การสอน เรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลังการจำหน่ายที่บ้าน ติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการจำหน่ายเป็น ผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับบริการติดตามเป็น เวลา 90 วันหลังการจำหน่าย ระหว่างการ ติดตามจะวัดผลลัพธ์ของการกลับเข้ามา รักษาตัวในโรงพยาบาลภายใน 90 วัน หลังจำหน่าย และจำนวนวันนอนใน โรงพยาบาล		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 24 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความ สามารถของผู้ป่วยและญาติใน การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ต่อการกลับเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมการ ส่งเสริมความสามารถของ ผู้ป่วยและญาติในการดูแลผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวต่อการกลับเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาล ภายใน 28 วันหลังจำหน่าย	กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจ ล้มเหลวและญาติจำนวน 47 คู่ สถานที่ โรงพยาบาลรามารบิดี	-พบว่ากลุ่มที่ได้รับ โปรแกรมมี คะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับการ ดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<.05$) -ญาติผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับ การดูแลตนเองสูงกว่าญาติผู้ดูแล ในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ($p<.05$)	ข้อดีของงานวิจัย -มีความเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ดูแล ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก -ระยะเวลาการติดตามสั้น -การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง
ผู้เขียน นิภาพร ประจันบาน (2550)	การออกแบบวิจัย Quasi experimental research design Level B	การดำเนินการวิจัย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยการจัด เลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 23 คู่ และกลุ่มควบคุม 24 คู่ ผู้วิจัยใช้วิธี การสอนและฝึกทักษะการดูแลตนเองให้ กับผู้ป่วยพร้อมญาติเป็นรายบุคคลก่อน กลับบ้านโดยใช้เวลาสอนวันละ 30-45 นาที 2 วัน และ โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วย หลัง จำหน่ายในวันที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 และ 3 เมื่อผู้ป่วยมีปัญหหรือสงสัยสามารถ โทรศัพท์ติดต่อกับผู้วิจัย ได้ตลอดเวลา	-กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ โปรแกรมกลับเข้า มารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อย กว่าผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ($p<.05$)	การนำไปใช้ -การให้ความรู้ในการดูแล ตนเองเพื่อเพิ่มความในการ ดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ผู้ดูแล เป็นรายบุคคลก่อนกลับ บ้าน โดยแบ่งการสอนเป็น 2 ครั้ง การติดตามเยี่ยม โดยใช้ โทรศัพท์และผู้ป่วยสามารถ โทรศัพท์ติดต่อกลับ ได้ตลอด เวลาเมื่อมีปัญหหรือข้อสงสัย

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 25 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) มาตรวจตามนัดที่คลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว พร้อมทั้งให้กิจกรรมการดูแลซ้ำในกรณีที่ยังมีปัญหาสุขภาพอยู่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและปัญหาด้านจิตสังคมทั้งทางตรงที่คลินิกภาวะหัวใจล้มเหลวและทางโทรศัพท์ที่เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ความเจ็บป่วยและการรักษา จำนวนครั้งของการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลและระดับความรู้แรงของภาวะหัวใจล้มเหลว		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 26 Effect of a comprehensive heart failure treatment program on heart failure readmission and quality of life.	วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างครอบคลุมที่มีต่อการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลภายใน 1 เดือน เนื่องจากอาการของโรค และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยไทย	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลป้องกันด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ระหว่างเดือน ธันวาคม 2005 ถึง ธันวาคม 2006 จำนวน 33 ราย ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ว่า congestive HF หรือ dilate cardiomyopathy, LVEF $\leq 40\%$ มีประวัติกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 12 เดือน	-ผู้ป่วยทั้งหมด 33 ราย เป็นชาย 17 ราย หญิง 16 ราย อายุเฉลี่ย 63 ปี ค่า LVEF เฉลี่ย = 35% ค่ามัธยฐานของการติดตาม = 7 เดือน -อัตราการเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉลี่ยของผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก 0.7 ครั้งต่อเดือน เป็น 0.1 ครั้งต่อเดือน ($p = .0001$) -คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นหลังจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว (p = .0001) -ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลน้อยกว่า 2 ครั้ง ภายในเวลา 12 เดือน	ข้อดีของงานวิจัย -เป็นการศึกษาข้อหลังในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ได้ผลลัพธ์ตามสภาพที่เป็นจริง ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก -ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจล้มหรือสับสน
ผู้เขียน Boonyapiphat (2007)	การออกแบบวิจัย A retrospective observational study.	สถานที่ โรงพยาบาลลำปาง	ผลการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลว	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 26 (ต่อ)			การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ตัวอย่างหัวใจน้อยกว่าปกติ ก่อนและ หลังได้รับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว แบบครอบคลุมในโรงพยาบาลต่าง โดยการรักษาประกอบด้วยการสอน สูงศึกษาและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การติดตามที่คลินิกเฉพาะโรคและการ ติดตามทางโทรศัพท์หากจำเป็น		การนำไปใช้ -การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขา วิชาชีพ ให้การดูแลผู้ป่วยแบบ ครอบคลุมทั้งการรักษา การให้ ความรู้เป็นรายบุคคล การติดตาม ที่คลินิกเฉพาะภาวะหัวใจล้มเหลว และการโทรศัพท์ ช่วยลดการกลับ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามาารรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 27 Care and outcomes of patients newly hospitalized for heart failure in the community treated by cardiologists compared with other specialist.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของระบบการดูแลผู้ป่วยและผลลัพธ์ทางคลินิกของการดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) กับแพทย์สาขาอื่นๆ	การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในรายในด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนปี 1994 ถึง เดือนมีนาคม ปี 1996 จำนวน 38,702 ราย ที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ 4 กลุ่ม คือ แพทย์ เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologists) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ (general internists) แพทย์ประจำบ้าน (family practitioners) และแพทย์สาขาอื่น (physician of other disciplines) คิดเป็นร้อยละ 14.2, 35.0, 41.0 และ 9.9 ตามลำดับ	ข้อดีของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของงานวิจัย -อัตราส่วนจำนวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน
ผู้เขียน Jong, Gong, Liu, Austin, Lee, & Tu. (2007)	การออกแบบวิจัย A retrospective observational study, Chart audits.	การออกแบบวิจัย/ระดับ	สถานที่ 14 hospital in Ontario, Canada.	ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologists) มีอายุน้อย และเป็นเพศชายมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์สาขาอื่นๆ	การนำไปใช้ -การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล และลดอัตราการตายได้
Level B	เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งแรกด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำมาหาค่าทางสถิติ ได้แก่ อัตราการตาย การกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล หักลดเพื่อการรักษา และการใช้ยา	การดำเนินการวิจัย	เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งแรกด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำมาหาค่าทางสถิติ ได้แก่ อัตราการตาย การกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล หักลดเพื่อการรักษา และการใช้ยา	ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologists) มีการทำหัตถการใน 30 วัน มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์สาขาอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ cardiac catheterization (ร้อยละ 6.3, 2.7, 1.8 และ 1.2	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ห้วงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 27 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) รักษาล้างการจำหน่าย เปรียบเทียบ ผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ 4 กลุ่ม คือ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologists) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ (general internists) แพทย์ประจำบ้าน (family practitioners) และแพทย์สาขาอื่น (physician of other disciplines)	ตามลำดับ, $p < .001$) percutaneous coronary intervention (ร้อยละ 0.2, 0.1, 0.1 และ 0.06; $p = .01, .05$ และ .01 ตามลำดับ) -ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologists) มีการทำหัตถ์ (bypass surgery) มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ประจำบ้าน (family practitioners) และแพทย์สาขาอื่น (physician of other disciplines) แต่ไม่แตกต่างจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ (general internists) (ร้อยละ 0.9, 0.5, 0.3 และ 0.7; $p = .02, p \leq .001$ และ $p = .24$ ตามลำดับ) -แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologists) ให้การรักษาผู้ป่วยหลังจากจำหน่าย 30 วัน ด้วยยา ACE inhibitor มากกว่าแพทย์ประจำบ้าน (family practitioners) และแพทย์สาขาอื่น (physician of other disciplines) แต่ไม่	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 27 (ต่อ)			แตกต่างจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรศาสตร์ (general internists) ส่วนการรักษาด้วยยา beta blocker มากกว่าแพทย์สาขาอื่นๆ -อัตราการตายใน 1 ปีของผู้ป่วยกลุ่มที่ ได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ (cardiologists) น้อยกว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอายุรศาสตร์ (general internists) แพทย์ประจำบ้าน (family practitioners) และแพทย์สาขาอื่น (physician of other disciplines) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 28.5, 31.7, 34.9 และ 35.9 ตาม ลำดับ; $p \leq .001$) -การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ใน 1 ปี ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะ ทางด้านโรคหัวใจ (cardiologists) น้อย กว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลจากแพทย์	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ห้และส้เคราะห์งาน วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 27 (ต่อ)			ประจำบ้าน (family practitioners) และแพทย์สาขาอื่น (physician of other disciplines) แต่ไม่แตกต่างจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ (general internists) (ร้อยละ 54.7, 58.1, 58.3 และ 55.4; $p \leq .001$, $p \leq .001$ และ $p = .39$ ตามลำดับ)	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 28 The 6-minute walk test predicts clinical outcome in Asian patients with chronic congestive heart failure on contemporary medical therapy: A study of the multiracial population in Singapore	วัตถุประสงค์ เพื่อทำนายผลลัพธ์ของการเดิน เวลา 6 นาที (6MWT) ของประชากร หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติ (LVSD) และมีค่า LVEF < 40 % จำนวน 668 ราย	การออกแบบวิจัย/ระดับ เพื่อทำนายผลลัพธ์ของการเดิน เวลา 6 นาที (6MWT) ของประชากร หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติ (LVSD) และมีค่า LVEF < 40 % จำนวน 668 ราย	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่มีภาวะ หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติ (LVSD) และมีค่า LVEF < 40 % จำนวน 668 ราย	ผลการวิจัย -เมื่อสิ้นสุดการศึกษาโปรแกรม the National Healthcare Group Multidisciplinary Heart Failure Disease Management Program ผลของการติดตามไปข้างหน้า เป็น เวลา 36 ± 12 เดือน พบผู้ป่วยจำนวน 63 ราย ตาย และจำนวน 125 ราย กลับเข้ามารักษาใน โรงพยาบาล -อัตราการตายในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้เดิน เวลา 6 นาที (walker) น้อยกว่า กลุ่มที่ไม่ได้เดิน (non-walker) อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 7 และ 13; $p = .008$)	ข้อดีของงานวิจัย -ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการสูญหาย ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้เขียน Lee, Lund, Chan, Wong, Lau, & Ng . (2007)	การออกแบบวิจัย A prospective study Level B	การดำเนินการวิจัย ผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 668 ราย เป็นผู้ป่วย ที่เข้าร่วมโปรแกรม the National Health-care Group Multidisciplinary Heart Failure Disease Management Program ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2002 ถึง เดือน กันยายน 2004 ผู้ป่วยที่เข้าร่วม โปรแกรมจะได้รับ ความรู้เรื่อง อาหาร การจัดการของเหลว และ ติดตามให้การรักษาโดย cardiologist มีการ ดูแลต่อเนื่องจากพยาบาลผู้จัดการรายกรณี	ผลการดำเนินการวิจัย ผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 668 ราย เป็นผู้ป่วย ที่เข้าร่วมโปรแกรม the National Health-care Group Multidisciplinary Heart Failure Disease Management Program ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2002 ถึง เดือน กันยายน 2004 ผู้ป่วยที่เข้าร่วม โปรแกรมจะได้รับ ความรู้เรื่อง อาหาร การจัดการของเหลว และ ติดตามให้การรักษาโดย cardiologist มีการ ดูแลต่อเนื่องจากพยาบาลผู้จัดการรายกรณี	การนำไปใช้ -การออกกำลังกายช่วย ลดการกลับเข้ามารักษา ใน โรงพยาบาลของผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ -การทดสอบโดยใช้การเดิน ในเวลา 6 นาที สามารถใช้ ทำนายอัตราการตาย และ การกลับเข้ามารักษาใน โรงพยาบาลได้	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 28 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) โดยการโทรศัพท์ติดตามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว หลังจากโปรแกรมผู้ป่วยจะได้รับการประเมิน คุณภาพชีวิต โดยใช้ the Minnesota Living with heart failure questionnaire, NYHA functional class และความทนต่อการเดินเวลา 6 นาที (6MWT) ที่พื้นฐานก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และประเมินซ้ำหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม 6 เดือน นำข้อมูลมาเปรียบเทียบจำนวนการเข้ารักษาในโรงพยาบาล อัตราการตาย NYHA functional class และ echocardiogram การศึกษาเน้นผลลัพธ์ของการเดินเวลา 6 นาที (6MWT) โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้เดิน (walker) 386 ราย และกลุ่มที่ไม่ได้เดิน (non - walker) 282 ราย นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลของการเดินเวลา 6 นาที และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความทนต่อการเดินเวลา 6 นาที	-อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับความทนต่อการเดินเวลา 6 นาที ($r = -0.545$, $p < .001$) -ผู้ป่วยที่มี NYHA class III และ IV มีความทนต่อการเดินเวลา 6 นาที สั้นกว่าผู้ป่วยที่มี NYHA class I และ II ($p < .001$)	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 29 Readmissions and the quality of care in patients hospitalized with heart failure.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้ารักษา (ACEI) รักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติ (LVSD)	กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งได้รับสิทธิประกันสุขภาพจากรัฐบาล (DRG 127) ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติ (LVSD) จำนวน 611 ราย จาก 50 โรงพยาบาล	ผู้ปกครองที่ได้รับการศึกษาด้วย ACEI ตามขนาดเป้าหมาย กลุ่มที่ได้รักษารักษาด้วย ACEI แต่ได้ออกจากโรงพยาบาล และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย ACEI ในขณะจำหน่าย มีจำนวน 116, 367 และ 128 ราย ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 19, 60 และ 21) -ระยะเวลาติดตาม 21 เดือน มีผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยที่สุด 1 ครั้ง ทั้งหมดจำนวน 425 ราย (ร้อยละ 70) และมีจำนวนครั้งของการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล อยู่ในช่วง 0-18 ครั้ง	ข้อดีของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ -ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ข้อจำกัดของงานวิจัย -ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจคลาดเคลื่อนจากการเป็นจริง เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจลืมหรือสับสน ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
ผู้เขียน Luthi, Lund, Sampietro-Colom, Kleinbaum, Ballard & McClellan . (2003)	การออกแบบวิจัย A retrospective observational study, Chart audits. Level B	สถานที่ 50 community hospitals in US states Colorado, Connecticut, Georgia, Oklahoma, and Virginia การดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่บันทึกไว้ในประวัติการรักษา ขณะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย ACEI ตามขนาดเป้าหมาย (target dose) กลุ่มที่ได้รับการ	ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการศึกษาด้วย ACEI ตามขนาดเป้าหมายจะจำหน่าย มีอัตราการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย ACEI แต่ได้ออกจากโรงพยาบาล และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย	การนำไปใช้ การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย การใช้ขนาดยารักษาตามมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับการลดการกลับเข้ามา รักษาในโรงพยาบาล

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 29 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) รักษาด้วยยา ACEI แต่น้อยกว่าขนาดเป้าหมาย (less than target dose) และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI (not prescribed) วัดผลลัพธ์อัตราการกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลหลังจากจำหน่ายภายใน 21 เดือน	ACEI คือ ร้อยละ 75, 70 และ 61 ตามลำดับ ($p = .041$, $p = .021$ และ $p = .310$) -จำนวนความถี่ของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในระยะเวลา 21 เดือนหลังจำหน่าย กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI ตามขนาดเป้าหมายจะจำหน่าย มีความถี่ของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI แต่น้อยกว่าขนาดเป้าหมาย และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI คือ 1.53, 1.83 และ 2.10 ครั้งต่อรายตามลำดับ	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 30 Congestive heart failure performance- improvement project special needs for special patients	วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบอุปกรณ์การสอนเรื่อง อาหารที่มีโซเดียมต่ำรูปแบบใหม่ ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เป็น กลุ่มเสี่ยงต่อการกลับเข้ามารักษา ซ้ำในโรงพยาบาล ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังและกลุ่มประชากร ที่อาศัยอยู่ในชนบทเมือง Cullman Country ร้อยละ 80-85 มีความ บกพร่องเรื่องการมองเห็น ร้อยละ 50 มีความบกพร่องเรื่องการได้ยิน ร้อยละ 7 ไม่สามารถอ่านออกเขียน ได้ ร้อยละ 70-75 มีความรู้ grade 3 รวมทั้งมีฐานะยากจน	-อัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรง พยาบาลภายใน 31 วัน ของโรงพยาบาล CRMC ในเวลาก่อนเข้าโปรแกรม (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2000) เฉลี่ย ร้อยละ 4.47 เปรียบเทียบกับ โปรแกรม CHF (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2001) ร้อยละ 63 -ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของผู้ป่วย CHF ที่เข้ามา รักษาใน โรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบ ซ้ำในแต่ละครั้ง ของโรงพยาบาล CRMC ก่อนโปรแกรม จะมีวันนอนเฉลี่ย 4-5 วัน และค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 ดอลลาร์ และหลังการประยุกต์ใช้เครื่องมือการ สอนรูปแบบใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างอยู่ในโปรแกรมผู้ป่วยทั้งหมด สามารถควบคุมน้ำหนักได้ต่ำกว่าวันละ 2 ปอนด์	ข้อดีของงานวิจัย -เป็นการศึกษาย้อนหลังใน สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ได้ผลลัพธ์ตามสภาพที่ เป็นจริง ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง -ไม่มีการทดสอบทางสถิติ
ผู้เขียน Bryant, (2002)	การออกแบบวิจัย A retrospective observational study, Chart audits. Level B	สถานที่ Cullman Regional Medical Center (CRMC) a 115 – bed, USA.		การนำไปใช้ -สามารถนำอุปกรณ์การสอน ที่มีรูปภาพประกอบ และใช้ตัว หนังสือขนาดใหญ่เขียนข้อความ ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง ทั้งทางการอ่านและการได้ยิน เข้าใจเรื่องอาหารที่มีโซเดียม ต่ำได้ถูกต้อง สามารถการปฏิบัติ ตามการรับประทานอาหารอย่าง

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 30 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) โปรแกรม CHF มีแพทย์เป็นผู้ดำเนินการ และดำเนินการโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (NCM) ผู้วิจัยทำอุปกรณการสอนเรื่องอาหารที่มีโซเดียมต่ำ เพื่อนำไปให้ NCM ใช้สอนผู้ป่วยใน โปรแกรม CHF อุปกรณการสอนรูปแบบใหม่เป็นการให้ความรู้โดยใช้แผ่นให้ความรู้ที่มีภาพของอาหารวางตรงกับเนื้อหาที่ต้องการสอน ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการประยุกต์ใช้อุปกรณการสอนเรื่องอาหารที่มีโซเดียมต่ำรูปแบบใหม่ คือ อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 31 วัน ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามการรับประทานอาหารได้อย่างสม่ำเสมอ		การนำไปใช้ (ต่อ) ผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ำหนัก ไม่เกิดภาวะของเหลวคั่งในร่างกาย ช่วยลดอาการภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบซ้ำ

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์แต่ละสิ่งตรงทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 31 Partnering for congestive heart failure: A clinic without walls. ผู้เขียน Draus, Walblay, & Barraco (2002)	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมการ จัดทำคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลว โดยใช้พยาบาล ปฏิบัติการชั้นสูงเป็นผู้จัดการ	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 24 ราย สถานที่ Oakwood Hospital and Medical Center, Dearborn, Michigan, USA. การดำเนินการวิจัย ผู้ป่วยทั้ง 24 ราย เข้าร่วมโครงการใน คลินิกโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง วัดผลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาติดตามผู้ป่วยภายใน 1 ปี การดำเนินการ โดยพยาบาลผู้ปฏิบัติ การชั้นสูงเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่รับ เข้ารักษาใน โรงพยาบาล และมีการ ติดตามหลังจำหน่าย โดยการใช้โทร ศัพท์ และที่คลินิกผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยเป็นเพศหญิงร้อยละ 62.5 มีค่า LVEF เฉลี่ย 26.5 % ความรุนแรงของ โรคลดลงจาก III เป็น II ภายใน 1 เดือน จำนวนวันนอนเฉลี่ย 6-7 วัน อัตราการ กลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 30 วัน ลดลงจากร้อยละ 12.5 เป็นร้อยละ 8.3 ค่ารักษาลำหรับผู้ป่วยนอกลดลง จาก 1,177±2,224 เป็น 685±1,479 แต่ ค่าหรับผู้ป่วยในไม่แตกต่างกัน	ข้อดีของงานวิจัย -มีการจัดการทำถึงทดลองให้กับ กลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ป่วยหัวใจ ล้มเหลว ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก -ไม่มีการทดสอบทางสถิติ -ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง การนำไปใช้ -การจัดทำคลินิกเฉพาะผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวโดยพยาบาล ผู้ปฏิบัติการชั้นสูงเป็นผู้ดำเนิน การในคลินิก ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ใน การดูแลผู้ป่วย และยังเป็นที่แห่ง สนับสนุนให้คำปรึกษา

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ / การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 32 Protocols in practice congestive heart failure telemanagement clinic.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวรูปแบบใหม่โดยใช้วิธีการจัดการทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ด้านภาวะการทำหน้าที่ การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 30 วัน และจำนวนวันนอนโรงพยาบาล	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน St. Mary's Health System สถานที่ St. Mary's Health is a 407 bed tertiary hospital located in Knoxville, USA.	-ผู้ป่วยจำนวน 36 ราย (ร้อยละ 58) แพทย์เป็นผู้ส่งต่อเข้าคลินิก CHF telemanagement มีผู้ป่วย 1 รายที่แพทย์เป็นผู้ส่งต่อเข้าคลินิกโดยตรง โดยไม่ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ส่วนผู้ป่วยที่เหลือ เจ้าหน้าที่ในการพยาบาลหรือพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคหัวใจ (cardiac case manager) เป็นผู้ส่งต่อเข้าคลินิก -ผลลัพธ์ด้านภาวะการทำหน้าที่เพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนจากการประเมินลดลง จาก 44.06 เป็น 24.11 -การกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม คือ ร้อยละ 2 และร้อยละ 12 ตามลำดับ -จำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยในการทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม คือ 3.44 และ 5.33 วัน ตามลำดับ	ข้อดีของงานวิจัย -มีการจัดการที่ถึงทดลองในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง -มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์โดยใช้กลุ่มควบคุม ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง -ไม่มีการทดสอบทางสถิติ -อัตราส่วนจำนวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ผู้เขียน Creason (2001)	การออกแบบวิจัย Quasi experimental research design	การดำเนินการวิจัย กลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้าร่วมโปรแกรม CHF telemanagement clinic จำนวน 62 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ไม่ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม CHF telemanagement clinic จำนวน 231 ราย		การนำไปใช้ -การจัดหน่วยบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยบริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยเมื่อมีปัญหาได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 32 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ)	โปรแกรม CHF telemanagement clinic เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งมีการดูแลผู้ป่วยแบบรายกรณี งานพัฒนาเป็น CHF telemanagement clinic เพื่อเพิ่มความรู้และการดูแลตนเองของผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ติดต่อ call center ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ (RNs) ที่มีประสบการณ์ด้านโรคหัวใจ โดยทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อตอบคำถามตามปัญหาของผู้ป่วยและจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ความรู้และประเมินผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการสอนได้รับความร่วมมือจากทีมสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่ดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 32 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคหัวใจ (cardiac case manager) แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ (cardiologist) บุคลากรด้านการฟื้นฟูหัวใจ (cardiac rehabilitation) พยาบาลวิชาชีพ โภชนากร และนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์ คือ ประเมินภาวะการทำหน้าที่ด้วย a CHF Questionnaire โดยประเมินก่อนเข้าร่วมในคลินิก และประเมินซ้ำภายหลัง 6 สัปดาห์ต่อมา การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายใน 30 วัน และจำนวนวันนอนโรงพยาบาล การศึกษามีระยะเวลา 18 เดือน		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 33 A clinical pathway for congestive heart failure.	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อผลลัพธ์การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล	วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อผลลัพธ์การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล	กลุ่มตัวอย่าง clinical record ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 207 ราย	-อัตราการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ใช้ clinical pathway น้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ clinical pathway (ร้อยละ 12.5 และ 22.9 ตามลำดับ) สามารถลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้ร้อยละ 45	<u>ข้อดีของงานวิจัย</u> -มีการจัดกระทำสิ่งทดลองในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง -มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์โดยใช้กลุ่มควบคุม
ผู้เขียน Hoskins, Clark, Schroeder, Walton-Moss, & Thiel (2001)	การออกแบบวิจัย Quasi experimental research design Level B		<u>สถานที่</u> School of Nursing, The Catholic University of America.		<u>ข้อจำกัดของงานวิจัย</u> -กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนแตกต่างกัน -ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
			<u>การดำเนินการวิจัย</u> -แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้ clinical pathway จำนวน 67 รายและกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ clinical pathway จำนวน 147 ราย เมื่อสิ้นสุดการศึกษาจะพบความแตกต่างของผู้ป่วยเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล การปฏิบัติตาม clinical pathway ได้แก่ การประเมินผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม การให้ความรู้เป็นรายบุคคล โดยพยาบาลเป็นผู้สอนระหว่างการเชื่อมโยง โดยสอนความรู้		<u>การนำไปใช้</u> -การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยการใช้การดูแลตามแนวปฏิบัติ (มี clinical pathway) สามารถลดอัตราการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 33 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) เรื่องโรค การจัดการ กับอาการ ยาที่ได้รับ การทำกิจกรรมและแนวปฏิบัติในการ ออกกำลังกาย ปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายต่อ หัวใจและการใช้ออกซิเจน การติดตาม หลังจำหน่าย โดยการใช้โทรศัพท์		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่องผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 34 The effects of an advanced practice nurse-directed heart failure program.	วัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์หลักของการจัดการดูแลผู้ป่วยในโดยใช้พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) ต่อผลลัพธ์ จำนวนวันนอนโรงพยาบาล อัตราการตาย และการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล	กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจำนวน 1,192 ราย	-อาเขตเลียในกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมคือ 75 ปี ร้อยละ 96 เป็น Caucasian อายุเฉลี่ยในกลุ่มก่อนเริ่มโปรแกรมคือ 72 ปี ร้อยละ 95 เป็น Caucasian -จำนวนวันนอนโรงพยาบาลในกลุ่มก่อนเริ่มโปรแกรม 6.1 วัน (SD = 4.38) ในกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรม 5.3 วัน (SD = 3.92) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .01$)	ข้อดีของงานวิจัย -ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว -กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้เขียน Dahl & Penque (2000)	การออกแบบวิจัย Quasi-experimental design Level B	การดำเนินการวิจัย -แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมจำนวน 609 ราย ได้รับการจัดการดูแลจาก APN โดยตรง และกลุ่มก่อนเริ่มโปรแกรมจำนวน 583 ราย ได้รับการดูแลตามปกติ	-อัตราการตายในกลุ่มก่อนเริ่มโปรแกรมจำนวน 45 ราย (ร้อยละ 7.7) ในกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมจำนวน 30 ราย (ร้อยละ 4.9) อัตราการตายลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) -การกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ภายใน 30 วันและ 90 วันของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$)	การนำไปใช้ โปรแกรมการจัดการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการให้ความรู้ การวางแผนการจำหน่าย การส่งต่อ การติดตามหลังจำหน่าย และการทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพสามารถเพิ่มผลลัพธ์ทางการพยาบาลได้

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 34 (ต่อ)	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	การดำเนินการวิจัย (ต่อ) -การปฏิบัติงานของ APN มีดังนี้ คือ ประเมินผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แบบครอบคลุมทั้งอาการทางคลินิก ความรู้ การศึกษา และการวางแผน การจำหน่าย จัดระบบการส่งต่อ ติดต่อประสานงานกับแพทย์ โภชนากร นักสังคมสงเคราะห์ การให้ความรู้ และให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลครั้งละ 45 นาที ตามระดับความรู้ในการดูแล ตนเองและความสม่ำเสมอของการปฏิบัติ ตามแผนการรักษาของผู้ป่วย ในผู้ป่วย บางรายอาจได้รับครั้งเดียวเมื่อแรกรับ หลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะติดตาม สนับสนุนให้ความรู้ ช่วยเหลือและเฝ้า ระวังทางโทรศัพท์	ผลการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ภายใน 15 วัน ของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p > .05$	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์/ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 35 Prevention of hospitalizations for heart failure with an interaction home monitoring program.	วัตถุประสงค์ การศึกษานำร่องเพื่อทดสอบ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ และการยอมรับของโปรแกรม การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพศชาย ที่รับเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 27 ราย	-จำนวนครั้งของการเข้ารักษาใน โรงพยาบาลภายใน 1 ปี ด้วยการ ของโรคหัวใจหลังการเข้าร่วม โปรแกรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน เข้าร่วม โปรแกรม (0.6 และ 0.2 ครั้ง, $p < .05$) -จำนวนครั้งของการเข้ารักษาใน โรงพยาบาลภายใน 1 ปี จากสาเหตุ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมลดลง (0.8 และ 0.4 ครั้ง, $p = .NS$) -จำนวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) จาก 9.5 เป็น 0.8 ต่อคนต่อปี	ข้อดีของงานวิจัย -มีการจัดโปรแกรมเพื่อลด การกลับเข้ามารักษาซ้ำใน โรงพยาบาล ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่มีกลุ่มควบคุม
ผู้เขียน Shah et al. (1998)	การออกแบบวิจัย pilot study Level B	การดำเนินการวิจัย ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมจำนวน 27 ราย ได้รับการดูแลตามแบบแผนการ ดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เขียน ขึ้น และได้รับการตรวจสอบจากคณะ กรรมการใน university of California, San Francisco แบบแผนการดูแลผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวประกอบด้วย การ ให้ความรู้เรื่องโรคยา และอาหาร เมื่อ จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลผู้ป่วยจะ		การนำไปใช้ -การช่วยให้ผู้ป่วยรับประทาน ยาตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยการส่งข้อความเตือนเมื่อ ถึงเวลารับประทานยา -การจัดหาอุปกรณ์ เช่น เครื่อง ชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน โลหิต ไว้ที่บ้าน เพื่อใช้เฝ้าระวัง อาการผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์/ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 35 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) ได้รับเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่อง ซึ่งนำบันทึกแบบดิจิทัลและวิธีการใช้ เพื่อ ซึ่งนำบันทึก วัดความดันโลหิตและชีพจร ด้วยตนเองที่บ้าน และได้รับเพจเจอร์ สำหรับส่งข้อความเตือนเมื่อถึงเวลารับ ประทานยา และพยาบาลจะใช้โทรศัพท์ ติดต่อกับผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อ มีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ ติดต่อกับพยาบาล ได้ 24 ชั่วโมง และส่ง fax ข้อมูลการของผู้ป่วยถึงพยาบาล เพื่อจัดการกับอาการที่ผิดปกติ โปรแกรม มีระยะเวลาติดตาม 1 ปี เพื่อสิ้นสุดโปรแกรม จะวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนครั้งของการมา โรงพยาบาล และจำนวนวันนอนโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโปรแกรม		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์/การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/การนำไปใช้
เรื่องที่ 36 Impact of a comprehensive heart failure management program on hospital readmission and functional status of patients with advanced heart failure.	วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผล โปรแกรมการจัดการภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุม ต่อภาวะการทำหน้าที่การกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน และค่าใช้จ่ายในการรักษา เปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ โปรแกรม	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่รอรับ การรักษาคือการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ จำนวน 214 ราย	-การกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล หลังใช้โปรแกรม น้อยกว่าก่อน ใช้โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ($p < .001$) (ก่อนการใช้โปรแกรม เหลือ 2 ครั้ง ต่อราย และหลัง การใช้โปรแกรม เหลือ 0.29 ครั้ง ต่อราย ซึ่ง ลดลงร้อยละ 85) -ภาวะการทำหน้าที่ (function class) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .0001$)	ข้อดีของงานวิจัย -ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของงานวิจัย -ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้เขียน Fonarow et al. (1997)	การออกแบบงานวิจัย pre-post test study Level B	การดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 214 ราย ได้รับ โปรแกรมการจัดการภาวะหัวใจล้มเหลว แบบครอบคลุม ได้แก่ 1. การดูแลรักษา โดยการให้ยาที่เหมาะสมกับภาวะหัวใจ ล้มเหลว 2. การให้ความรู้อย่างมีแบบ แผนแก่ผู้ป่วยและครอบครัว แบบเป็น กลุ่มหรือเป็นรายบุคคล โดย heart failure Clinical nurse specialist ใช้เวลาในการ	-ค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยต่อ รายหลังการใช้โปรแกรม น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของการกลับเข้ารับรักษาซ้ำใน โรงพยาบาล 1 ครั้ง (\$ 6,700 และ \$ 9,178)	การนำไปใช้ -เป็นแนวทางสำหรับพยาบาล ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวทั้งขณะผู้ป่วย อยู่โรงพยาบาล และการ ติดตามหลังจำหน่าย -การสอนให้ผู้ป่วยปรับขนาด ยาขับปัสสาวะด้วยตนเอง

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์/ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 36 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) สอน 30-45 นาที 3. การดูแลหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แพทย์เจ้าของไข้จะส่งต่อผู้ป่วยให้ cardiologists เป็นผู้ดูแลภายใน 3 วัน หลังการจำหน่าย และจะนัดมาพบกับ cardiologists สัปดาห์ละครั้ง จนอาการคงที่เมื่อมีการปรับยาในการรักษาผู้ป่วยจะได้รับโทรศัพท์สอบถามอาการหลังจากการปรับยา 2-3 วัน และจะโทรศัพท์เยี่ยมในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 8 การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบภาวะการทำหน้าที่ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม 6 สัปดาห์ โดย cardiologists และ heart failure clinical nurse specialist การวัดออกซิเจนสูงสุด exercise testing การประเมินค่า LVEF จากการทำ echocardiogram การศึกษา มีระยะเวลาติดตามนาน 6 เดือน		

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 37 Home care nursing for person with congestive heart failure: Description and relationship to the hospital readmission.	วัตถุประสงค์ -เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านประชากร ภาวะทางคลินิก และการบริการพยาบาล เยี่ยมบ้าน -เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร ภาวะทางคลินิก การสอน และการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ภายใน 90 วัน	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 140 ราย สถานที่ A home care agency, USA.	-ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 78 ปี 67% เป็นผู้หญิง ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับการดูแลที่ home care เฉลี่ย 8 วัน -จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภาวะทางคลินิก คำสั่งการรักษา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล -นำหนักที่เพิ่มมากกว่า 3 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็นอาการเดี่ยวที่พบที่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p = .008$ -การให้ความรู้ในเรื่องการพักผ่อนและการทำกิจกรรมเป็นตัวแปรเดี่ยวที่มีความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล	ข้อดีของงานวิจัย -ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ -กลุ่มตัวอย่างไม่มีการสูญเสีย ข้อจำกัดของงานวิจัย -เป็นการศึกษาย้อนหลังโดย การพบทวนประวัติจากเวชระเบียนของผู้ป่วย -ตัวแปรบางตัวไม่มีผลทดสอบทางสถิติ
ผู้เขียน Martens (2000)	การออกแบบวิจัย Retrospective record review described Level C	การดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาย้อนหลังข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 1996 – 31 พ.ค. 1997 โดยใช้สถิติบรรยายและไคสแคว์ในการวิเคราะห์ข้อมูล	การนำป้ใช้ -การให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล ที่สำคัญ คือการเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 38 Adequacy of home care and hospital readmission for elderly congestive heart failure patient.	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านที่เพียงพอและเหมาะสมกับการลดการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล	กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสูงอายุในระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลที่กลับไปอยู่บ้านหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล Acute care จำนวน 253 ราย อายุ 65 ปี ขึ้นไป	มีผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ในสัปดาห์ที่ 2, 6, 10 และ 14 ร้อยละ 12.9, 17.4, 14.6 และ 11.3 ตามลำดับ -ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมีความสัมพันธ์กับการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .04$)	ข้อดีของงานวิจัย -ใช้การติดตามหลังจำหน่ายต่อเนื่อง และหลายครั้ง -ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ข้อจำกัดของงานวิจัย -กลุ่มตัวอย่างสุ่มหากระหว่างการศึกษาถึงร้อยละ 15 ทำให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างลดลง ข้อจำกัดของการนำไปใช้ - เป็นการดูแลเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุหลังจากออกจากโรงพยาบาล การนำไปใช้ - การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบต่อเนื่องที่บ้านอย่างเหมาะสมและเพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
ผู้เขียน Proctor, Howell, Li, & Dore (2000)	การออกแบบวิจัย Prospective design study. Level C	สถานที่วิจัย A large Midwestern urban hospital, USA. การดำเนินการวิจัย -วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล 3 แบบ คือ 1. ข้อมูลประชากร และข้อมูลตามระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 2. ข้อมูลที่เก็บโดย geriatric nurse practitioners เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาที่สม่ำเสมอ และ 3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หลังการจำหน่าย 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินภาวะ	การรักษารักษา และการมีประสบการณ์ในดูแลตนเองมาก ทำให้ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .05$)	

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ต่อ)

ชื่อเรื่อง/ผู้เขียน/ปี	วัตถุประสงค์ การออกแบบวิจัย/ระดับ	กลุ่มตัวอย่าง/ สถานที่/การดำเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์/ การนำไปใช้
เรื่องที่ 38 (ต่อ)		การดำเนินการวิจัย (ต่อ) สุภาพ และทราบที่อยู่ก่อนกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาล -ระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล โดยการโทรศัพท์ติดต่อ ในสัปดาห์ที่ 2, 6, 10, และ 14 หลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล		

บทที่ 4

ผลการศึกษา

องค์ความรู้ครั้งนี้ได้จากหลักฐานงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง ซึ่งเป็นหลักฐานงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990-2008 เมื่อใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (Evidence-based Medicine & Clinical Practice Guideline, 2544) พบว่าเป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A จำนวน 23 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al, 1998; Gwadry-Sridher et al., 2004; Holland et al., 2007; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Jerant et al., 2001; Karntz et al., 2008; Kim & Soeken, 2005; Koelling et al., 2005; Koshman et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart & Horowitz, 2002; Riegel et al., 2002; Romualdo et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1998; Woodend et al., 2008) ระดับ B จำนวน 13 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงไธสง, 2547; Boonyapiphat, 2007; Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Jong et al., 2007; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998) และระดับ C จำนวน 2 เรื่อง (Martens, 2000; Proctor et al., 2000)

หลักฐานงานวิจัยที่ทบทวนในครั้งนี้ ผู้วิจัยในงานวิจัยแต่ละเรื่องให้คำจำกัดความของการกลับเข้มารักษาค้างในโรงพยาบาลแตกต่างกันโดยกำหนดระยะเวลาแตกต่างกันตั้งแต่ภายใน 2 สัปดาห์ ถึง 21 เดือนหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และพบว่าระยะเวลาภายใน 6 เดือนมากที่สุด รองลงมา คือ ภายใน 1 เดือน ภายใน 90 วัน ภายใน 1 ปี และภายใน 28 วัน ตามลำดับ หลักฐานงานวิจัยที่พบเป็นการศึกษาวิจัยจากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 20 เรื่อง ประเทศออสเตรเลีย 5 เรื่อง ประเทศแคนาดา 4 เรื่อง ประเทศไทย 3 เรื่อง ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศสก็อตแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฮ่องกง อย่างละ 1 เรื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการศึกษาและ/หรือจากการรวบรวมงานวิจัยมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยพยาบาลจำนวน 17 เรื่อง แพทย์จำนวน 6 เรื่อง เภสัชกรจำนวน 2 เรื่อง นักสังคมสงเคราะห์จำนวน 1 เรื่อง และการศึกษาร่วมกันโดยสหสาขาวิชาชีพจำนวน 12 เรื่อง ในจำนวนนี้มีการศึกษา 4 เรื่อง เป็นการวิเคราะห์ห่อภิมาณ (Meta-analysis) ได้สรุปรูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่น่าสนใจ

ดังนี้ 1) การศึกษาของคิมและโซเค็น (Kim & Soeken, 2005) พบว่า การบำบัดการพยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการรายกรณี (case management) สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในการลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (OR = 0.241; 95% CI = 0.012-0.470) แต่ไม่มีประสิทธิผลในการลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (OR = 0.749; 95% CI = 0.446-1.025) 2) การศึกษาของฟิลลิปส์ และคณะ (Phillips et al., 2004) พบว่า การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุมโดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และการสนับสนุนดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายสามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (RR = 0.75, 95% CI= 0.64-0.88) 3) การศึกษาของกอดเร-สริดเธอร์ และคณะ (Gwadry-Sridher et al., 2004) พบว่าโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายสามารถลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (RR= 0.79, 95% CI= 0.68-0.91, $p < .001$) และ 4) การศึกษาของคอสแมน และคณะ (Koshman et al., 2008) พบว่า การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยทีมสุขภาพและมีเภสัชกรเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมการดูแล สามารถลดการมาโรงพยาบาลด้วยสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวและจากทุกสาเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (OR = 0.69; 95% CI= 0.51-0.94 และ OR = 0.71; 95% CI = 0.54-0.949 ตามลำดับ) และมีประสิทธิผลมากกว่าการที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากเภสัชกรเพียงวิชาชีพเดียว (OR = 0.89; 95% CI= 0.68-1.17)

จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยทั้งหมด 38 เรื่อง ผู้ศึกษาใช้กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย และนำเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนี้

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง พบว่า งานวิจัยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างเดียวทั้งหมดจำนวน 36 เรื่อง งานวิจัยที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดหัวใจจำนวน 1 เรื่อง (ระดับ A: Woodend et al., 2008) และเป็นการศึกษาวิเคราะห์ห่อภิมาน ซึ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โรคถุงลมโป่งพอง ผู้สูงอายุ (frail elder) ผู้ป่วยวิกฤต โรคลมชักและโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 1 เรื่อง (ระดับ A: Kim & Soeken, 2005) งานวิจัยจำนวน 37 เรื่อง ศึกษาผู้ป่วยทั้งเพศชายและเพศหญิง มี 1 งานวิจัยที่

ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะเพศชาย (ระดับ B: Shah et al., 1998) และมีวิจัยจำนวน 4 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่ศึกษาต่อเนื่องกัน (Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002)

อายุของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 98 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยที่มากกว่า 70 ปี ถึง 24 เรื่อง และมีงานวิจัยที่ศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 8 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A 5 เรื่อง (Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) ระดับ B 2 เรื่อง (Bryant, 2002; Hoskins et al., 2001) และระดับ C 1 เรื่อง (Proctor et al., 2000) กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับของภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง คือ ระดับ III-IV จำนวน 2 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A (Jaarsma et al., 2008) และระดับ B (Fonarow et al., 1997) อย่างละ 1 เรื่อง กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (Ejection Fraction: EF) น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 จำนวน 11 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A 7 เรื่อง (Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krumholz et al., 2002; Romualdo et al., 1999) และระดับ B 4 เรื่อง (Boonyapiphat, 2007; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998) และกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A 3 เรื่อง (Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002) และระดับ B 1 เรื่อง (Boonyapiphat, 2007)

การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

จากการศึกษางานวิจัยจำนวน 38 เรื่องในครั้งนี้ พบว่า รูปแบบของการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันหรือจัดการปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลที่สามารถควบคุมได้ และมีหลายองค์ประกอบรวมกัน รูปแบบของการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาค้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง 2) การดูแลต่อเนื่อง และ 3) การดูแลโดยทีมสุขภาพ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบมีดังต่อไปนี้

1. การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง (self-care: supportive educational intervention) จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ พบงานวิจัยจำนวน 18 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการ ระดับ A 8 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Holland et al., 2007; Jaarsma et al., 2008;

Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Romualdo et al., 1999) และระดับ B 10 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) ผู้ศึกษานำเสนอรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ เนื้อหาความรู้และการฝึกทักษะ องค์ประกอบของการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4 แสดงเนื้อหาของการให้ความรู้

เนื้อหาความรู้	รายละเอียดของเนื้อหาความรู้
ภาวะหัวใจล้มเหลว	ความรู้เรื่องโรค พยาธิวิทยา การรักษา สาเหตุการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว สาเหตุของภาวะน้ำเกิน อาการเตือนตั้งแต่เริ่มแรก อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวที่แย่ลง เช่น น้ำหนักขึ้น บวมบริเวณเหนือข้อเท้า หอบเหนื่อยและอ่อนล้า อาการของภาวะขาดน้ำ เช่น น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว
การใช้ยา	ชื่อยาที่ใช้รักษา ฤทธิ์ของยา ขนาด ส่วนประกอบของยา ปฏิบัติการของยากับอาหาร ผลข้างเคียงของยา การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
การดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	การลดความอ้วน การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การป้องกันการใช้หัวใจ เช่น การสูบบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ หลีกเลี่ยงการรับประทานยาในกลุ่ม NSAID
แหล่งสนับสนุนทางสังคม	หาแหล่งช่วยเหลือหรือใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคมเมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น สถานีนอนมัย โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลประจำจังหวัด มูลนิธิหรือหน่วยกู้ชีพต่างๆ

ตารางที่ 5 แสดงเนื้อหาของการให้ความรู้และฝึกทักษะ

เนื้อหาความรู้และฝึกทักษะ	รายละเอียดของเนื้อหาความรู้และฝึกทักษะ
อาหารและน้ำ	การจำกัดโซเดียม 2 กรัมต่อวัน และน้ำ 2 ลิตรต่อวัน ลดอาหารที่มีคลอเลสเตอรอล การรับประทานอาหารที่มีโปแตสเซียมสูง เช่นกล้วย ถั่ว หรือพืชมีฝัก ธัญพืช ผักที่มีใบมาก สาริตการเลือกเมนูอาหาร การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปชนิดที่มีโซเดียมต่ำโดยฝึกการอ่านปริมาณโซเดียมที่ฉลากอาหาร ปริมาณน้ำที่ผสมในอาหาร และเครื่องดื่มนั้น
การออกกำลังกาย	ฝึกการออกกำลังกายเป็นเวลา 12 เดือน โดยผู้ป่วยจะได้รับการฝึกออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ที่ความแรง 60% ออกซิเจนสูงสุด การออกกำลังกายแต่ละครั้งจะใช้เวลาเท่ากับ 1 ชั่วโมง โดยอบอุ่นร่างกาย 15-20 นาที และปั่นจักรยาน 40 นาที
การเฝ้าระวังอาการผิดปกติ	การชั่งน้ำหนักวันละครั้งทุกวัน และควรมาพบแพทย์เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น 2 ปอนด์ ในเวลา 2 วัน หรือ 3-5 ปอนด์ต่อสัปดาห์ฝึกการจับชีพจร การวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง และเฝ้าระวังระดับเกลือแร่ในเลือดโดยสังเกตอาการไม่สมดุลของเกลือแร่ต่างๆในร่างกาย รวมถึงการตรวจค่าอิเล็กโทรลัยต์เป็นประจำ การบันทึกน้ำหนัก ความยาวรอบบริเวณเหนือข้อเท้า และอาการผิดปกติที่พบ เช่น อาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก บวม นอนราบไม่ได้
การจัดการกับอาการที่ผิดปกติ	การปรับขนาดยาขับปัสสาวะตามอาการภาวะหัวใจล้มเหลว การใช้ออกซิเจนเพื่อการรักษา การลดและจำกัดปริมาณโซเดียม น้ำดื่ม หรือเครื่องดื่ม เมื่อเริ่มมีอาการบวม และหอบเหนื่อย หรือตามปริมาณปัสสาวะที่ลดลง การติดต่อขอคำแนะนำปรึกษาจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพทันที หรือคัดสินใจมาโรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติแม้ยังไม่ถึงเวลานัด

ตารางที่ 6 แสดงองค์ประกอบของการให้ความรู้ และการฝึกทักษะในการดูแลตนเอง

องค์ประกอบของการให้ความรู้และการฝึกทักษะ	จำนวนเรื่อง
ผู้ให้ความรู้	
พยาบาล	11
พยาบาลและทีมสุขภาพ	2
แพทย์	1
เภสัชกร	1
กลุ่มเป้าหมาย	
ผู้ป่วย เป็นรายบุคคล	8
ผู้ป่วย/ผู้ดูแล เป็นรายบุคคล	4
ผู้ป่วย ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล	1
ผู้ป่วย/ผู้ดูแล ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล	1
ระยะเวลาการสอน	
1 ชั่วโมง	4
30 นาที 2 ครั้ง (ขณะอยู่โรงพยาบาล)	
และ 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง (ที่คลินิกผู้ป่วยนอก)	1
30-45 นาที 2 ครั้ง	1
30-45 นาที 1 ครั้ง	1
อุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการให้ความรู้และฝึกทักษะ	
หนังสือคู่มือ	6
คอมพิวเตอร์	3
สมุดบันทึก แบบบันทึกอาการและน้ำหนักตัว	3
วิดีโอ	2
ภาพพลิก แผ่นพับ เอกสารการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย	
เอกสารเรื่องอาหาร และเอกสารเรื่องการใช้ยา	2
เอกสารประกอบการเรียนการสอน (handout)	1
แผ่นให้ความรู้เรื่องอาหารที่มีโซเดียมต่ำ	
(A low-sodium diet-teaching sheet)	1
แผ่นให้ความรู้เรื่องอาหารและปริมาณน้ำที่มีใน	
อาหารแต่ละชนิด (A fluid restriction sheet)	1
ตัวอย่างของเครื่องปรุงรสที่จำกัดโซเดียม	1
ตัวอย่างของอาหาร และตัวอย่างยาจริง	1
เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	1

ตารางที่ 6 แสดงองค์ประกอบของการให้ความรู้ และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง (ต่อ)

องค์ประกอบของการให้ความรู้และฝึกทักษะ	จำนวนเรื่อง
สถานที่	
โรงพยาบาลและบ้าน	13
บ้าน	2
โรงพยาบาล	1

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล สามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 เนื้อหาของการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและญาติผู้ดูแล มีเนื้อหาที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้

1.1.1 ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นเนื้อหาความรู้ที่ผู้ศึกษาในงานวิจัยส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องสอนให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล และกล่าวถึงเป็นลำดับต้นๆของการให้ความรู้ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว ได้แก่ ความรู้เรื่องโรค พยาธิวิทยา การรักษา สาเหตุการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว สาเหตุของภาวะน้ำเกิน อาการเตือนตั้งแต่เริ่มแรก อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวที่แย่งลง (ระดับ A: Cline et al., 1998; Holland et al., 2007; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Phillips et al., 2004; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงไธสง, 2547; Boonyapiphat, 2007; Dahl & Penque, 2000; Hoskins et al., 2001)

1.1.2 การรับประทานอาหารและน้ำ จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยพบว่า เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและน้ำ เน้นเรื่องการจำกัดโซเดียมและน้ำ มีการศึกษา 4 เรื่องกล่าวถึงการจำกัดโซเดียม 2 กรัมต่อวัน (ระดับ A: Koelling et al., 2005; ระดับ B: Bryant, 2002; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997) และการศึกษา 1 เรื่อง กล่าวถึงการจำกัดโซเดียม 3-4 กรัมต่อวัน (ระดับ B: Creson, 2001) มีการศึกษา 4 เรื่อง กล่าวถึงการจำกัดน้ำและมีความคิดเห็นตรงกันคือ 2 ลิตรต่อวัน (ระดับ A: Koelling et al., 2005; ระดับ B: Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997) และการศึกษา 1 เรื่อง (ระดับ B: Bryant, 2002) เน้นการสอนเฉพาะเนื้อหาของอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ชนิดของอาหารที่มีโซเดียมต่ำ และการอ่านปริมาณโซเดียมที่ฉลากอาหาร และผลการศึกษาพบว่าสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ ส่วนรูปแบบของการรับประทานอาหารอื่นๆที่แนะนำแก่ผู้ป่วย คือ การลดอาหารที่มีคลอเรสเตอรอล

(ระดับ B: Dahl & Penque, 2000) การรับประทานอาหารที่มีโปแตสเซียมสูง เช่น กลัวย ถั่ว หรือพืช มีฝัก ธัญพืช และผักที่มีใบมาก (ระดับ B: Creson, 2001)

1.1.3 การใช้ยา จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยหลายการศึกษา พบว่า ผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อยาที่ใช้รักษา ฤทธิ์ของยา ขนาด ส่วนประกอบของยา ปฏิกริยาของยากับอาหาร ผลข้างเคียงของยา (ระดับ A: Blue et al., 2001; Holland et al., 2007; Koelling et al., 2005; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550: วรินทร์ เวียงโสด, 2547) และเน้นให้ ผู้ป่วยต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ (ระดับ A: Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Koelling et al., 2005; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550; Dahl & Penque, 2000; Hoskins et al., 2001)

1.1.4 การดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหลักฐานงานวิจัย 5 เรื่อง แบ่งเป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 1 เรื่อง (Koelling et al., 2005) และระดับ B 4 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001) กล่าวถึงการ ดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การลดความอ้วน (ระดับ B: Dahl & Penque, 2000) การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ระดับ A: Koelling et al., 2005) การทำกิจกรรม การมีเพศสัมพันธ์ (ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550) การฝึกการหายใจและรักษาพลังงาน (ระดับ A: Koelling et al., 2005; ระดับ B: Hoskins et al., 2001) การพักผ่อน และการมาตรวจตาม นัดอย่างสม่ำเสมอ (ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550) หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อ หัวใจ เช่น การสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาในกลุ่ม NSAID (ระดับ A: Koelling et al., 2005; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001)

1.1.5 การออกกำลังกาย การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการฝึกการ ออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นการดูแลตนเองที่จำเป็นและช่วยลดการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีการศึกษาจำนวน 11 เรื่อง แบ่งเป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 5 เรื่อง (Blue et al, 2001; Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Romualdo et al., 1999) และระดับ B 6 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001) กล่าวถึงการออกกำลังกายและการส่งเสริมให้ผู้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ซึ่ง การศึกษา 1 เรื่อง ให้ความรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมการเดินที่บ้าน (ระดับ B: Boonyapiphat, 2007) และการศึกษา 1 เรื่อง (ระดับ A: Romualdo et al., 1999) กล่าวถึงโปรแกรม ฝึกการออกกำลังกายเป็นเวลา 12 เดือน โดยผู้ป่วยจะได้รับการฝึกสอนการออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อ สัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ที่ความแรง 60% ออกซิเจนสูงสุด การออกกำลังกายแต่ละครั้งจะใช้เวลา

เท่ากับ 1 ชั่วโมง โดยอบอุ่นร่างกาย 15-20 นาที และปั่นจักรยาน 40 นาที ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้

1.1.6 การเฝ้าระวังอาการที่ผิดปกติ ซึ่งต้องให้ความรู้ร่วมกับการฝึกทักษะการเฝ้าระวังตนเอง มีการศึกษา 8 เรื่อง แบ่งเป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 2 เรื่อง (Blue et al., 2001; Koelling et al., 2005) และระดับ B 6 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Shah et al., 1998) กล่าวถึง การชั่งน้ำหนักวันละครั้งและบันทึกน้ำหนักตัวทุกวัน การศึกษา 4 เรื่อง กล่าวถึง การมาพบแพทย์เมื่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2 ปอนด์ (1 กิโลกรัม) ในเวลา 2 วัน (ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550; Creson, 2001; Fonarow et al., 1997) หรือ 3-5 ปอนด์ต่อสัปดาห์ (ระดับ B: Dahl & Penque, 2000) โดย น้ำหนักที่เพิ่มมากกว่า 3 ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นอาการที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (ระดับ C: Martens, 2000) มีการศึกษาอย่างละ 1 เรื่อง กล่าวถึง การวัดความยาวรอบบริเวณเหนือข้อเท้า (ระดับ A: Cline et al, 1998) การฝึกทักษะการจับชีพจร การวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง (ระดับ B: Shah et al., 1998) และการเฝ้าระวังระดับ electrolyte ในเลือดโดยการตรวจ electrolyte เป็นประจำ (ระดับ A: Blue et al., 2001) และมีการศึกษา 2 เรื่อง กล่าวถึง การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ ได้แก่ เหนื่อยนอนราบไม่ได้ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ไม่ทนต่อกิจกรรมที่เคยปฏิบัติ บวม เบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยลง ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว และมีอาการข้างเคียงจากยาที่ได้รับ (ระดับ A: Cline et al., 1998; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550)

1.1.7 การจัดการกับอาการที่ผิดปกติ มีการศึกษา 3 เรื่อง แบ่งเป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 1 เรื่อง (Cline et al, 1998) และระดับ B 2 เรื่อง (Boonyapiphat, 2007; Fonarow et al., 1997) กล่าวถึง การสอนวิธีปรับขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเอง ได้แก่ การศึกษาของคลีน และคณะ (Cline et al, 1998) สอนวิธีการปรับขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบัติ คือ เมื่อมีอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวที่แย่ลง เช่น การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว บวมที่ข้อเท้า หอบเหนื่อย หายใจลำบาก และอ่อนล้า การศึกษาของโฟนาโรว์ และคณะ (Fonarow et al., 1997) สอนการปรับเพิ่มขนาดของยาขับปัสสาวะเมื่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2 ปอนด์ต่อวัน และควรรับประทานอาหารที่มีโปแตสเซียมเพิ่มขึ้น และการศึกษาของธนิดา บุญพิพัฒน์ (Boonyapiphat, 2007) สอนการปรับเพิ่มขนาดของยาขับปัสสาวะตามน้ำหนักตัวและตามปริมาณปัสสาวะ มีการศึกษา 1 เรื่อง กล่าวถึง การฝึกทักษะการใช้ออกซิเจนที่บ้านเพื่อการรักษา (ระดับ B: Hoskins et al., 2001) และมีการศึกษา 2 เรื่อง กล่าวถึง การหาแหล่งช่วยเหลือหรือใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคม เมื่อมีอาการผิดปกติ (ระดับ A: Blue et al., 2001; ระดับ B: วรินทร์ เวียงโสด, 2547)

1.2 องค์ประกอบของการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง พบว่าบุคลากรทีมสุขภาพที่ให้ความรู้เป็นพยาบาลมากที่สุด และพบว่าทั้งการให้ความรู้โดยพยาบาลหรือโดยพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพมีประสิทธิภาพช่วยลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ วิธีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นรายบุคคล หรือทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการให้ความรู้อย่างเดียว (ระดับ A: Blue et al., 2001; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; ระดับ B: Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002) ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ และการให้ความรู้ร่วมกับการฝึกทักษะการดูแลตนเอง (ระดับ A: Cline et al., 1998; ระดับ B: Boonyapiphat, 2007; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และมีทักษะการจัดการกับอาการที่ผิดปกติด้วยความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้เช่นกัน

1.3 อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้ ในแต่ละการศึกษาผู้ให้ความรู้จะใช้ อุปกรณ์และสื่อที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง มีการศึกษา 1 เรื่อง เน้นการออกแบบอุปกรณ์การสอนเรื่องอาหารที่มีโซเดียมต่ำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น การได้ยิน และผู้ป่วยที่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ (ระดับ B: Bryant, 2002) โดยการใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่ และมีรูปภาพประกอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ช่วยสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจเนื้อหาของอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ป้องกันการเข้าใจผิดและมีแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่มีโซเดียมต่ำ จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์การสอนช่วยสื่อในเนื้อหาที่เข้าใจยาก และเหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วย จะช่วยสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่จะใช้สื่อการสอนมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป ซึ่งพบว่า ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการรับรู้เร็ว และสามารถดูแลตนเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ระดับ A: Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547)

2. การดูแลต่อเนื่อง (continuing care) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การจัดการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจัยจำนวน 38 เรื่องในครั้งนี้ พบว่ามีการดูแลต่อเนื่อง 3 รูปแบบ คือ 1) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย 2) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในโรงพยาบาล และ 3) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับมีการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย พบการศึกษาจำนวน 18 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 10 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krantz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Kwok et al., 2008; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999) และระดับ B 8 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) ในแต่ละการศึกษามีวิธีการจัดการ และใช้ระยะเวลาการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายแตกต่างกันและคล้ายคลึงกัน ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

เรื่องที่	วิธีการจัดการ		ระยะเวลาการติดตาม หลังจำหน่าย (เดือน)
	ก่อนจำหน่าย	หลังจำหน่าย	
* 1	ผู้ป่วยได้รับการดูแล คำแนะนำ และ ได้รับความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ คือ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล เฉพาะทางด้านภาวะหัวใจล้มเหลว นัก กายภาพบำบัดและนักสังคมสงเคราะห์	ผู้ป่วยจะได้รับการติดต่อจากพยาบาล ทุกเดือน โดยในเดือนแรกจะให้การ โทรศัพท์เยี่ยมสัปดาห์ละครั้ง ร่วมกับ เยี่ยมบ้าน 2 ครั้ง	18
3	การรักษาด้วยยา β -blocker คือ carvedilol 3.125 มก. วันละ 2 ครั้ง การเยี่ยมจากพยาบาลผู้จัดการราย กรณี (nurse manager) 1 ครั้ง	เยี่ยมบ้านโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (nurse manager) ภายใน 2 สัปดาห์ และ จะเยี่ยมบ้าน ทุก 2 สัปดาห์ จนกระทั่ง คงที่เพื่อปรับขนาดของยา β -blocker รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้ความรู้	6
* 4	ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมตั้งแต่ใน โรงพยาบาลจากพยาบาลชุมชน	เยี่ยมบ้านโดยพยาบาลชุมชน สัปดาห์ ละครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังจาก นั้นเดือนละครั้ง เพื่อให้คำปรึกษาและ แนะนำเรื่อง สุขภาพ รับประทานยา อาหาร และผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ ติดต่อกับพยาบาลชุมชนเมื่อมีอาการ ผิดปกติทั้งทางเพจเจอร์และโทรศัพท์ มือถือ	6

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112; * หมายถึง nonsignificant

ตารางที่ 7 แสดงวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ต่อ)

เรื่องที่	วิธีการจัดการ		ระยะเวลาการติดตาม
	ก่อนจำหน่าย	หลังจำหน่าย	
9	ให้ความรู้โดยพยาบาลเป็นรายบุคคล	โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการและการดูแลตนเองในวันที่ 30, 90, และ 180	6
12	การให้ความรู้โดยพยาบาลเป็นรายบุคคล	เยี่ยมบ้านภายใน 2 สัปดาห์หลังการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยรายที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาล และใช้โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยทุกราย โดยโทรศัพท์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และหลังจากนั้นเดือนละครั้ง เป็นเวลา 1 ปี	12
15	ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ	ลดจำนวนครั้งของการเยี่ยมบ้านลง และเพิ่มการติดตามดูแลโดยใช้โทรศัพท์ติดต่อเมื่อจำเป็น (ไม่ระบุจำนวนครั้งของการเยี่ยมบ้าน)	12
19	ผู้ป่วยได้รับการดูแล และวางแผนจำหน่ายโดยทีมสุขภาพ ประกอบด้วย พยาบาลฟื้นฟูหัวใจ โภชนากร นักสังคมสงเคราะห์ เกษตรกร พยาบาลชุมชน	นัดผู้ป่วยมาพบกับแพทย์เจ้าของไข้ และแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจที่คลินิก ผู้ป่วยนอกภายใน 2 สัปดาห์ มีการเยี่ยมบ้านโดยพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ ภายใน 7-14 วัน ที่ 3 เดือน และ 6 เดือน จะติดตามโดยใช้โทรศัพท์	6
22, * 23	ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมวันละครั้ง โดย พยาบาล โภชนากร หรือ แพทย์ (geriatric cardiologist) ให้ความรู้ แก่ผู้ป่วย และครอบครัว	เยี่ยมบ้านภายใน 24-48 ชั่วโมง โดย หน่วย home care ของโรงพยาบาล จะเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละครั้ง จำนวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นจะติดตามโดยใช้โทรศัพท์	3

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112; * หมายถึง nonsignificant

ตารางที่ 7 แสดงวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ต่อ)

เรื่องที่	วิธีการจัดการ		ระยะเวลาการติดตาม
	ก่อนจำหน่าย	หลังจำหน่าย	
24	ผู้ป่วยและญาติได้รับการสอนและฝึกทักษะการดูแลตนเองเป็นรายบุคคล	ใช้โทรศัพท์ในวันที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 และ 3 เมื่อผู้ป่วยมีปัญหา หรือสงสัยสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับพยาบาลได้ตลอดเวลา	1
25	ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบครอบครัว โดยทีมการดูแล การให้ความรู้ นำผู้ป่วยและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลรักษา	นัดที่คลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว พร้อมทั้งให้กิจกรรมการดูแลเข้าในกรณีที่ยังมีปัญหาสุขภาพอยู่ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และปัญหาด้านจิตสังคมทั้งที่คลินิกภาวะหัวใจล้มเหลวและทางโทรศัพท์	12
26	ผู้ป่วยได้รับการสอนสุขศึกษาและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล	การติดตามที่คลินิกเฉพาะภาวะหัวใจล้มเหลวและการติดตามทางโทรศัพท์ในกรณีจำเป็น	12
31	การดูแลจากพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN) โดยพยาบาลจะไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ดูแล ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล	โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่าย และนัดผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอกตามตารางนัด	12
33	การปฏิบัติตาม clinical pathway ได้แก่ การประเมินผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม การให้ความรู้เป็นรายบุคคล โดยพยาบาล	ใช้โทรศัพท์ ติดตามประเมินอาการ พยาบาลและให้ความรู้เพิ่มเติม	ไม่ระบุ
34	ผู้ป่วยได้รับการจัดการดูแลจากพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN)	ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะติดตามสนับสนุนให้ความรู้ ช่วยเหลือและเฝ้าระวังทางโทรศัพท์	3

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112

ตารางที่ 7 แสดงวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ต่อ)

เรื่องที่	วิธีการจัดการ		ระยะเวลาการติดตาม หลังจำหน่าย (เดือน)
	ก่อนจำหน่าย	หลังจำหน่าย	
35	ให้ความรู้เรื่องโรค ยา และอาหาร การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก การนับชีพจร	ส่งข้อความเตือนเมื่อถึงเวลารับประทาน ยาทางเพจเจอร์ และพยาบาลโทรศัพท์ ติดต่อกับผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อ ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติสามารถโทรศัพท์ ติดต่อกับพยาบาลได้ 24 ชั่วโมง และ สามารถส่งแฟกซ์ข้อมูลอาการของ ผู้ป่วยถึงพยาบาลได้ เพื่อช่วยจัดการ กับอาการที่ผิดปกติ	12
36	การดูแลรักษาโดยใช้ยาที่ เหมาะสมกับภาวะหัวใจล้มเหลว การให้ความรู้อย่างมีแบบแผนแก่ ผู้ป่วยและครอบครัว แบบเป็น กลุ่มหรือเป็นรายบุคคลโดย heart failure clinical nurse specialist	แพทย์เจ้าของไข้จะส่งต่อผู้ป่วยให้ cardiologists เป็นผู้ดูแลภายใน 3 วัน และจะนัดมาพบกับ cardiologists สัปดาห์ละครั้ง จนอาการคงที่ เมื่อมี การปรับยาในการรักษาผู้ป่วยจะได้รับ โทรศัพท์สอบถามอาการหลังจากการ ปรับยา 2-3 วัน และจะโทรศัพท์เยี่ยม ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 8	6

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112

2.2 การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในโรงพยาบาล ขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เป็นการดูแลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล พบการศึกษาจำนวน 1 เรื่อง คือ การศึกษาของลัทธิตี และคณะ (ระดับ B: Luthi et al., 2003) พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI ตามขนาดเป้าหมายขณะจำหน่ายมีอัตราและความถี่ของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI แต่น้อยกว่าขนาดเป้าหมาย และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการศึกษาี้แสดงให้เห็นว่า การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยการปรับขนาดยา ACEI ให้ได้ตามขนาด

เป้าหมายก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสามารถลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้

2.3 การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจำหน่าย จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้นับพบการศึกษาจำนวนมากถึง 24 เรื่อง มีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสนับสนุนให้การรักษายาและการดูแลตามความต้องการของผู้ป่วยภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยการนัดผู้ป่วยมาตรวจตามนัดที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือที่คลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน วิธีการจัดการดูแลหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแสดงไว้ในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

เรื่องที่	วิธีการจัดการ	ระยะเวลาการติดตาม หลังจำหน่าย (เดือน)
3	1) การเยี่ยมบ้าน -เยี่ยมบ้านโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (nurse manager) ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล และทุก 2 สัปดาห์ จนกระทั่งคงที่	6
* 6	-เยี่ยมบ้านโดยเภสัชกร 2 ครั้ง ครั้งแรกภายใน 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 ภายใน 6-8 สัปดาห์	6
14	-เยี่ยมบ้านโดยพยาบาลและเภสัชกรภายใน 7-14 วัน หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล	72
18	-เยี่ยมบ้านโดยพยาบาลและเภสัชกรภายใน 1 สัปดาห์ หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล	18
21	-เยี่ยมบ้านโดยพยาบาลและเภสัชกรภายใน 1 สัปดาห์ หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล	6
9	2) การใช้โทรศัพท์ -โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยจำนวน 3 ครั้ง คือในวันที่ 30, 90 และ 180 หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล	6
13	-โทรศัพท์ติดต่อภายใน 5 วัน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น และผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้เมื่อจำเป็น	6

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112; * หมายถึง nonsignificant

ตารางที่ 8 แสดงวิธีการจัดการดูแลหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ต่อ)

เรื่องที่	วิธีการจัดการ	ระยะเวลาการติดตาม หลังจำหน่าย (เดือน)
2) การใช้โทรศัพท์ (ต่อ)		
24	- โทรศัพท์ ติดตามจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 3 หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในแต่ละครั้งของการโทรศัพท์จะใช้เวลาในการพูดคุยประมาณ 10-15 นาที รวมทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลสามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย	1
32	- ผู้ป่วยโทรศัพท์ ติดต่อกับ call center ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ (RNs) ที่มีประสบการณ์ด้านโรคหัวใจ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วัน ต่อสัปดาห์	18
34	- โทรศัพท์ติดตามเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล	3
36	- โทรศัพท์เมื่อมีการปรับยาในการรักษาผู้ป่วยโดยโทรศัพท์สอบถามอาการหลังจากการปรับยา 2-3 วัน และโทรศัพท์เยี่ยมในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 8	6
* 5	3) ใช้ระบบวิดีโอสื่อสาร (video conference) ติดต่อกับพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคจะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อติดตั้งเครื่องมือ และอธิบายวิธีการใช้พร้อมกับฝึกทักษะการใช้ให้ผู้ป่วย	3
16	4) ใช้ home telecare ได้แก่ ระบบวิดีโอสื่อสาร (video-conference) และโทรศัพท์ (telephone care) โดยพยาบาลตามตารางการเยี่ยมในช่วงเวลา 8.00 AM ถึง 5.00 PM วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และผู้ป่วยสามารถติดต่อกับพยาบาลได้เมื่อมีคำถาม หรือปัญหาเร่งด่วน	2

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112; * หมายถึง nonsignificant

ตารางที่ 8 แสดงวิธีการจัดการดูแลหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ต่อ)

เรื่องที่	วิธีการจัดการ	ระยะเวลาการติดตาม หลังจำหน่าย (เดือน)
5) ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ		
10	- ใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์เพื่อส่งไฟล์เอกสารข้อมูลความรู้ ภาพวิดีโอ และกราฟแสดงน้ำหนักของผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยทุก 3-4 สัปดาห์ร่วมกับการใช้โทรศัพท์พูดคุย	ไม่ระบุ
35	- ใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์เพื่อส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้ป่วย ใน 8 สัปดาห์แรก ร่วมกับการใช้เพจเจอร์ส่งข้อความเตือนเมื่อถึง เวลารับประทานยา และใช้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ป่วยสัปดาห์ ละครั้ง หรือเมื่อมีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ ติดต่อกับพยาบาลได้ 24 ชั่วโมง หรือส่งข้อมูลอาการที่ผิดปกติโดยการส่งโทรสาร (fax) ให้กับพยาบาล	12
6) การเยี่ยมบ้านร่วมกับการใช้โทรศัพท์		
7	- เยี่ยมบ้านภายใน 7-14 วัน โดยพยาบาลและเภสัชกรหรือโดย พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ หลังจากนั้นจะติดตามเยี่ยมทาง โทรศัพท์	120
12	- เยี่ยมบ้านภายใน 2 สัปดาห์หลังการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยราย ที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาล และใช้โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยทุกราย โดยโทรศัพท์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์และหลังจากนั้นเดือนละครั้ง เป็น เวลา 1 ปี	12
15	- ใช้วิธีลดจำนวนครั้งของเยี่ยมบ้านลง และเพิ่มการดูแลโดยใช้ โทรศัพท์ติดต่อเมื่อจำเป็น	1
22, *23	- เยี่ยมบ้านภายใน 24-48 ชั่วโมง โดยหน่วย home care และทีม ผู้วิจัย สัปดาห์ละครั้งจำนวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นจะติดตามทาง โทรศัพท์	3

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112; * หมายถึง nonsignificant

ตารางที่ 8 แสดงวิธีการจัดการดูแลหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ต่อ)

เรื่องที่	วิธีการจัดการ	ระยะเวลาการติดตาม หลังจำหน่าย (เดือน)
20, 25, 26	7) การติดตามที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกเฉพาะผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับการใช้โทรศัพท์ -นัดผู้ป่วยมาพบที่โรงพยาบาลโดยตรง ที่คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ใช้โทรศัพท์ติดตามเฉพาะในผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและในกรณีจำเป็น	12
19	8) การติดตามที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกเฉพาะผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลว ร่วมกับการเยี่ยมบ้านและการใช้โทรศัพท์ -นัดผู้ป่วยมาพบที่แพทย์เจ้าของไข้และแพทย์เฉพาะทางด้าน โรคหัวใจที่คลินิกผู้ป่วยนอกภายใน 2 สัปดาห์ เยี่ยมบ้านโดย พยาบาลเฉพาะทางด้านโรคหัวใจภายใน 7-14 วัน และใช้ โทรศัพท์ติดตามในเดือนที่ 3, 6	6

หมายเหตุ : เรื่องที่ หมายถึง ลำดับเรื่องงานวิจัยในบทที่ 3 หน้า 43-112

จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต่อเนื่อง พบว่า การดูแลผู้ป่วยขณะ
เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยการให้การรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพก่อนการ
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยการรักษาดูแลด้วยยา ACEI ตามขนาดเป้าหมาย (target dose) ขณะ
จำหน่าย สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล โดยการนัดผู้ป่วยมาตรวจตามนัดที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือที่คลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลว ซึ่งมีพยาบาลเป็นผู้จัดการในคลินิกทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพ
และมีติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ และ
พบว่าการศึกษานี้ส่วนใหญ่กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยทั้งขณะเข้ารับการรักษาร่วมกับการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้านภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลซึ่งผลการศึกษาพบว่าไม่มีประสิทธิผลในการลด
การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออก
จากโรงพยาบาล ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ รูปแบบและวิธีการติดตามดูแล
ผู้ป่วย และระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วย

1. รูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการดูแลหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล พบว่า มีการศึกษาจำนวน 4 เรื่อง (ระดับ A: Karntz et al., 2008; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002) ใช้เฉพาะวิธีการเยี่ยมบ้านภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล พบว่า สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของฟิลลิปส์และคณะ (ระดับ A: Phillips et al., 2004) พบว่าระยะเวลาการเยี่ยมบ้านแตกต่างกันตามการศึกษา ตั้งแต่ 1-3.5 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย คือ 2 ชั่วโมง และพบว่าสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้ มีการศึกษาจำนวน 6 เรื่อง (ระดับ A: Koelling et al., 2005; Riegel et al., 2002; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997) ใช้เฉพาะการโทรศัพท์ในการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย พบว่า สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย การศึกษา 1 เรื่อง ใช้โทรศัพท์ติดตามภายใน 5 วันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้เมื่อจำเป็น การศึกษา 3 เรื่อง ใช้โทรศัพท์ ติดตามจำนวน 3 ครั้ง หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และการศึกษา 1 เรื่อง ผู้ป่วยโทรศัพท์ติดต่อกับ call center ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และมีการศึกษาจำนวน 5 เรื่อง (ระดับ A: Blue et al., 2001; Inglis et al., 2006; Krumholz et al., 2002; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) ที่ใช้ทั้งการเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์ในการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย พบว่าสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การใช้ระบบ home telecare โดยใช้การสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยใช้ video-conference ผสมผสานกับ electronic stethoscope และการใช้ telephone care โดยพยาบาลโทรศัพท์พูดคุยช่วยลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ (ระดับ A: Jerant et al., 2001) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เฉพาะระบบวิดีโอสื่อสาร (video conference) เพียงอย่างเดียว พบว่า ไม่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ (ระดับ A: Woodend et al., 2008)

การดูแลต่อเนื่องภายหลังการจำหน่าย โดยการใช้หลายวิธีร่วมกันสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีร่วมกับการใช้โทรศัพท์ เช่น การศึกษา 1 เรื่อง (ระดับ A: Gwadry-Sridher et al., 2004) เป็นการทบทวนหลักฐานงานวิจัยอย่างเป็นระบบ พบ การศึกษา 1 เรื่อง ใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์เพื่อส่งไฟล์เดอร์ข้อมูลความรู้ ภาพวิดีโอ และกราฟแสดงน้ำหนักของผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยทุก 3-4 สัปดาห์ร่วมกับการใช้โทรศัพท์พูดคุย และการศึกษา 1 เรื่อง (ระดับ B: Shah et al., 1998) ใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์เพื่อส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้ป่วยใน 8 สัปดาห์แรก ร่วมกับการใช้เพจเจอร์ส่งข้อความเตือนเมื่อถึงเวลารับประทานยา และใช้

โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อมีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับพยาบาลได้ 24 ชั่วโมง หรือส่งข้อมูล อาการที่ผิดปกติโดยการส่งโทรสาร (fax) ให้กับพยาบาล

นอกจากนี้ ยังพบว่า การติดตามดูแลผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือคลินิกเฉพาะทาง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยการนัดผู้ป่วยมาตรวจตามตารางนัด ร่วมกับการใช้โทรศัพท์ (ระดับ A: Cline et al, 1998; ระดับ B: วรินทร์ เวียงโอสถ, 2547; Boonyapiphat, 2007) หรือร่วมกับการเยี่ยมบ้านและการใช้โทรศัพท์ (ระดับ A: Stewart et al., 1999) สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วย จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ พบว่าแต่ละการศึกษากำหนดระยะเวลาในการติดตามดูแลผู้ป่วยแตกต่างกัน คือ อยู่ในช่วง 1 เดือน ถึง 10 ปี ซึ่งการติดตามดูแลผู้ป่วยนาน 6 เดือน เป็นระยะเวลาที่ใช้มากที่สุด มีจำนวน 8 เรื่อง รองลงมา คือ ระยะเวลา 1 ปี มีจำนวน 6 เรื่อง ระยะเวลา 1 เดือน มีจำนวน 3 เรื่อง ระยะเวลา 18 เดือน มีจำนวน 2 เรื่อง และระยะเวลา 2 เดือน 3-6 ปี และ 7.5-10 ปี มีจำนวนอย่างละ 1 เรื่อง ตามลำดับ และพบว่าการใช้ระยะเวลาติดตามดูแลผู้ป่วยนาน สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ เช่น มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสจ๊วต และคณะ (ระดับ A: Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, & Horowitz, 2002) ใช้วิธีการเยี่ยมบ้านโดยพยาบาลและเภสัชกร เช่นเดียวกัน แต่ใช้เวลาติดตามดูแลผู้ป่วยนานแตกต่างกัน คือ การศึกษาในปี 1998 ใช้ระยะเวลาติดตามนาน 6 เดือน พบว่าการเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้งในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .03$) ต่อมาการศึกษาในปี 1999 (Stewart et al., 1999) ใช้ระยะเวลาการติดตามดูแลผู้ป่วยนาน 18 เดือน พบว่า การเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .02$) และการศึกษาในปี 2002 (Stewart, & Horowitz, 2002) ใช้เวลาติดตามนาน 3-6 ปี พบว่าการเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .01$)

3. การดูแลโดยทีมสุขภาพ (healthcare team approach intervention) เป็นระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีการทำงานเป็นทีม จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ พบการศึกษาจำนวนมาก ถึง 19 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 13 เรื่อง (Blue et al, 2001; Cline et al, 1998; Inglis et al., 2006; Karntz et al., 2008; Koshman et al., 2008; Kwok et al., 2008; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Riegel et al., 2002; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999; Stewart & Horowitz, 2002) และระดับ B 6 เรื่อง (วรินทร์ เวียงโอสถ, 2547; Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997) กล่าวถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยทีมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลายๆ

วิชาชีพเข้าร่วมทีมดูแลผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับการดูแลรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าบุคลากรในทีมสุขภาพที่เข้าร่วมทีมดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบด้วย พยาบาล แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งแต่ละวิชาชีพมีบทบาทและหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในทีมสุขภาพ

บุคลากรในทีมสุขภาพ	บทบาทและหน้าที่
พยาบาล แบ่งออกเป็น พยาบาลวิชาชีพ (RNs) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหัวใจล้มเหลว (HF nurse) พยาบาลชำนาญการเฉพาะโรคหัวใจ (cardiac nurse) พยาบาลฟื้นฟูหัวใจ (cardiac rehabilitation nurse) พยาบาลชุมชน (community nurse) พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (nurse manager) พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN) และพยาบาลหน่วยดูแลที่บ้าน (home care nurse)	-ประเมินผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุม ทั้งอาการทางคลินิก ความรู้และภาวะทางคลินิก วางแผนการจำหน่าย จัดระบบการส่งต่อ ติดต่อประสานงานกับทีมผู้ดูแล ให้ความรู้และคำปรึกษา ร่วมสร้างแนวปฏิบัติ (protocol) ในการดูแลรักษา ติดตามให้การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย
แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ	-ตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ป่วย ค้นหาสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ให้การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย คัดกรองการรักษาที่ไม่จำเป็น ซึ่งช่วยให้การรักษามีระเบียบแบบแผนมากขึ้น ทำให้ไม่เกิดความยุ่งยากในการรักษา รวมทั้งเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลว
เภสัชกร	-เป็นให้ความรู้ การจัดการเรื่องยา เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ในการใช้ยารักษาผู้ป่วย ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยา ชี้แนะแนวทางสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน หาวิธีช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 9 แสดงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในทีมสุขภาพ (ต่อ)

บุคลากรในทีมสุขภาพ	บทบาทและหน้าที่
โภชนากร	-เป็นผู้ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องของอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีโรคอื่นร่วมด้วย และการควบคุมอาหาร
นักกายภาพบำบัด หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ	-การดูแลเรื่องการรักษาด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ประเมินความพร้อมในการออกกำลังกาย ให้ความรู้และฝึกสอนโปรแกรมการออกกำลังกาย
นักสังคมสงเคราะห์	-เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการจำหน่ายและการดูแลผู้ป่วยหลังการจำหน่าย เป็นที่ปรึกษาด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา และสิทธิต่างๆที่ผู้ป่วยใช้ในการรักษา
วิชาชีพอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ (respiratory therapists) จิตแพทย์	-ให้ความรู้และฝึกสอนการหายใจ และเทคนิคการ รักษา พลังงาน -เป็นที่ปรึกษาและรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจิตสังคมในขั้นรุนแรงเพื่อให้ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม

เมื่อเปรียบเทียบกับ การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง พบว่าไม่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ เช่น การศึกษาของจาร์มา และคณะ (ระดับ A: Jaarsma et al., 2008) ศึกษาเปรียบเทียบการดูแลผู้ป่วย 3 รูปแบบ คือ 1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) เพียงวิชาชีพเดียว 2. ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) ร่วมกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure nurse) ให้การดูแลต่อที่คลินิกผู้ป่วยนอก และ 3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure nurse) นักกายภาพบำบัด โภชนากร และนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) ร่วมกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure nurse) และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล

จากทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลเฉพาะจากแพทย์โรคหัวใจ (cardiologist) เพียงวิชาชีพเดียว แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

การศึกษาของไวค และคณะ (ระดับ A: Kwok et al., 2008) ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับจากพยาบาลชุมชน (community nurse) เพียงวิชาชีพเดียว โดยผู้ป่วยจะได้รับการเยี่ยมจากพยาบาลชุมชนภายใน 7 วัน ก่อนจำหน่าย และดูแลต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบ้านหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าอัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลุ่มที่ได้รับการดูแลเฉพาะจากพยาบาลชุมชนไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบปกติ ($p = .233$) ส่วนการศึกษาของฮอลแลนด์ และคณะ (Holland et al., 2007) ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับจากเภสัชกรชุมชน (community pharmacists) เพียงวิชาชีพเดียว โดยการเยี่ยมบ้านและให้ความรู้หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าไม่สามารถลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ อีกทั้งการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มทดลองยังมากกว่ากลุ่มควบคุมอีกด้วย (134 และ 112 ครั้ง $p = .28$) สอดคล้องกับการทบทวนหลักฐานทางวิชาการอย่างเป็นระบบของคอสแมน และคณะ (Koshman et al., 2008) พบว่า ผลลัพธ์ที่จากเภสัชกรที่เข้าร่วมทีมการดูแลผู้ป่วยนำไปสู่การลดอัตราการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยด้วยสาเหตุจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้มากกว่าการที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยเภสัชกรเพียงวิชาชีพเดียว ($OR = 0.89$; $95\% CI = 0.68-1.17$)

นอกจากนี้ ยังพบว่า การที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) ช่วยให้การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์สาขาอื่น (ระดับ B: Jong et al., 2007) การใช้พยาบาลทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณี (nurse manager) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา β -blocker รักษาสามารถลดอัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ (ระดับ A: Krantz et al., 2008) และการใช้พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งขณะผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีบทบาทในการประเมินผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุมทั้งอาการทางคลินิก ความรู้ และภาวะทางคลินิก วางแผนการจำหน่าย จัดระบบการส่งต่อ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในทีมสุขภาพ การให้ความรู้และให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และติดตามให้การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสามารถลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) (ระดับ B: Dahl & Penque, 2000) และจำนวนการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลง (ระดับ B: Draus et al., 2002)

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ยังพบว่า มีการศึกษาจำนวนมากถึง 20 เรื่อง แบ่งเป็น หลักฐานทางวิชาการระดับ A 12 เรื่อง (Blue et al, 2001; Cline et al, 1998; Inglis et al., 2006; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999; Stewart & Horowitz, 2002) และระดับ B 8 เรื่อง (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) ที่ใช้ทั้ง 3 องค์ ประกอบรวมกัน ได้แก่ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลโดยทีมสุขภาพ ผลการศึกษาทั้งหมด พบว่า สามารถลดการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ห่อถักของ กอเดร-สรีดเธอร์ และคณะ (Gwadry-Sridher et al., 2004) พบว่า โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (RR= 0.79, 95% CI= 0.68-0.91, $p < .001$) และการวิเคราะห์ห่อถักของฟิลลิปส์และคณะ (Phillips et al., 2004) พบว่า การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยแบบครอบคลุมโดย การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการสนับสนุนดูแลผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวภายหลังการจำหน่าย สามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (RR = 0.75, 95% CI= 0.64-0.88)

จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยทั้ง 38 เรื่อง ได้องค์ความรู้ที่สำคัญในการจัดการเพื่อลด การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ทำให้เกิดความเข้าใจการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วยร่วมกับญาติผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามา รักษาซ้ำในโรงพยาบาลควรใช้ทั้ง 3 องค์ ประกอบรวมกัน ได้แก่ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแล ตนเอง การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลโดยทีมสุขภาพ ซึ่งทั้ง 3 องค์ ประกอบมีความสอดคล้องกัน และมีประสิทธิผลในการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้

บทที่ 5

การอภิปรายผล

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ศึกษาได้สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบในช่วงเวลา 18 ปี ทำให้ได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 38 เรื่อง จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่ามีผลงานการวิจัยอยู่ในระดับ A จำนวน 23 เรื่อง ระดับ B จำนวน 13 เรื่อง และระดับ C จำนวน 2 เรื่อง แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพียงพอ และจากหลักฐานงานวิจัยที่อยู่ในระดับ A จำนวนมากแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาน่าเชื่อถือสามารถนำไปปฏิบัติได้

การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นปัญหาที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก และส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำเป็นต้องใช้หลายองค์ประกอบร่วมกัน ได้แก่ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทั้งขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลและมีการดูแลภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และการดูแลโดยทีมสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม และที่สำคัญคือความสามารถของพยาบาลในการจัดการเพื่อลดการกลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาล อีกทั้งผู้ป่วยจะต้องมีภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว และมีความเชื่อด้านสุขภาพที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกัน (ACC/AHA) ซึ่งได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติการประเมินและจัดการกับภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (Draus, Walblay, & Barraco, 2002)

แนวทางปฏิบัตินี้มุ่งเน้นการพึงระวังปัจจัยชักนำที่ทำให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีอาการรุนแรงขึ้น และเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง หลักสำคัญของการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาคือ การจัดการกับสาเหตุ ทั้งสาเหตุด้านตัวผู้ป่วยโดยการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง และด้านการบริการการดูแลโดยใช้รูปแบบของการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุมทั้งขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ร่วมกับการดูแลภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และการใช้ทีมสุขภาพเข้าร่วมดูแลผู้ป่วย โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติ

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง พบว่า เน้นศึกษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการกลับเข้ามารักษาคือในโรงพยาบาล ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้อายุของกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 70 ปี ถึง 24 เรื่อง และมีงานวิจัยจำนวน 8 เรื่อง (Bryant, 2002; Hoskins et al., 2001; Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Proctor et al., 2000; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ และมีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ามารักษาคือในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง (Kwok et al., 2008) สอดคล้องกับการศึกษาของเนลเลอร์ และคณะ (Naylor et al., 1999) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังและรุนแรง รวมทั้งมักมีโรคร่วมหลายโรค ส่งผลให้ภาวะการทำหน้าที่และระดับความสามารถในการดูแลตนเองลดลง และมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีพอลงหลังจากออกจากโรงพยาบาล คือ ขาดการมารักษาอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ามารักษาคือในโรงพยาบาล 2) กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับของภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง คือ ระดับ III-IV (Fonarow et al., 1997; Jaarsma et al., 2008) และกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (Ejection Fraction: EF) น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 (Boonyapiphat, 2007; Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krumholz et al., 2002; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998; Romualdo et al., 1999) ซึ่งผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวในระดับสูง คือ ระดับ III และ IV จะมีค่า Ejection Fraction (EF) ลดลง และมีความทนต่อการทำกิจกรรมน้อย มีความทุกข์ทรมานจากอาการหอบเหนื่อย คุณภาพชีวิต และการกลับเข้ามารักษาคือในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น (Anderson et al., 2006; Armola & Topp, 2001) และ 3) กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Stewart et al., 1999;

Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002) จากการศึกษาของวินสัน และคณะ (Vinson et al., 1990) พบว่า ผู้ป่วยที่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ก่อน และมีประวัติของการเข้ามารักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จะมีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเร็วขึ้น

การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

จากการทบทวนงานวิจัยจำนวน 38 เรื่องในครั้งนี้ พบว่า การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ศึกษามีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันหรือจัดการปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สามารถควบคุมได้ และเน้นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุมทั้งขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ร่วมกับมีการดูแลภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รูปแบบของการจัดการที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง 2) การดูแลต่อเนื่อง และ 3) การดูแลโดยทีมสุขภาพ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน

1. การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง (self-care: supportive educational intervention) เป็นการสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล เป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุด เนื่องจากการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Martens, 2000) การให้ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ควรนำญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย โดยเฉพาะเมื่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ไม่สามารถพัฒนาให้ถึงระดับที่จะสนองตอบต่อความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมดได้ (สมจิต หนูเจริญกุล, 2544) และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งความสามารถในการดูแลตนเองจะลดลง การนำญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Dahl & Penque, 2000; Hoskins et al., 2001; Inglis et al., 2006; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพ์ใจ ญนจะโปะ (2547) วรินทร์ เวียงโสด (2547) และนิภาพร ประจันบาน (2550) ซึ่งพบว่าการส่งเสริมความสามารถของผู้ป่วยในการดูแลตนเองและส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้

การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและญาติผู้ดูแลมีเป้าหมายสำคัญ คือการสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเองเพื่อให้เกิดแรงจูงใจระยะยาวโดยไม่ล้มเลิกความพยายามในการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต การอดทนต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และมีพฤติกรรมดูแลตนเองที่ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนโดยพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและญาติผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้และยังไปกว่านั้นเมื่อผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรทีมสุขภาพ จะยิ่งทำให้มีความมั่นใจในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการดูแลตนเองที่เหมาะสมสามารถควบคุมความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวได้

จากงานวิจัยที่ศึกษาส่วนใหญ่เนื้อหาของ การให้ความรู้จะให้ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องพยาธิสภาพภาวะหัวใจล้มเหลว สาเหตุ อาการและอาการแสดง การดูแลตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานยาที่มีโซเดียมต่ำ การจำกัดน้ำ การรับประทานยา การเฝ้าระวังและการจัดการกับอาการที่ผิดปกติ การชั่งน้ำหนักตัว การสอนวิธีปรับยาขับปัสสาวะด้วยตนเอง จัดหาแนวทางและเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉินว่าจะต้องติดต่อใครและต้องปฏิบัติตัวอย่างใด การให้ความรู้เช่นนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเองหรือทักษะได้บางประการ แต่การเรียนรู้จะเพิ่มขึ้นจากการมีส่วนร่วมและการได้ฝึกปฏิบัติ (สมจิต หนูเจริญกุล, 2544) สอดคล้องกับการศึกษาของริเกล และดิคสัน (Riegel & Dickson., 2008) พบว่า ความสามารถในการดูแลตนเองจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีความรู้มาก มีทักษะและมีประสบการณ์ และการศึกษาของจันท์จิรา เกียรติสีสกุล (2551) พบว่า การสอนการดูแลตนเองเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว และฝึกปฏิบัติการดูแลตนเองเพื่อประเมินการคั่งของน้ำและเกลือโซเดียม ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และพฤติกรรมดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคั่งของน้ำและเกลือโซเดียมอย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้สามารถควบคุมหรือลดระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวได้ อีกทั้งการให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสฝึกทักษะการกระทำต่างๆในการดูแลตนเอง เช่น การชั่งน้ำหนัก การจับชีพจร การวัดความดันโลหิต การปรับยาขับปัสสาวะด้วยตนเอง และให้โอกาสผู้ป่วยได้ทดลองฝึกในสิ่งที่ไม่เกิดอันตราย การลองผิดลองถูก ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดและเมื่อพยาบาลแนะนำวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ป่วยและจำได้แม่นยำมากขึ้น (สมจิต หนูเจริญกุล, 2544)

การฝึกทักษะให้แก่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในการปรับขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง เป็นงานวิจัยจากต่างประเทศ 2 เรื่อง (Cline et al., 1998; Fonarow et al., 1997) และงานวิจัยของประเทศไทย 1 เรื่อง (Boonyapiphat, 2007) พบว่าการฝึกสอนให้ผู้ป่วยสามารถปรับขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองมีส่วนช่วยในการลดการกลับเข้า

มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของพราสัน และคณะ (Prasun et al., 2005) ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่า การฝึกสอนการปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ช่วยให้ผู้ป่วยมีความทนต่อการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น การเข้ามารักษาที่ห้องฉุกเฉินลดลง ส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในครั้งนี้ พบว่าการศึกษาเรื่องการฝึกสอนให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถปรับขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเองสามารถเพิ่มผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ แต่การศึกษาเรื่องนี้ในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมของผู้ป่วยในการปรับยาด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาการนำมาใช้ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังพบว่าการสอนและฝึกการออกกำลังกายและการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เป็นการดูแลตนเองที่พบว่าสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ (Romualdo et al., 1999) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์ใจ จุณจะโปะ (2547) ศึกษาโปรแกรมการเดินออกกำลังกายที่บ้าน และมีการติดตามเยี่ยมบ้านในช่วงเริ่มต้นของการฝึกเดินทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 6-9 จะใช้วิธีโทรศัพท์ติดตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งสิ้นสุดโปรแกรม ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและระยะทางที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถเดินได้บนพื้นราบในเวลา 6 นาที ของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการเดินออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและระยะทางที่สามารถเดินได้บนพื้นราบในเวลา 6 นาที ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ดังนั้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เนื่องจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อผู้ป่วย และพบว่าไม่มีผลแทรกซ้อนรุนแรงอีกทั้งยังเกิดผลดี ทำให้มีความสามารถในการทำงานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และทำให้การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลง (ปิยะนุช รักพานิชย์, 2549; วิศาล คันธรัตน์กุล, 2548; อมราวดี บุญยรัตน์, 2550; Adams & Bennett, 2000)

วิธีการให้ความรู้สามารถทำได้โดยตรงเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยใช้สื่อต่างๆช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การให้ความรู้เป็นรายบุคคลแก่ผู้ป่วยและญาติ ผู้ดูแลเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด สามารถพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล และพิจารณาให้ตามการดำเนินโรคของผู้ป่วย เพราะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลสามารถให้การดูแลตนเองได้ตามภาวะโรค (Kim & Soeken, 2005) ส่วนการให้ความรู้เป็นกลุ่มมีวิธีการที่เหมาะสมและ

พบมาก คือ ใช้การพูดคุยและฉายวิดีโอ การออกแบบอุปกรณ์ต่างๆเป็นสื่อในการให้ความรู้จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เช่น การศึกษาของไบรอันท์ และคณะ (Bryant, 2002) ออกแบบอุปกรณ์การสอนเรื่องอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นให้ความรู้เป็นรูปภาพของอาหารที่มีสีสันสวยงามขนาดใหญ่วางตรงกับเนื้อหาที่ต้องการสอน อุปกรณ์นี้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังและประชากรที่อยู่ในชนบทห่างไกลมีฐานะยากจน มีความบกพร่องด้านการมองเห็น การได้ยิน ไม่สามารถอ่านเขียนได้ และการศึกษาของคริสสัน (Creson, 2001) ออกแบบอุปกรณ์การสอนเรื่องการจำกัดน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นให้ความรู้โดยบอกชนิดอาหารและปริมาณน้ำที่มีในอาหารแต่ละชนิด ซึ่งเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ป่วยและบุคลากรทีมสุขภาพ อีกทั้งการนำตัวอย่างของเครื่องปรุงรสที่จำกัดโซเดียม ตัวอย่างของอาหารที่จำกัดโซเดียม และตัวอย่างยาจริงมาใช้เป็นสื่อในการสอน เพื่ออธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้และเข้าใจให้เห็นว่าเกลือโซเดียมที่มีอยู่ในอาหารชนิดนั้นๆ ในรูปแบบต่างๆกัน และได้เห็นยาจริงชนิดต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้รับเพื่อรักษา ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจดจำได้แม่นยำมากขึ้น

การให้หนังสือคู่มือหรือเอกสารความรู้แก่ผู้ป่วยจะช่วยให้การดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยสามารถนำมาศึกษาเมื่อเกิดปัญหาและเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนความจำได้ (เบญจมาศ วงศ์ฉัตร, 2547) และการให้สมุดบันทึกประจำวัน (diary) แก่ผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังเรื่องน้ำหนักและอาการที่ผิดปกติ ช่วยให้ผู้ป่วยมีความตระหนักในการดูแลตนเองและใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพได้ (Eastwood, Travia, Morgenstern, & Donaho, 2007) นอกจากนี้การให้ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย จะต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งในขณะที่ผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ที่คลินิกผู้ป่วยนอก และที่บ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้และความมั่นใจในการดูแลตนเองขณะอยู่ที่บ้าน ส่งผลให้สามารถควบคุมอาการได้อย่างคงที่ ลดระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวลง (วรินทร์ เวียงโสด, 2547) มีภาวะสุขภาพที่ดี และระยะเวลาในการอยู่ที่บ้านนานขึ้น และลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้

2. การดูแลต่อเนื่อง (continuing care) เป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยทั้งขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับมีการดูแลภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่เน้นการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทั้งการดูแลต่อเนื่องที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและการดูแลที่บ้าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและพบจำนวนมากถึง 24 เรื่อง วัตถุประสงค์ของการดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยติดตามดูแล สนับสนุน กระตุ้นเตือนผู้ป่วยให้ปฏิบัติตัวตามแผนการ

รักษาด้วยการรับประทานยา การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย สื่อสารให้ข้อมูลความรู้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าได้รับการรักษาตามมาตรฐาน และได้รับการปรับขนาดยาจนได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเอง การดูแลต่อเนื่องมีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งควรนำมาปรับใช้ตามสถานการณ์ รูปแบบที่ใช้มากมีดังนี้

การดูแลต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบ้าน เป็นวิธีที่ใช้กันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจากการศึกษาพบว่าสามารถลดการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลได้ วิธีการเยี่ยมบ้าน พบว่า มีข้อดีคือช่วยให้ผู้เยี่ยมได้พบกับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว เห็นสภาพผู้ป่วย ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง ทำให้สามารถให้การดูแลรักษาพยาบาลได้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย ผู้เยี่ยมสามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยและให้การปรึกษาพยาบาลได้ อีกทั้งช่วยประเมินการรับประทานยาของผู้ป่วยโดยการตรวจนับเม็ดยา ประเมินแหล่งสนับสนุนทางสังคม และสามารถค้นหาอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวที่แย่งได้ทันทั่วทั้ง (Blue et al., 2001; Inglis et al., 2006; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002) ส่วนข้อจำกัด คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ที่อยู่ที่เหมาะสมได้ (Stewart & Horowitz, 2002) ผู้เยี่ยมอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง และการเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งต้องใช้เวลาาน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ ฟิลลิปส์และคณะ (Phillips et al., 2004) พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมบ้านมีตั้งแต่ 1-3.5 ชั่วโมง ค่ามัธยฐาน คือ 2 ชั่วโมง และการศึกษาของฮอลแลนด์และคณะ (Holland et al., 2007) ใช้เวลาการเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งเฉลี่ย 50-72 นาที นอกจากนี้การเยี่ยมบ้านยังมีข้อควรคำนึงถึงที่สำคัญ คือ กลุ่มผู้ป่วยที่บ้านอยู่ไกลนอกเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลที่ไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านได้ ผู้ป่วยควรได้รับการส่งต่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือพยาบาลในชุมชน เป็นผู้ติดตามเยี่ยมบ้านแทน ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยการส่งหนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย และความต้องการการดูแลตนเองของผู้ป่วย ไปยังหน่วยงานที่จะรับช่วงดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน หรือการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานก่อนส่งเอกสารจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดูแลต่อเนื่องโดยใช้โทรศัพท์ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน และจากการศึกษาพบว่าสามารถลดการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลได้ วิธีการใช้โทรศัพท์ พบว่า มีข้อดีคือทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยที่รวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา (นิภาพร ประจันบาน, 2550) ซึ่งส่งผลให้สามารถแก้ไขป้องกันปัญหาของผู้ป่วยได้ทันทั่วทั้ง อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย (Jerant et al., 2001; Riegel et al., 2002) มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และแต่ละครั้งจะใช้เวลาการเยี่ยมไม่นาน ซึ่งจากการการศึกษาของ จันทรจิรา เกียรติสิสกุล (2551) และ นิภาพร ประจันบาน (2550) ใช้ระยะเวลาการโทรศัพท์เยี่ยมครั้งละ 10-15 นาที นอกจากนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกมีกำลังใจ มีคุณค่าในตัวเอง และมีการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนข้อจำกัด คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีโทรศัพท์หรือไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ ผู้เยี่ยมไม่ได้พบกับผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัวโดยตรง ทำให้ไม่สามารถเห็นสภาพผู้ป่วย ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง (Jerant et al., 2001)

การดูแลต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ระบบวิดีโอสื่อสาร แฟกซ์ และอีเมลล์ เป็นระบบการดูแลที่บ้านที่มีความทันสมัย และจากผลการศึกษาพบว่าสามารถลดการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ การใช้ระบบวิดีโอสื่อสาร (video-conference) มีข้อดี คือ สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงของผู้สนทนา ทำให้เห็นสภาพของผู้ป่วยที่เป็นจริง สามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วย การรายงานข้อมูลน้ำหนักและความดันโลหิตประจำวัน และรายงานผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ การติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์ ช่วยในการส่งไฟล์เตอร์ข้อมูลความรู้ ภาพวิดีโอ และกราฟแสดงน้ำหนักของผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วย หรือส่งข้อมูลอาการที่ผิดปกติโดยการส่งโทรสาร (fax) ให้กับพยาบาล แต่ทั้งนี้ การใช้ระบบวิดีโอสื่อสาร (video-conference) แฟกซ์ และอีเมลล์ ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีความซับซ้อนในการนำเครื่องมือไปใช้ติดต่อสื่อสาร และการเรียนรู้การใช้เครื่องมือ รวมทั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังต้องมีการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ จึงเป็นไปได้ยากที่จะนำมาใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกล ผู้ที่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ และผู้ที่มีฐานะยากจน (Jerant et al., 2001; Woodend et al., 2008) และการนำมาใช้ควรมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆด้วย ส่วนการส่งข้อความโดยใช้เพจเจอร์เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ป่วยในการรักษา ด้วยการรับประทานยาช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ถูกต้องและต่อเนื่อง เป็นวิธีที่สามารถนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยบางกลุ่มได้ตามความเหมาะสม แต่การส่งข้อความโดยใช้เพจเจอร์ก็มีข้อจำกัด คือ เป็นการสื่อสารผ่านคนกลางข้อความที่ส่งอาจผิดพลาดได้ หรือเมื่อผู้ป่วยไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณบริการจะทำให้ไม่ได้รับข้อความ อีกทั้งปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การส่งข้อความโดยใช้เพจเจอร์จึงไม่นิยมนำมาใช้อีก

การดูแลต่อเนื่องที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นการนัดผู้ป่วยมาตรวจตามนัดที่คลินิก และปัจจุบันพบว่า การดำเนินการจัดทำคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure clinic) เป็นแนวคิดของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ครอบคลุมอีกวิธีการหนึ่ง (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549) ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลแบบครอบคลุมโดยบุคลากรทีมสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค และใช้พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) หรือพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (nurse case manager) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลในคลินิก โดยมีบทบาทในการประเมินผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุมทั้งอาการทางคลินิก ความรู้ และภาวะทางคลินิก วางแผนการจำหน่าย จัดระบบการส่งต่อ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในทีมสุขภาพ การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่

ผู้ป่วยและญาติเป็นรายบุคคล และติดตามให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และมีหลายการศึกษาที่พบว่าระบบการดูแลต่อเนื่องที่คลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวประสบความสำเร็จในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Creson, 2001) และสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002)

จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยใช้ทั้งวิธีการเยี่ยมบ้านร่วมกับการใช้โทรศัพท์และเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นวิธีการที่ให้การดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมทั้งช่วยให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง สามารถให้การดูแลรักษาพยาบาลได้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วยแล้ว บุคลากรทีมสุขภาพผู้ดูแลและผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ป่วยมีการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ส่วนการติดตามผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ร่วมกับการเยี่ยมบ้านและการใช้โทรศัพท์ มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถลดการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ และจำนวนครั้งของการเยี่ยมบ้าน การใช้โทรศัพท์ หรือการนัดผู้ป่วยมาตรวจที่คลินิก จากการศึกษานี้ พบว่าจำนวนครั้งของการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ่อยครั้งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลง (Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Rich et al., 1995) แต่ก็มีข้อที่ควรคำนึงถึง คือ จำนวนครั้งของการติดตามดูแลผู้ป่วยยิ่งบ่อยครั้งมากอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถูกรบกวนและไม่เป็นอิสระ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง มีการจัดการหรือดูแลตนเองได้เหมาะสมกับภาวะของโรค ควรพิจารณาลดความถี่ของการติดตามเยี่ยมลง

นอกจากนี้ยังพบว่าในแต่ละการศึกษาใช้ระยะเวลาในการติดตามดูแลผู้ป่วยมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่น้อยที่สุด คือ 1 เดือน และนานที่สุดถึง 10 ปี การศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ 6 เดือน และ 1 ปี และพบว่าการเพิ่มระยะเวลาติดตามดูแลผู้ป่วยนานขึ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ (Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, & Horowitz, 2002) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการใช้ระยะเวลาติดตามดูแลผู้ป่วยนานขึ้นมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นแต่ก็มีข้อจำกัดด้านภาระงาน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

3. การดูแลโดยทีมสุขภาพ (healthcare team approach intervention) เป็นการร่วมมือกันของบุคลากรในทีมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุม โดยใช้แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพิเศษ แพทย์ผู้ดูแล พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลชุมชน เกสเซอร์ โภชนากร นักกายภาพบำบัดหรือหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานดูแลที่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ และจิตแพทย์ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล โดยใช้ทีมสุขภาพร่วมกันดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจะช่วยให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพดีขึ้น ลดผลแทรกซ้อน ลดระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวและสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Inglis et al., 2006; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart et al., 1999) มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ การดูแลด้วยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเพียงวิชาชีพเดียว (Holland et al., 2007; Koshman et al., 2008)

ในแต่ละวิชาชีพจะมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ซึ่งจากงานวิจัยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าพยาบาลจะมีบทบาทสำคัญและรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการดูแลผู้ป่วย คือ การประเมินผู้ป่วยและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ระบุหัวข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อวางแผนให้การดูแล ปฏิบัติการดูแล ให้ความรู้อย่างครอบคลุมเพื่อเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวสำหรับจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เป็นสื่อกลางติดต่อประสานงานการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสุขภาพอื่นที่เข้าร่วมดูแลผู้ป่วย ได้แก่ เกสเซอร์ โภชนากร นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และจิตแพทย์ ดูแลให้ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามความเหมาะสม (วรินทร์ เวียงโสด, 2547) ร่วมสร้างแนวปฏิบัติในการดูแลรักษา (Kim & Soeken, 2005) รวมทั้งติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการจำหน่าย (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Kim & Soeken, 2005) นอกจากการให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยตรงแล้ว พยาบาลยังมีบทบาทในการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย พยาบาลมีบทบาทประสานการบำบัด โดยเฉพาะบทบาทในการบริหารยาและติดตามผลของยาที่เกิดขึ้น (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550) สอดคล้องกับการศึกษาของครันท์ และคณะ (Krantz et al., 2008) พบว่าการใช้พยาบาลผู้จัดการรายกรณีในผู้ป่วยที่เริ่มต้นการรักษาด้วยยา β -blocker ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่ายเพื่อปรับขนาดยาให้ผู้ป่วยได้รับยาตามขนาดเป้าหมายและรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ และการที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับการดูแลจากพยาบาลในคลินิกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้ อีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับการรักษาที่รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น (วรินทร์ เวียงโสด, 2547)

มีการศึกษาถึงโปรแกรมการจัดการดูแลผู้ป่วยโดยพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) ซึ่งมีบทบาทการทำงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คือ ประเมินผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุมทั้งอาการทางคลินิก ความรู้ และภาวะทางคลินิก วางแผนการจำหน่าย จัดระบบการส่งต่อ ติดตามประสานงานกับทีมผู้ดูแล การให้ความรู้และให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และหลังผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะติดตามให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทางโทรศัพท์ เพื่อให้ความรู้ ช่วยเหลือและกระตุ้นเตือน ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002) จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่าการใช้บทบาทของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาล คลินิกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure nurse) พยาบาลชำนาญการเฉพาะโรคหัวใจ (cardiac nurse) และพยาบาลที่ได้รับการฝึกเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (nurse manager) และพบว่าช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกัน (Bryant, 2002; Blue et al., 2001; Creson, 2001; Fonarow et al., 1997; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Riegel et al., 2002)

แพทย์มีหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ป่วย ค้นหาสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและให้การรักษาตามแนวทางการรักษา (Rich et al., 1993; ระดับ B: วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Fonarow et al., 1997) คัดกรองการรักษาที่ไม่จำเป็นซึ่งช่วยให้การรักษามีระเบียบแบบแผนมากขึ้น (Fonarow et al., 1997; Rich et al., 1993) การดูแลรักษาของแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล คือ ด้านการรักษา ซึ่งมีการศึกษาพบว่า การให้การรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยการรักษาดูยา ACEI ตามขนาดเป้าหมาย (target dose) สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ (Luthi et al., 2003) และการที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ทำให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม (วรินทร์ เวียงโสด, 2547) สอดคล้องกับการศึกษาของ Jong et al., 2007) ศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกของการดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) เปรียบเทียบกับแพทย์สาขาอื่นๆ พบว่า การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายใน 1 ปี ในกลุ่ม

ที่ได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ (cardiologist) น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ประจำบ้านและแพทย์สาขาอื่น ($p \leq .001$ และ $p \leq .001$ ตามลำดับ)

เกสซ์กร มีบทบาทเป็นให้ความรู้ การจัดการเรื่องยา เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ในการใช้ยารักษาผู้ป่วย ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยา ชี้แนะแนวทางสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน หาวิธีช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ใช้ยารักษาอย่างสม่ำเสมอ และมีการศึกษาถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากเกสซ์กรโดยตรง พบว่าไม่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ (Holland et al., 2007) สอดคล้องกับศึกษาของคอสแมน และคณะ (Koshman et al., 2008) เป็นการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเกสซ์กร พบว่า การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยทีมที่มีเกสซ์กรเข้าร่วมทีมดูแลมีประสิทธิภาพมากกว่าการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากเกสซ์กรอย่างเดียว

นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการศึกษาที่กล่าวถึงบุคลากรทีมสุขภาพ คือ โภชนากร นักกายภาพบำบัดหรือหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ (respiratory therapists) และจิตแพทย์ เข้าร่วมทีมดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและมีบทบาทสำคัญในทีมที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลครอบคลุมมากขึ้นและสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ แต่จากการศึกษาครั้งนี้ยังไม่พบการศึกษาที่กล่าวถึงประสิทธิภาพในการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับการดูแลจากโภชนากร นักกายภาพบำบัดหรือหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ (respiratory therapists) และจิตแพทย์ โดยตรง

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีการศึกษาจำนวนมากถึง 23 เรื่อง ที่ใช้ทั้ง 3 องค์ประกอบรวมกัน ได้แก่ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลโดยทีมสุขภาพ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพในการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์อภิมานของกอดเร-สรีดเดอร์ และคณะ (Gwadry-Sridher et al., 2004) พบว่า โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($RR = 0.79$, 95% $CI = 0.68-0.91$, $p < .001$) และการวิเคราะห์อภิมานของฟิลลิปส์และคณะ (Phillips et al., 2004) พบว่า การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยแบบครอบคลุมโดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการสนับสนุนดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลังการจำหน่าย สามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($RR = 0.75$, 95% $CI = 0.64-0.88$)

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ใช้เพียง 1 หรือ 2 องค์ประกอบ เช่น การศึกษาของไวค และคณะ (Kwok et al., 2008) ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับจากพยาบาลชุมชน (community nurse) เพียงวิชาชีพเดียว โดยผู้ป่วยจะได้รับการเยี่ยมจากพยาบาลชุมชน ก่อนจำหน่าย และดูแลต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบ้านหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า อัตราการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลุ่มที่ได้รับการดูแลเฉพาะจากพยาบาลชุมชนไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบปกติ การศึกษาของฮอลแลนด์ และคณะ (Holland et al., 2007) ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับจากเภสัชกรชุมชน (community pharmacists) เพียงวิชาชีพเดียว โดยการเยี่ยมบ้านและให้ความรู้หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ไม่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ อีกทั้งการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มทดลองยังมากกว่ากลุ่มควบคุมอีกด้วย ส่วนการศึกษาของวูดเด็น และคณะ (Woodend et al., 2008) ศึกษาผลของโปรแกรม Telehome monitoring ติดตามดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยใช้ระบบ video conference ผลการศึกษาพบว่า ไม่สามารถลดจำนวนการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์อภิมานของคิม และโซเคิน (Kim & Soeken, 2005) ที่กล่าวว่า การใช้ระบบการจัดการรายกรณีเฉพาะในโรงพยาบาล (hospital base) อย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้

จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้ทุกองค์ประกอบร่วมกันเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวมีความซับซ้อนในการจัดการ และการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสู่การพัฒนาสร้างแนวทางปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งงานวิจัยบางเรื่องอาจยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับบางองค์กรของประเทศไทยได้โดยตรง ดังนั้น ควรนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือบริบทของแต่ละองค์กร หรือควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งตัวผู้ป่วยและองค์กร

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญของโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก และพบได้มากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นภาวะโรคเรื้อรังที่พบได้ในระยะสุดท้ายของทุกโรค รวมทั้งมีโรคร่วมหลายโรค และพบบ่อยในผู้สูงอายุ จึงทำให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อต้องกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จะเกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความวิตกกังวล กลัว มีความรู้สึกสูญเสียพลังอำนาจ และควมมีคุณค่าในตนเองลดลง ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อองค์กร เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลรักษาที่สำคัญประการหนึ่ง

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทบทวนหลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีค่อนข้างมากในต่างประเทศ ทั้งด้านการป้องกันและการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีหลากหลายวิธี บางส่วนสามารถนำมาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่กลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง

วิธีดำเนินการศึกษา โดยการสืบค้นหลักฐานงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทางการพยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ จากเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศจากสถาบันต่างๆ และการสืบค้นด้วยมือ จากวิธีดำเนินการศึกษาสามารถรวบรวมหลักฐานงานวิจัยตั้งแต่ปี 2534-2551 จำนวน 38 เรื่อง นำมาประเมินคุณภาพ วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยของราชวิทยาลัย

อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ Evidence-Based Medicine & Clinical Practice Guidelines ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2544) ได้หลักฐานทางวิชาการระดับ A จำนวน 23 เรื่อง ในจำนวนนี้มีอยู่ 6 เรื่อง ที่ผลการศึกษามีนัยสำคัญทางสถิติ และเป็นการศึกษาวิเคราะห์ห่อภิมาณจำนวน 4 เรื่อง ระดับ B จำนวน 13 เรื่อง และระดับ C จำนวน 2 เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมดจำนวน 38 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลที่ใช้ได้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 98 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่มากกว่า 70 ปี ถึง 24 เรื่อง มีงานวิจัยจำนวน 22 เรื่อง ศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ (ระดับ A: Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; ระดับ B: Bryant, 2002; Hoskins et al., 2001; ระดับ C: Proctor et al., 2000) กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับของภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง คือ ระดับ III-IV (ระดับ A: Jaarsma et al., 2008; ระดับ B: Fonarow et al., 1997) กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (Ejection Fraction: EF) น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 (Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krumholz et al., 2002; Romualdo et al., 1999; ระดับ B: Boonyapiphat, 2007; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998) และกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง (ระดับ A: Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002; ระดับ B: Boonyapiphat, 2007)

2. การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากการศึกษางานวิจัยจำนวน 38 เรื่องในครั้งนี้ พบว่ารูปแบบของการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง 2) การดูแลต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การดูแลต่อเนื่องทั้งขณะเข้ารับการรักษในโรงพยาบาลร่วมกับการดูแลภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล การดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล และ 3) การดูแลโดยทีมสุขภาพ ประกอบด้วย พยาบาล แพทย์ เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบำบัดหรือหน่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ หน่วยงานการดูแลที่บ้าน นักสังคมสงเคราะห์ และวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น

ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวิธีการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยการป้องกันและลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกลับเข้ามารักษซ้ำในโรงพยาบาล ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ปัจจัย

ด้านตัวผู้ป่วยเอง เช่น ขาดความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง การไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการปฏิบัติตามการรักษาและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยที่อยู่ในความควบคุมของโรงพยาบาลอันเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการบริการ เช่น การดูแลรักษาขณะอยู่โรงพยาบาลไม่มีคุณภาพ ขาดการประเมินความพร้อมเรื่องการจัดหายา มีการวางแผนจำหน่ายที่ไม่สมบูรณ์ โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายไม่มีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวเรื่องการติดต่อสื่อสารการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลหลัก ขาดการติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย ขาดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระหว่างสาขาวิชาชีพ เป็นต้น และเมื่อทราบถึงปัจจัยหรือสาเหตุ จึงหาแนวทางในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหา

การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล เป็นการสนับสนุนให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองและฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล มีเป้าหมายสำคัญ คือการสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเองเพื่อให้เกิดแรงจูงใจระยะยาวโดยไม่ล้มเลิกความพยายามในการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ปฏิบัติได้คืออยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนช่วยให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและญาติผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้ และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรทีมสุขภาพ จะยิ่งทำให้มีความมั่นใจในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการดูแลตนเองที่เหมาะสม สามารถควบคุมความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งส่งผลให้การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลง

การดูแลต่อเนื่องเป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยทั้งขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับมีการดูแลภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล เช่น การดูแลรักษาขณะอยู่โรงพยาบาลไม่มีคุณภาพ ขาดการติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย และการไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการปฏิบัติตามการรักษาและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยการติดตามดูแล สนับสนุนเป็นที่ปรึกษาการดูแลตนเอง ติดตามว่าผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตามแผนการรักษาด้วยการรับประทานยา การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ได้หรือไม่ สื่อสารให้ข้อมูลความรู้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทั้งขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

การดูแลโดยทีมสุขภาพ เป็นการร่วมมือกันของบุคลากรในทีมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล โดยใช้บุคลากรในทีมสุขภาพร่วมกันดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว สามารถลดปัจจัย

หรือสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ช่วยให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพดีขึ้น ลดผลแทรกซ้อน ลดระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งส่งผลให้ลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้

จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีการดำเนินการเป็นโปรแกรมการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งจะใช้ทั้ง 3 องค์ประกอบ ร่วมกัน คือ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลโดยทีมสุขภาพ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลอย่างมีแบบแผน การดูแลต่อเนื่องโดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ร่วมกับการติดตามให้การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยบุคลากรทีมสุขภาพ สามารถลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำผลการศึกษาไปใช้

จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทำให้ได้องค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันและจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว อีกทั้งยังเห็นได้ว่าการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เริ่มตั้งแต่เมื่อรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล ร่วมกับการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ดังนั้นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวไปใช้ควรเป็นลักษณะของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเอง รวมถึงการพิจารณาสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความรู้ที่เหมาะสม การดูแลต่อเนื่องทั้งขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยใช้วิธีตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ป่วย และการดูแลโดยทีมสุขภาพ เป็นการร่วมมือกันของบุคลากรในทีมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุม นอกจากนี้การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายด้วย และพบว่าการเพิ่มระยะเวลาติดตามดูแลผู้ป่วยนานขึ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ และจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในคลินิกโดยแพทย์ พยาบาลหรือวิชาชีพอื่น เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและพัฒนาเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติทางการพยาบาล

การกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดได้จากหลายปัจจัย ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้มีการกลับเข้รักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีหลายปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเอง เช่น การไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการรับประทานยา การไม่ไปพบแพทย์ตามนัด และขาดการมาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ 2) ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพและการรักษา เช่น การไม่ส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจระหว่างเข้รับการรักษา การต้องใช้ยารักษาหลายชนิด การขาดประสิทธิภาพในระบบการจำหน่ายผู้ป่วยและการส่งต่อ รวมถึง 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว เช่น ขาดการยอมรับและเห็นคุณค่า อีกทั้งในแต่ละการศึกษาังมีความแตกต่างกันในด้านของเนื้อหา วิธีการจัดการ และระยะเวลาของการติดตามผู้ป่วย การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ควรพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร นอกจากนี้ความรู้ที่ได้จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจว่า การจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้เป็นผลสำเร็จ ควรมีการดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดย 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล 2) มีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่ผู้ป่วยเข้รับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับการติดตามให้การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และ 3) จัดทีมดูแลผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทีมสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. การนำผลขององค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้ มาสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อความถูกต้อง เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น และทดสอบความเป็นไปได้ของแนวทางปฏิบัติโดยศึกษานำร่องก่อนนำไปปฏิบัติจริง

2. ควรมีการพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการกลับเข้มารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

จุดเด่นของงานวิจัยที่บทพจนในครั้งนี้

1. หลักฐานงานวิจัยทั้งหมดศึกษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนใหญ่เป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล และเป็นงานวิจัยระดับ A จำนวนมาก ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
2. หลักฐานงานวิจัยที่ได้ทั้งหมดเป็นงานวิจัยฉบับเต็ม (full text)
3. หลักฐานงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ร่วมกับการดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่องภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลช่วยให้เกิดภาพรวมในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของการศึกษา

ผู้วิจัยในงานวิจัยแต่ละเรื่องให้คำจำกัดความของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล โดยกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกัน และการศึกษาครั้งนี้เลือกงานวิจัยฉบับเต็ม (full text) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว อาจมีงานวิจัยบางส่วนที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์จึงไม่สามารถนำมาได้ อีกทั้งมีงานวิจัยที่ศึกษาต่อเนื่องกันถึง 4 เรื่อง

การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลว

A LITERATURE REVIEW RELATED TO THE MANAGEMENT FOR REDUCING
READMISSION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

รพีพันธุ์ สุ่มหิรัญ 5036189 RAAN/M

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : สุปริดา มั่นคง, Ph.D. (GERONTOLOGICAL NURSING),
กุสุมา คุ้มวัฒนสัมฤทธิ์, Ph.D. (NURSING)

บทสรุปแบบสมบูรณ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure: CHF) เป็นโรคหัวใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 2005 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว 1,084,000 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่ในผู้ที่มิใช่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี ถึง 660,000 คน (American Heart Association, 2008) ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทั้งการมาที่ห้องฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล (Stull, Starling, Haas, & Young, 1999) การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้งผู้ป่วยจะอยู่โรงพยาบาลนาน 7-10 วัน ซึ่งค่ารักษาแต่ละครั้งมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ (Stull et al., 1999) การประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งทางตรงและทางอ้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 พบว่าเป็นจำนวนเงินสูงถึง 34.8 พันล้านดอลลาร์ต่อปี (American Heart Association, 2008) นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเฉลี่ยคนละ 2.5 ครั้ง (Chin & Goldman, 1997) สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวในประเทศไทยไม่มีใครทราบถึงอุบัติการณ์หรือการระบาดในคนไทย (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549) แต่ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับเข้า

พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ ในปี พ.ศ. 2547, 2548, และ 2549 มีอัตรา 503.1, 530.7, และ 618.5 ตามลำดับ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2550)

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีการดำเนินโรคที่ไม่แน่นอนว่าจะดีขึ้น คงที่ หรือเลวลง และเนื่องจากพยาธิสภาพที่รุนแรงและเรื้อรังทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการอ่อนล้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งพบว่ามีเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านอาการและอาการแสดงของโรค คือ อาการเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ภาวะปอดบวม น้ำ แขนขาบวม อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ความทนต่อการทำกิจกรรมลดลง (Hunt et al., 2001) ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากอาการกำเริบ ต้องกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ซึ่งการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจตลอดจนครอบครัวและประเทศชาติ (เขวภา บุญเที่ยง, 2545) ถึงแม้ในระยะ 30 ปี ที่ผ่านมามีการพัฒนาความรู้และการรักษาใหม่ๆ ที่ทำให้การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวได้ผลดีขึ้นอย่างมาก อาการของผู้ป่วยดีขึ้น และอัตราการตายลดลง แต่ในช่วงที่ผ่านมาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการปานกลางและรุนแรง คือ มีความรุนแรงระดับ 3 และความรุนแรงระดับ 4 (functional class III-IV) ยังมีอัตราการตายเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 15 ในแต่ละปี และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำถึงร้อยละ 10 ในระยะเวลา 1 เดือน (เกียรติชัย ภูริปัญญา และสุนทรมน โชตินัยวัตรกุล, 2549) โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป (อุฟาร วงศ์เกล้า และสุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล, 2542; Dykes et al., 2005; Madigan, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเขวภา บุญเที่ยง, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, และอักรอนงค์ ปราโมช (2546) ที่พบว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ และมีความสัมพันธ์กับอัตราการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลซ้ำที่สูงที่สุด คือ อยู่ในช่วง 2-30 ครั้ง

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้มีการกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีหลายประการ ทั้งทางด้านระบบบริการสุขภาพและการรักษา เช่น การไม่ส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจระหว่างเข้ารับการรักษา การต้องใช้ยารักษาหลายชนิด การขาดประสิทธิภาพในระบบการจำหน่ายผู้ป่วยและการส่งต่อ (Hamner & Ellison, 2005) ด้านการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว เช่น ขาดการยอมรับและเห็นคุณค่า รวมถึงด้านตัวผู้ป่วยเอง เช่น การไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการรับประทานยา การไม่ไปพบแพทย์ตามนัด และขาดการมาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ (ขจร เพ็ญพรรณ, 2545; Vinson, Rich, Sperry, Shan, & McNara, 1990) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเขวภา บุญเที่ยง และคณะ (2546) ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 90 ราย พบว่า

การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ทางลบกับการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาล นอกจากการให้ยารักษาแล้วควรมีการดำเนินการจัดทำคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure clinic) (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ แนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เข้าใจเรื่องการจำกัดปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารชนิดต่างๆ การชั่งน้ำหนักตัวอย่างสม่ำเสมอ การประเมินภาวะน้ำเกินในร่างกาย รวมถึงการปรับขนาดยาขับปัสสาวะด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ การสนับสนุนจากสังคมและครอบครัวในการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งชีวิตและป้องกันการกำเริบซ้ำของโรค ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ลดอัตราการตาย ลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาล ลดปัญหาเรื่องการครองเตียงในโรงพยาบาล ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าคุ้มทุนในการรักษาพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ลดอัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (ปิยะมิตร ศรีธรา ก., 2549; รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์, 2546; Harrington, 2008; Hunt et al., 2005; Varugbesse, 2007)

การลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและบ่งชี้ถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงคุณภาพการดูแลของโรงพยาบาล (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549) ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลของสำนักงานพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2547) กล่าวว่า การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล หมายถึง การประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาพรวม ได้แก่ การประเมินปัญหาการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล รวมทั้งการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ซึ่งการดูแลผู้ป่วยในควรมีความสมบูรณ์ในลักษณะองค์รวม การที่ผู้ป่วยต้องกลับมารักษาเป็นผู้ป่วยในอีกโดยไม่ได้นัดไว้ก่อนสะท้อนถึงความสำเร็จของการดูแลรักษาในครั้งก่อน หรือการไม่ร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย ซึ่งบางปัจจัยอยู่ในความควบคุมของโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากคุณภาพการบริการ และบางปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้ (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549)

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการดูแลผู้ป่วยควรมีแนวปฏิบัติที่มีหลักฐาน (evidence-base practice) และมีงานวิจัยที่มีคุณภาพมาอ้างอิง ดังนั้นพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพจึงต้องมีความสามารถในการใช้ผลงานวิจัยที่มีความเจาะจงกับกลุ่มผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องเพื่อลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซ้ำ อันจะนำมาสู่การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ถึงแม้ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำใน

โรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว รวมทั้งศึกษาวิจัยถึงวิธีการต่างๆ เพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อป้องกันการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทำการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ทำให้การดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพของตนเองและสามารถอยู่กับโรคหัวใจได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และนำไปใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ขอบเขตของการทบทวนองค์ความรู้

การทบทวนองค์ความรู้ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเลือกงานวิจัยที่ศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 1990-2008

นิยามศัพท์

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) หมายถึง กลุ่มอาการทางคลินิกที่ซับซ้อน เกิดจากหัวใจที่มีความผิดปกติทั้งโครงสร้างและการทำหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถสูบฉีดโลหิตให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกาย เมื่ออวัยวะต่างๆ ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ มีผลต่อเนื่องให้เกิดการคั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย ทั้งในปอดและ

ระบบไหลเวียนโลหิต อาการและอาการแสดงของโรค คือ อาการเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ภาวะปอดบวม น้ำ แขนขาบวม อ่อนเพลีย เมื่อล้ม ความทนต่อการทำกิจกรรมลดลง

การกลับเข้มารักษำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง การที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวกลับเข้มาได้รับการรักษำทั้งการมารับการรักษำที่แผนกฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบซ้ำของภาวะหัวใจล้มเหลว หลังจำหนำยออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ได้นัดหมาย

การจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึง การปฏิบัติการที่นำมาใช้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อลดการกลับเข้มารักษำในโรงพยาบาล

วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษำครั้งนี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการเพื่อลดการกลับเข้มารักษำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การสืบค้นแหล่งข้อมูล เป็นการสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ OVID, CINAHL, Pubmed, ScienceDirect, Cochrane จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทางการพยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ <http://library.ra.mahidol.ac.th>, www.thaiheart.org, www.AHCPR.org (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น www.AHRQ.gov), www.americanheart.org. โดยกำหนดปีที่ใช้ในการสืบค้นตั้งแต่ ค.ศ. 1990-2008 และคำสำคัญ (key word) ที่ใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง การกลับเข้มารักษำในโรงพยาบาล การจัดการและการกลับเข้มารักษำในโรงพยาบาล congestive heart failure, congestive heart failure and readmission, congestive heart failure and rehospitalization, congestive heart failure and unplanned readmission, prevention and readmission and congestive heart failure, Guideline and management and congestive heart failure, readmission and management and congestive heart failure, Guideline and congestive heart failure, Management and congestive heart failure, Readmission in heart failure และการสืบค้นด้วยมือ (manual search) จากตำรา วิทยานิพนธ์ วารสารทางการพยาบาล วารสารทางการแพทย์ วารสารสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล และสืบค้นจากเอกสารอ้างอิง

(reference) ของหลักฐานทางวิชาการ ใช้ระยะเวลาการสืบค้นข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

2. **เกณฑ์ในการการคัดเลือกข้อมูลที่จะนำมาศึกษา** เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากอาการที่กำเริบซ้ำด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว และการจัดการหรือการป้องกันเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เกณฑ์การคัดออกคืองานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี

3. **การประเมินคุณภาพและวิเคราะห์หลักฐานทางวิชาการ** เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ทางคลินิก

การประเมินคุณภาพในด้านระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (คณะอนุกรรมการ Evidence-Based Medicine & Clinical Practice Guidelines ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2544) ซึ่งมีการแบ่งระดับหลักฐานทางวิชาการไว้ 4 ระดับ ดังนี้

Level A: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากการรวบรวมงานวิจัยมาวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-analysis) ของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (randomized controlled trials, RCT) หรืองานวิจัยเดี่ยวที่เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (randomized controlled trials, RCT)

Level B: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากการรวบรวมงานวิจัยมาวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-analysis) ของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (randomized controlled trials, RCT) อย่างน้อย 1 เรื่อง หรืองานวิจัยเดี่ยวที่มีการออกแบบรัดกุม แต่เป็นงานกึ่งทดลองหรืองานวิจัยเชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม

Level C: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่เป็นงานเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์หรือเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายอื่นๆ

Level D: หมายถึง หลักฐานที่ได้จากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ ตำราและเอกสารทางวิชาการต่างๆ

การวิเคราะห์หลักฐานทางวิชาการในด้านความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ทางคลินิกพิจารณาตามเกณฑ์ของโพลิตและคณะ (Polit, Beck, & Hungler, 2001) มีหลักการดังนี้

1. ผลงานวิจัยที่นำมาศึกษาตรงกับประเด็นของปัญหาที่กำลังศึกษาอยู่ (clinical relevance)
2. ผลงานวิจัยมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ (scientific-merit) โดยพิจารณาจากการออกแบบงานวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการวัดตัวแปร การใช้สถิติในการวิเคราะห์ ความตรงภายใน ความตรงภายนอก รวมทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของระเบียบวิธีวิจัย

3. แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานไปใช้ในการปฏิบัติ (implementation potential) ประกอบด้วย

3.1 ผลงานที่จะนำไปใช้มีความเหมาะสม (transferability of findings) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน่วยงาน กลุ่มผู้ป่วยและปรัชญาการดูแลของเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ

3.2 มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ (feasibility of implementation) โดยคำนึงถึงพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้โดยมีเอกสิทธิ์ ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

3.3 มีความคุ้มค่า (cost-benefit ratio) ผลงานวิจัยที่จะนำไปใช้นั้นเกิดประโยชน์มากเพียงพอ คุ้มกับค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการปฏิบัติในรูปแบบเดิม

ผลการศึกษา

องค์ความรู้ครั้งนี้ได้จากหลักฐานงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A จำนวน 23 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Gwadry-Sridher et al., 2004; Holland et al., 2007; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Jerant et al., 2001; Karntz et al., 2008; Kim & Soeken, 2005; Koelling et al., 2005; Koshman et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart & Horowitz, 2002; Riegel et al., 2002; Romualdo et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1998; Woodend et al., 2008) ระดับ B จำนวน 13 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Jong et al., 2007; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998) และระดับ C จำนวน 2 เรื่อง (Martens, 2000; Proctor et al., 2000) ผู้ศึกษานำเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนี้

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 98 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่มากกว่า 70 ปี ถึง 24 เรื่อง และมีงานวิจัยที่ศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 8 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A 5 เรื่อง (Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) ระดับ B 2 เรื่อง (Bryant, 2002; Hoskins et al., 2001) และระดับ C 1 เรื่อง (Proctor et al., 2000) กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับของภาวะหัวใจล้มเหลवरุนแรง คือ ระดับ III-IV จำนวน 2 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A (Jaarsma et al., 2008) และระดับ

B (Fonarow et al., 1997) อย่างละ 1 เรื่อง กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (Ejection Fraction: EF) น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 จำนวน 11 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A 7 เรื่อง (Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krumholz et al., 2002; Romualdo et al., 1999) และระดับ B 4 เรื่อง (Boonyapiphat, 2007; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998) และกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับ A 3 เรื่อง (Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002) และระดับ B 1 เรื่อง (Boonyapiphat, 2007)

รูปแบบการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจ

ล้มเหลว

จากการศึกษางานวิจัยจำนวน 38 เรื่องในครั้งนี้ พบว่า รูปแบบของการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันหรือจัดการปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สามารถควบคุมได้ และมีหลายองค์ประกอบรวมกัน รูปแบบของการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง 2) การดูแลต่อเนื่อง และ 3) การดูแลโดยทีมสุขภาพ

1. การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง (self-care: supportive educational intervention) จากการศึกษางานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองจำนวน 18 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 8 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Holland et al., 2007; Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Romualdo et al., 1999) และระดับ B 10 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล เป็นการสนับสนุนให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองและฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล มีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเองเพื่อให้เกิดแรงจูงใจระยะยาวโดยไม่ล้มเลิกความพยายามในการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนช่วยให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและญาติผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้ และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก

บุคลากรทีมสุขภาพ จะยิ่งทำให้มีความมั่นใจในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการดูแลตนเองที่เหมาะสม สามารถควบคุมความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งส่งผลให้การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองจำนวน 18 เรื่อง พบว่า มีความครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ ภาวะหัวใจล้มเหลว การรับประทานอาหารและน้ำ การใช้ยา การดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย การเฝ้าระวังอาการที่ผิดปกติ และการจัดการกับอาการที่ผิดปกติ ส่วนองค์ประกอบของการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง พบว่า บุคลากรทีมสุขภาพที่ให้ความรู้เป็นพยาบาลมากที่สุดถึง 11 เรื่อง และพบว่าทั้งการให้ความรู้โดยพยาบาลหรือโดยพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพมีประสิทธิภาพช่วยลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ วิธีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นรายบุคคล หรือทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการให้ความรู้เช่นเดียว (ระดับ A: Blue et al., 2001; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; ระดับ B: Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002) ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ และการให้ความรู้ร่วมกับการฝึกทักษะการดูแลตนเอง (ระดับ A: Cline et al., 1998; ระดับ B: Boonyapiphat, 2007; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และมีทักษะการจัดการกับอาการที่ผิดปกติด้วยความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้เช่นกัน นอกจากนี้ในแต่ละการศึกษาผู้ให้ความรู้จะใช้อุปกรณ์และสื่อที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์การสอนช่วยสื่อในเนื้อหาที่เข้าใจยาก และเหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วย จะช่วยสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ (ระดับ B: Bryant, 2002) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่จะใช้สื่อการสอนมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป ซึ่งพบว่า ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการรับรู้เร็ว และสามารถดูแลตนเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ระดับ A: Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; ระดับ B: นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547)

2. การดูแลต่อเนื่อง (continuing care) จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีการดูแลต่อเนื่อง 3 รูปแบบ คือ 1) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับมีการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย พบการศึกษาจำนวน 18 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 10 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krantz et al.,

2008; Krumholz et al., 2002; Kwok et al., 2008; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999) และระดับ B 8 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) 2) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในโรงพยาบาล พบหลักฐานทางวิชาการระดับ B 1 เรื่อง (Luthi et al., 2003) กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยการปรับขนาดยา ACEI ให้ได้ตามขนาดเป้าหมายก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ และ 3) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล พบการศึกษาจำนวนมากถึง 24 เรื่อง มีการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และพบว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ได้แก่ การใช้โทรศัพท์จำนวน 6 เรื่อง แบ่งเป็น หลักฐานทางวิชาการระดับ A 2 เรื่อง (Koelling et al., 2005; Riegel et al., 2002) และระดับ B 4 เรื่อง (นิภาพร ประจันบาน, 2550; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997) การเยี่ยมบ้าน เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A ทั้งหมด 5 เรื่อง (Krantz et al., 2008; Holland et al., 2007; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002) การใช้ระบบวิดีโอสื่อสาร (video conference) เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A ทั้งหมด 2 เรื่อง (Jerant et al., 2001; Woodend et al., 2008) และ การใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ และเพจเจอร์ แบ่งเป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A (Gwadry-Sridher et al., 2004) และระดับ B (Shah et al., 1998) อย่างละ 1 เรื่อง การดูแลต่อเนื่องที่คลินิกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกเฉพาะผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น หลักฐานทางวิชาการระดับ A (Cline et al., 1998; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999) และระดับ B (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007) อย่างละ 2 เรื่อง และการเยี่ยมบ้านร่วมกับการใช้โทรศัพท์ เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A ทั้งหมด 5 เรื่อง (Blue et al., 2001; Inglis et al., 2006; Krumholz et al., 2002; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงสามารถนำมาปรับใช้กับกลุ่มผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ระยะระยะเวลาดูแลผู้ป่วยตามความสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ระดับ A: Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, & Horowitz, 2002)

3. การดูแลโดยทีมสุขภาพ (healthcare team approach intervention) พบการศึกษาจำนวนมากถึง 19 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 13 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Karntz et al., 2008; Koshman et al., 2008; Kwok et al., 2008; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Riegel et al., 2002; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999; Stewart & Horowitz, 2002) และระดับ B 6 เรื่อง (วรินทร์ เวียงโสด,

2547; Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997) การดูแลโดยทีมสุขภาพเป็นการร่วมมือกันของบุคลากรในทีมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุม โดยใช้แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพิเศษ แพทย์ผู้ดูแล พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลชุมชน เกษัตริกร โภชนากร นักกายภาพบำบัดหรือหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานดูแลที่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ และจิตแพทย์ ซึ่งแต่ละวิชาชีพมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล โดยใช้ทีมสุขภาพร่วมกันดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถลดปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ช่วยให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพดีขึ้น ลดผลแทรกซ้อน ลดระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวและสามารถลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (ระดับ A: Inglis et al., 2006; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart et al., 1999; ระดับ B: Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000) มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดูแลด้วยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเพียงวิชาชีพเดียว (ระดับ A: Holland et al., 2007; Koshman et al., 2008)

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีการศึกษาจำนวนมากถึง 20 เรื่อง เป็นหลักฐานทางวิชาการระดับ A 12 เรื่อง (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999; Stewart & Horowitz, 2002) และระดับ B 8 เรื่อง (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) ที่ใช้ทั้ง 3 องค์ ประกอบรวมกัน ได้แก่ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลโดยทีมสุขภาพ ส่วนใหญ่มีการดำเนินเป็นโปรแกรมการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลอย่างมีแบบแผน การดูแลต่อเนื่องโดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับมีการติดตามให้การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยบุคลากรทีมสุขภาพ สามารถลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอภิปรายผล

การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบในช่วงเวลา 18 ปี ทำให้ได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

จำนวน 38 เรื่อง จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่ามีผลงานการวิจัยอยู่ในระดับ A จำนวน 23 เรื่อง ระดับ B จำนวน 13 เรื่อง และระดับ C จำนวน 2 เรื่อง แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพียงพอ และจากหลักฐานงานวิจัยที่อยู่ในระดับ A แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษามีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปปฏิบัติได้

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง พบว่าเน้นศึกษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ อายุของกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 70 ปี ถึง 24 เรื่อง และมีงานวิจัยจำนวน 8 เรื่อง (Bryant, 2002; Hoskins et al., 2001; Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Proctor et al., 2000; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ และมีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง (Kwok et al., 2008) สอดคล้องกับการศึกษาของเนลเลอร์ และคณะ (Naylor et al., 1999) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุมักมีปัญหาโรคเรื้อรังและรุนแรง รวมทั้งมักมีโรคร่วมหลายโรค ส่งผลให้ภาวะการทำหน้าที่และระดับความสามารถในการดูแลตนเองลดลง และมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีพอหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล คือ ขาดการรักษาย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล 2) กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับของภาวะหัวใจล้มเหลวนรุนแรง คือ ระดับ III-IV (Fonarow et al., 1997; Jaarsma et al., 2008) และกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (Ejection Fraction: EF) น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 (Boonyapiphat, 2007; Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krumholz et al., 2002; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Romualdo et al., 1999; Shah et al., 1998) ซึ่งผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวในระดับสูง คือ ระดับ III และ IV จะมีค่า Ejection Fraction (EF) ลดลง และมีความทนต่อการทำกิจกรรมน้อย มีความทุกข์ทรมานจากอาการหอบเหนื่อย คุกคามต่อชีวิต และการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น (Anderson et al., 2006; Armola & Topp, 2001) และ 3) กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง (วรินทร์ เวียงโสด, 2547; Boonyapiphat, 2007; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002) จากการศึกษาของวินสัน และคณะ (Vinson et al., 1990) พบว่า ผู้ป่วยที่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ก่อน และมีประวัติของการเข้ามารักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จะมีความเสี่ยงสูงต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลเร็วขึ้น

การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

จากการทบทวนงานวิจัยจำนวน 38 เรื่องในครั้งนี้ พบว่า การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ศึกษามีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันหรือจัดการปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่สามารถควบคุมได้ และเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุมทั้งขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ร่วมกับการดูแลภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล วิธีการจัดการที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง 2) การดูแลต่อเนื่อง และ 3) การดูแลโดยทีมสุขภาพ ซึ่งการใช้ทั้ง 3 องค์ประกอบร่วมกันสามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ห่อภิมาณของกอดเร-สริดเดอร์ และคณะ (Gwadry-Sridher et al., 2004) พบว่า โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($RR = 0.79$, 95% $CI = 0.68-0.91$, $p < .001$) และการวิเคราะห์ห่อภิมาณของฟิลลิปส์ และคณะ (Phillips et al., 2004) พบว่า การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยแบบครอบคลุมโดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการสนับสนุนดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลังการจำหน่าย สามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($RR = 0.75$, 95% $CI = 0.64-0.88$)

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ใช้เพียง 1 หรือ 2 องค์ประกอบ เช่น การศึกษาของไค และคณะ (Kwok et al., 2008) ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับจากพยาบาลชุมชน (community nurse) เพียงวิชาชีพเดียว โดยผู้ป่วยจะได้รับการเยี่ยมจากพยาบาลชุมชน ก่อนจำหน่าย และดูแลต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบ้านหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า อัตราการกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกลุ่มที่ได้รับการดูแลเฉพาะจากพยาบาลชุมชนไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบปกติ การศึกษาของฮอนแลนด์ และคณะ (Holland et al., 2007) ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับจากเภสัชกรชุมชน (community pharmacists) เพียงวิชาชีพเดียว โดยการเยี่ยมบ้านและให้ความรู้หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ไม่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ อีกทั้งการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มทดลองยังมากกว่ากลุ่มควบคุมอีกด้วย ส่วนการศึกษาของวูดเอนด์ และคณะ (Woodend et al., 2008) ศึกษาผลของโปรแกรม Telehome monitoring ติดตามดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยใช้ระบบ video conference ผลการศึกษาพบว่า ไม่สามารถลด

จำนวนการกลับเข้ารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์อภิมานของคิม และโซเค็น (Kim & Soeken, 2005) ที่กล่าวว่า การใช้ระบบการจัดการรายกรณีเฉพาะในโรงพยาบาล (hospital base) อย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้

จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้ทุกองค์ประกอบร่วมกันเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวมีความซับซ้อนในการจัดการ และการศึกษานานวิชัยครั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสู่การพัฒนาสร้างแนวทางปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งงานวิจัยบางเรื่องอาจยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับบางองค์ประกอบของประเทศไทยได้โดยตรง ดังนั้น ควรนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือบริบทของแต่ละองค์กร หรือควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งตัวผู้ป่วยและองค์กร

การนำผลการศึกษาไปใช้

จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทำให้ได้องค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันและจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว อีกทั้งยังเห็นได้ว่าการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เริ่มตั้งแต่เมื่อรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลร่วมกับมีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ดังนั้นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวไปใช้ควรเป็นลักษณะของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเอง รวมถึงการพิจารณาสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความรู้ที่เหมาะสม การดูแลต่อเนื่องทั้งขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยใช้วิธีตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ป่วย และการดูแลโดยทีมสุขภาพ เป็นการร่วมมือกันของบุคลากรในทีมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุม นอกจากนี้การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายด้วย และพบว่าการเพิ่มระยะเวลาติดตาม

ดูแลผู้ป่วยนานขึ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ และจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในคลินิกโดยแพทย์ พยาบาลหรือวิชาชีพอื่น เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและพัฒนาเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติทางการพยาบาล

การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดได้จากหลายปัจจัย ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้มีการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีหลายปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเอง เช่น การไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการรับประทานยา การไม่ไปพบแพทย์ตามนัด และขาดการมาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ 2) ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพและการรักษา เช่น การไม่ส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจระหว่างเข้ารับการรักษ การต้องใช้ยารักษาหลายชนิด การขาดประสิทธิภาพในระบบการจำหน่ายผู้ป่วยและการส่งต่อ รวมถึง 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว เช่น ขาดการยอมรับและเห็นคุณค่า อีกทั้งในแต่ละการศึกษายังมีความแตกต่างกันในด้านของเนื้อหา วิธีการจัดการ และระยะเวลาของการติดตามผู้ป่วย การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ควรพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร นอกจากนี้ความรู้ที่ได้จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยในครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจว่า การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้เป็นผลสำเร็จ ควรมีการดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดย 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล 2) มีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษในโรงพยาบาลรวมถึงมีการติดตามให้การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และ 3) จัดทีมดูแลผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทีมสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. การนำผลขององค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้ มาสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อความถูกต้อง เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น และทดสอบความเป็นไปได้ของแนวทางปฏิบัติโดยการศึกษานำร่องก่อนนำไปปฏิบัติจริง

2. ควรมีการพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

จากการทบทวนหลักฐานทางวิชาการเรื่องการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจภาพรวมของรูปแบบต่างๆ ทั้งลักษณะของกลุ่มผู้ป่วย การจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลโดยทีมสุขภาพ สามารถสรุปให้เห็นถึง กระบวนการ วิธีการจัดการ ระยะเวลาการติดตามผู้ป่วย และผลลัพธ์ของการจัดการในรูปแบบนั้นๆ มีการพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ โดยใช้หลาย ๆ องค์ประกอบเข้าร่วมในการดูแลผู้ป่วย และพัฒนาขึ้นเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลที่ได้มาตรฐานทำให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

A LITERATURE REVIEW RELATED TO THE MANAGEMENT FOR REDUCING
READMISSION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

RAPEEPUN SOOMHIRUN 5036189 RAAN/M

M.N.S. (ADULT NURSING)

THEMATIC PAPER ADVISORY COMMITTEE: SUPREEDA MONKONG, Ph.D.
(GERONTOLOGICAL NURSING), KUSUMA KHUWAWATANASAMRIT, Ph.D.
(NURSING)

EXTENDED SUMMARY

Background and Significance

Heart Failure is currently a very critical heart disease due to rapid increase in number of patients. In 2005, 1,084,000 patients in USA were diagnosed with congestive heart failure, and there were up to 660,000 new cases at the age of over or equivalent to 45 years (American Heart Association, 2008). Heart failure was the most frequent hospitalization either at the emergency room or admission (Stull, Starling, Haas, & Young, 1999). Each admission took for 7-10 days with the cost for caring more than 10,000 US Dollars (Stull et al., 1999). Approximately the cost for patients with heart failure both directly and indirectly in USA for the year 2008 reached 34.8 billion US Dollars/year (American Heart Association, 2008). Besides, readmission of the patients was averagely 2.5 times/person (Chin & Goldman, 1997). As for heart failure in Thailand, incidences or symptoms occurred with Thai people had not been reported (Piyamith Srithara, B. E. 2549). However, congestive heart failure was the top rank causing heart disease patients per 100,000 populations to be readmitted and still kept increasing by 503.1, 530.7, and 618.5 for the year 2004, 2005, and 2006 respectively (Bureau of Policy and Strategy, B. E. 2550).

Congestive heart failure represented cardiac dysfunction with uncertain conditions whether it would be better, stable, or worse. Due to its severe and chronic pathology, patients would become weak both physically and mentally that mostly related to symptom factors. The symptoms included shortness of breath, unable to sleep flat, pulmonary edema, limb edema, fatigue, weary, and reduced endurance (Hunt et al., 2001). Patients had to suffer such symptoms and be hospitalized frequently. Readmission would affect patients physically, mentally, emotionally, socially, and economically as well as their family and country (Yauwapa Boontiang, B. E. 2545). Although over the past 30 years several knowledge and treatment development could highly enhance more effective heart failure treatment leading to relieved symptoms and reduced mortality, but in the meantime heart failure patients with moderate and severe condition at functional class III-IV reached 15% of mortality each year, and had to be readmitted by 10% within 1 month (Kithichi Bhuripanyo and Chunchakarn Chotinaiwattarakul, B. E. 2549) especially those who were over 75 years old (Dykes et al., 2005; Madigan, 2008; Uran Wongklaw and Sutthichai Jitapun kul, B. E. 2542). Accordingly, the study of Yauwapa Boontiang, Sirirut Panuthai, and Accharaanong Pramoch, B. E. (2546) found that congestive heart failure was the most frequent condition found in hospitalized elderly people with the highest rate of readmission at 2-30 times.

According to the literature review, it was found that there were several factors causing readmission in patients with heart failure in terms of healthcare and treatment system such as lack of patient referral to cardiologist, several of medication, lack of efficiency in patient discharge planning and referral (Hamner & Ellison, 2005); in terms of social and family support such as lack of recognition; and in terms of the patients' behaviors such as not following planned eating and medication, not seeing the doctor as appointment, and lack of hospital visit when having symptoms (Kachun Piasupun, B. E. 2545; Vinson, Rich, Sperry, Shan, & McNara, 1990). Accordingly, the study of Yauwapa Boontiang et al. (2546) in 90 elderly patients with heart failure found that social support was positively related to health behaviors and negatively related to readmission.

In addition to medication for patients with heart failure in order to reduce readmission, heart failure clinic should be also established (Piyamith Srithara, B. E.

2549) in order to educate patients and their relatives, suggest them on proper behaviors such as low sodium dietary restrictions, daily weighing, edema estimation, and self management of diuretic. Besides, patients also needed assistance from health team members, social and family support continuously in order to survive and prevent disease recurrence resulting in better quality of patients' life, reduced mortality, reduced hospitalization, reduced bed occupancy, increased treatment worthiness, and reduced expenses of the hospital, patients and relatives. The key indicator was the reduction of readmission (Piyamith Srithara, B. E. 2549; Rungsarit Khanchanawanit, B. E. 2546; Harrington, 2008; Hunt et al., 2005; Varugbese, 2007).

Reducing readmission in patients with heart failure was the key indicator which indicated self-care ability of patients and their family as well as healthcare quality of the hospital (The Healthcare Accreditation Institute, B. E. 2549). The healthcare quality development system of Bureau of Nursing, Department of Medical Services, Ministry of Public Health (2547) stated that readmission represented overall evaluation of effectiveness and completeness of inpatient treatment namely evaluation of diagnosis problem & treatment and patient discharge planning. Inpatient care should be wholly complete. Readmission of inpatient without any appointment reflected incompleteness of previous treatment or lack of patients' cooperation. Some factors were under control of the hospital related to service quality whereas some factors were uncontrollable (The Healthcare Accreditation Institute, B. E. 2549).

Currently it was acceptable that patient healthcare should be an evidence-based practice and refer to quality research. Therefore, a nurse who was one of health team members had to be able to apply specific research as a guideline for nursing practices to each group of patients in order to enable patients and their family to have proper self-care continuously leading to reduced heart failure recurrence and readmission. Although there were some studies on factors influencing readmission in patients with heart failure and some studies on healthcare methods for patients with heart failure in order to reduce readmission, but the literature review revealed that there was not any clear summary about healthcare methods for patients with heart failure in order to reduce readmission in Thailand. Therefore, the researcher was interested in exploring data and collect research studies related to management for reducing readmission in patients with heart failure in order to acquire knowledge for

developing nursing practices contributing to readmission reduction, providing same quality and standardized healthcare for patients with heart failure so that the patients could live in the society on their own and have quality of life despite their heart disease.

Objectives

1. To collect and analyze research studies related to management for reducing readmission in patients with heart failure.
2. To acquire knowledge for developing nursing practices contributing to readmission reduction in patients with heart failure.

Expected Outcomes

To acquire knowledge for developing nursing practices contributing to readmission reduction in patients with heart failure and healthcare provision for this patient group.

Scope of Literature Review

This literature review was to analyze, assess, and synthesize some research studies related to management for reducing readmission in patients with heart failure by selecting some studies conducted during 1990-2008.

Definition

Heart failure means complex clinical symptoms caused by abnormal structure and function of heart resulting in insufficient blood circulation inside the body. Such blood deficit caused changes of several systems leading to body excess water and sodium inside the lung and blood circulation system. The symptoms included shortness of breath, unable to sleep flat, pulmonary edema, limb edema, fatigue, weary, and reduced endurance.

Readmission in patients with heart failure means that patients with heart failure came back to the hospital either at the emergency room or inpatient admission because of heart failure recurrence after hospital discharge without any appointment.

The management for reducing readmission in patients with heart failure means intervention that apply for patients with heart failure to reduce readmission.

Research Methodology

This study collected and analyzed relevant research studies in order to acquire knowledge for developing nursing practices contributing to readmission reduction in patients with heart failure as follows:

1. Data searching: The researcher explored the data from electronics database such as OVID, CINAHL, Pubmed, ScienceDirect, Cochrane; from thesis of several universities in the field of nursing and others such as Mahidol University, Chiang Mai University, Khon Kaen University, Prince of Songkla University; and from websites related to Thailand and foreign research database such as <http://library.ra.mahidol.ac.th>, www.thaiheart.org, www.AHCPR.org, www.Americanheart.org, and www.Google.com. The explored data belonged to 1990-2008. Keywords used for searching from electronics database and from Thailand and foreign research database websites included congestive heart failure, congestive heart failure and readmission, congestive heart failure and rehospitalization, congestive heart failure and unplanned readmission, prevention and readmission and congestive heart failure, Guideline and management and congestive heart failure, readmission and management and congestive heart failure, Guideline and congestive heart failure, Management and congestive heart failure, Readmission in heart failure. Also, manual search from textbooks, university thesis, nursing journals, medical and other relevant journals, and reference in research studies was conducted from March 2008 – March 2009.

2. Data selection criteria: Inclusion criteria were the studies on patients with heart failure and readmission caused by heart failure recurrence, and management or prevention for reducing readmission in patients with heart failure. Exclusion criteria were the studies conducted with children patients.

3. Quality assessment and academic evidence analysis for considering possibility of clinical application.

Quality assessment on evidence reliability was based on research quality criteria of the Royal College of Physician of Thailand (Evidence-Based Medicine & Clinical Practice Guidelines Subcommittee, the Royal College of Physician of Thailand, 2001) which classified academic evidence into 4 levels as follows:

Level A means the evidence acquired by meta-analysis of experimental research studies with randomized controlled trials (RCT) or a single research with randomized controlled trials (RCT).

Level B means the evidence acquired by meta-analysis of experimental research studies with at least one randomized controlled trial (RCT) or a single research with concise research design but a semi-experimental or experimental research without random sampling.

Level C means the evidence acquired by comparison studies or other descriptive research studies.

Level D means the evidence acquired by expert consensus, textbooks, and academic paper.

Academic evidence analysis for considering possibility of clinical application was based on criteria of Polit, Beck, & Hungler (2001) as follows:

1. The chosen study was relevant to the issue of studied problem (clinical relevance).
2. The study was accurate and reliable (scientific-merit), being considered by research design, sampling, research tool and variable measurement, statistical analysis, internal validity, external validity, as well as strength and weakness of research methodology.
3. Tendency or possibility of research application (implementation potential) was described as below:
 - 3.1 The chosen research was appropriate (transferability of findings) with organizations, patients, and healthcare philosophy of health team members.
 - 3.2 The research application was possible (feasibility of implementation), offering privilege for nurses' application and gaining cooperation in implementation from colleagues.
 - 3.3 The chosen research was enough beneficial and worthy (cost-benefit ratio), compared to the traditional practice.

Results

Knowledge was acquired from 38 research studies classified into 23 studies of level A (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Gwadry-Sridher et al., 2004; Holland et al., 2007; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Jerant et al., 2001; Karntz et al., 2008; Kim & Soeken, 2005; Koelling et al., 2005; Koshman et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart & Horowitz, 2002; Riegel et al., 2002; Romualdo et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1998; Woodend et al., 2008), 13 studies of level B (Nipaporn Prachanban, B. E. 2550; Warin Wiangosot, B. E. 2547; Boonyapiphat, 2007; Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Jong et al., 2007; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998), and 2 studies of level C (Martens, 2000; Proctor et al., 2000). The researcher presented results of the study into 2 parts: sample characteristics and management for reducing readmission in patients with heart failure as described below:

Sample characteristics

Regarding sample characteristics in 38 research studies, it was found that most of the sample aged from 15-98 years. Most of them were elderly people. Samples aged over 70 years were found in 27 studies. Some studies were conducted with only patients who were at risk of readmission including 8 studies of elderly patients classified into 5 studies of level A (Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995), 2 studies of level B (Bryant, 2002; Hoskins et al., 2001), and 1 studies of level C (Proctor et al., 2000). 2 studies involved patients with severe heart failure at level III-IV classified into 1 study of level A (Jaarsma et al., 2008) and 1 study of level B (Fonarow et al., 1997). 11 studies belonged to patients with ejection fraction (EF) less than or equivalent to 40% classified into 7 studies of level A (Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krumholz et al., 2002; Romualdo et al., 1999), and 4 studies of level B (Boonyapiphat, 2007; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Shah et al., 1998). 4 studies focused on patients with more than or equivalent to 1 time of inpatient medical record classified into 3 studies of level A (Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002), and 1 study of level B (Boonyapiphat, 2007).

Management for reducing readmission in patients with heart failure

According to the study on 38 research studies, it was found that most of management for reducing readmission in patients with heart failure was prevention or management for risk factors of controllable readmission consisting of several components. There were 3 components of management for reducing readmission in patients with heart failure as follows: 1) self-care: supportive educational intervention 2) continuing care, and 3) health care team.

1. Self-care: supportive educational intervention: Among 38 research studies, there were 18 studies related to self-care: supportive educational intervention classified into 8 studies of level A (Blue et al., 2001; Cline et al., 1998; Holland et al., 2007; Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Romualdo et al., 1999), and 10 studies of level B (Nipaporn Prachanban, B. E. 2550; Warin Wiangosot, B. E. 2547; Boonyapiphat, 2007; Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998). Self-care education for patients and their relatives contributed to their increased self-care ability mainly aiming at building up confidence in self-care leading to long-term motivation without giving up lifestyle change, risk factors reduction, and continuous proper self-care behaviors. This study revealed that systematic education could help patients with heart failure and their relatives understand how to take care of themselves well enough. Moreover, when patients and their relatives were continuously supported by health team members, their confidence in self-care would be increased resulting in proper self-care behaviors that could control heart failure severity leading to reduced readmission.

18 research studies related to self-care education involved several subjects such as heart failure, food and water consumption, medication, healthcare and behavior adjustment, exercise, abnormal symptom surveillance, and abnormal symptom treatment. As for components of self-care education, it was found that most health team members who provided education were nurses (11 studies). It also indicated that effective education provided by nurses or nurses in association with health team members could reduce readmission. Individual education or both group and individual education provided for patients and their caregivers could increase knowledge and self-care behaviors of patients. Besides, it was found that only education (Level A:

Blue et al., 2001; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Level B: Bryant, 2002; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002) could increase knowledge and self-care behaviors of patients resulting in reduced readmission. Education along with self-care skill practice (Level A: Cline et al, 1998; Level B: Boonyapiphat, 2007; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) could provide knowledge and skill for patients to deal with abnormal symptoms confidently and more efficiently resulting in reduced readmission as well. Besides, trainers would use different teaching material for each session in order to make patients and their relatives understand and follow accordingly. Teaching material could help demonstrate complicated content suitably for each patient group, being easier for patients to understand and learn efficiently as well as reducing readmission (Level B: Bryant, 2002). Self-care education and practice for patients and their relatives mostly used more than 1 type of instructional media that was proved to help learners understand easily, perceive more quickly, and take care of themselves more efficiently (Level A: Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; Level B: Nipaporn Prachanban, B. E. 2550; Warin Wiangosot, B. E. 2547).

2. Continuing care: According to the literature review, there were 3 types of continuing care as follows: 1) Continuing care while being hospitalized along with healthcare after hospital discharge. There were 18 research studies classified into 10 studies of level A (Blue et al., 2001; Cline et al, 1998; Jaarsma et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krantz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Kwok et al., 2008; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999), and 8 studies of level B (Nipaporn Prachanban, B. E. 2550; Warin Wiangosot, B. E. 2547; Boonyapiphat, 2007; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998). 2) Continuing care while being hospitalized. There were 1 research study classified into level B (Luthi et al., 2003) stating about inpatient care by adjusting ACEI dose as targeted before discharging from the hospital leading to reduced readmission in patients with heart failure. 3) Continuing care after hospital discharge. There were relevant 24 research studies. It was found that 6 research studies involved follow-up phone call divided into 2 studies of level A (Koelling et al., 2005; Riegel et al., 2002), and 4 studies of level B (Nipaporn Prachanban, B. E. 2550; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Fonarow et al., 1997). 5 research studies in level

A belonged to home visit (Krantz et al., 2008; Holland et al., 2007; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002). 2 research studies in level A involved video conference (Jerant et al., 2001; Woodend et al., 2008). Other technology application such as fax, email, and pager was described in 1 research study in Level A (Gwadry-Sridher et al., 2004) and 1 research study in level B (Shah et al., 1998). 4 research studies mentioned continuing care at outpatient clinic or heart failure clinic classified into 2 studies in level A (Cline et al, 1998; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999) and 2 studies in level B (Warin Wiangosot, B. E. 2547; Boonyapiphat, 2007). 5 research studies in level A focused on home visit along with follow-up phone call (Blue et al., 2001 Inglis et al., 2006; Krumholz et al., 2002 Rich et al., 1993; Rich et al., 1995). Each method had different advantages and limitations that could be applied to each patient group as appropriate. Besides, it was found that long-time continuing care could reduce readmission statistically significantly (Level A: Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, & Horowitz, 2002).

3. Healthcare team approach intervention: There were relevant 19 research studies classified into 13 studies in level A (Blue et al, 2001; Cline et al, 1998; Inglis et al., 2006; Karntz et al., 2008; Koshman et al., 2008; Kwok et al., 2008; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Riegel et al., 2002; Stewart et al.,1998; Stewart et al., 1999; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999; Stewart & Horowitz, 2002), and 6 studies in level B (Warin Wiangosot, B. E. 2547; Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997). Healthcare by health team members was to thoroughly take care of patients with the cooperation between specialists, personal doctors, advanced practice nurses, professional nurses, community nurses, pharmacists, nutritionists, physical therapists or Cardiac Rehabilitation Unit, social workers, home caregivers, respiratory system specialists, and psychologists. Each professional unit had different roles and duties. This study indicated that healthcare for patients with heart failure by health team members could better reduce factors or causes of readmission, increase healthcare quality, enhance better health condition of patients, reduce complicacy, reduce severity of heart failure, and reduce readmission (Level A: Inglis et al., 2006; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart et al., 1999; Level B: Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000), when compared

with healthcare by only one professional body (Level A: Holland et al., 2007; Koshman et al., 2008).

This study found that there were 20 research studies classified into 12 studies in level A (Blue et al, 2001; Cline et al, 1998; Inglis et al., 2006; Koelling et al., 2005; Karntz et al., 2008; Krumholz et al., 2002; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995; Stewart et al., 1998; Stewart et al., 1999; Stewart, Marley, & Horowitz, 1999; Stewart & Horowitz, 2002), and 8 studies in level B (Warin Wiangosot, B. E. 2547; Boonyapiphat, 2007; Creson, 2001; Dahl & Penque, 2000; Draus et al., 2002; Fonarow et al., 1997; Hoskins et al., 2001; Shah et al., 1998) which involved all 3 components namely: 1) self-care: supportive educational intervention, 2) continuing care, and 3) health care team. Most of them implemented management program for reducing readmission. This represented that well-organized education and skill practice provided for patients and their relatives, systematic continuing care from being hospitalized until being discharged from the hospital, and teamwork of health team members could reduce readmission in patients with heart failure efficiently.

Discussion

In this study, the researcher explored the data within 18 years systematically. As a result, there were totally 38 research studies related to management for reducing readmission in patients with heart failure. According to the literature review and research quality assessment, it was found that there were 23 studies in level A, 13 studies in level B, and 2 studies in level C. This represented that knowledge of management for reducing readmission was adequately provided at present. Research evidence in Level A indicated that outcomes of the study were reliable and practical.

Sample characteristics

According to 38 research studies, these studies focused on studying patients who were at risk of readmission as follows: 1) Elderly patients. In this study there were 24 research studies conducted with samples aged over 70 years, and 8 research studies (Bryant, 2002; Hoskins et al., 2001; Inglis et al., 2006; Kwok et al., 2008; Phillips et al., 2004; Proctor et al., 2000; Rich et al., 1993; Rich et al., 1995) were conducted with elderly patients only because heart failure was a critical health problem of elderly people and it was often related to readmission (Kwok et al., 2008).

Accordingly, the study of Naylor et al., (1999) mentioned that elderly people usually had chronic and severe diseases along with multiple diseases resulting in reduced self-care function and ability, unsatisfied outcomes after hospital discharge such as lack of continuing treatment, and high risk of readmission. 2) Patients with high severity of heart failure at Level III-IV (Fonarow et al., 1997; Jaarsma et al., 2008) and patients with Ejection Fraction (EF) less than or equivalent to 40% (Boonyapiphat, 2007; Cline et al., 1998; Inglis et al., 2006; Jaarsma et al., 2008; Karntz et al., 2008; Koelling et al., 2005; Krumholz et al., 2002; Lee et al., 2007; Luthi et al., 2003; Romualdo et al., 1999; Shah et al., 1998). Patients with heart failure severity at Level III-IV would have lower ejection fraction (EF) and low activity endurance, suffer panting harmful to their life, and increase in readmission (Anderson et al., 2006; Armola & Topp, 2001). 3) Patients with inpatient medical record at least one time (Warin Wiangosot, B. E. 2547; Boonyapiphat, 2007; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 1999; Stewart & Horowitz, 2002). The study of Vinson et al. (1990) found that patients with existing heart failure and regular hospitalization record would be at high risk of earlier readmission.

Management for reducing readmission in patients with heart failure

According to the literature review of these 38 research studies, it was found that there were several methods of management for reducing readmission in patients with heart failure. Most methods were prevention or management for controllable risk factors of readmission and focused on thoroughly taking care of patients from being hospitalized until being discharged from the hospital. Most methods consisted of 3 components namely: 1) self-care: supportive educational intervention, 2) continuing care, and 3) health care team. All of these 3 components could reduce readmission in patients with heart disease. Accordingly, Meta-analysis of Gwadry-Sridher et al. (2004) revealed that healthcare program for patients with heart failure consisting of self-care education, healthcare by multidisciplinary care team, and continuing care after hospital discharge could reduce all types of readmission statistically significantly (RR= 0.79, 95% CI= 0.68-0.91, $p < .001$). Meta-analysis of Phillips et al. (2004) found that hospital discharge planning by self-care education, multidisciplinary care team, along with continuing care after hospital discharge could reduce risk factors of readmission statistically significantly (RR = 0.75, 95% CI= 0.64-0.88).

When compared to the research studies conducted with only 1 or 2 components like the study of Kwok et al. (2008) on the outcomes of healthcare for patients with heart failure by only community nurse visit before being discharged and home visit after hospital discharge found that readmission rate of heart failure patients with community nurse care was not different from those with normal care. The study of Holland et al. (2007) on the outcomes of healthcare for patients with heart failure by only community pharmacist's home visit and education provision after hospital discharge found that it could not reduce readmission. Moreover, readmission of the experimental group was higher than the control group. The study of Woodend et al. (2008) on the outcomes of Telehome monitoring program to follow-up patients with heart failure and coronary heart disease after hospital discharge by using video conference found that it could not reduce readmission in patients with heart failure. Accordingly, A meta-analysis of Kim & Soeken (2005) mentioned that only hospital based management was not enough for reducing readmission in patients with heart failure.

According to this study, it could be concluded that management for reducing readmission in patients with heart failure required all components because heart failure was complicated to be managed. This literature review collected relevant knowledge that could be fundamental data for developing nursing practices and managing for reducing readmission in patients with heart failure in the same direction. However, most relevant studies were conducted abroad and some studies might not be appropriate to be implemented in some organizations in Thailand. Therefore, it should be applied appropriately to society, culture, economic, or organizational context. Further study on management for reducing readmission in patients with heart failure should be conducted in order to acquiring appropriate knowledge for application for the benefits of patients and organizations.

Research Application

This study was an evidence-based practice contributing to acquiring knowledge for developing practices for prevention and management for reducing readmission in patients with heart failure. Management for reducing readmission in patients with heart failure started from patients' hospitalization and continued taking

care of patients after hospital discharge. Therefore, the application of knowledge on management for reducing readmission in patients with heart failure should be implemented as a management program for patients with heart failure. Main components of the program included self-care education for patients and their relatives, usage of appropriate teaching material, continuing care during hospitalization and after hospital discharge by using methods appropriate with patients' situation. Healthcare by health team members was the cooperation in taking care of patients thoroughly. Besides, management for reducing readmission in patients with heart failure depended on patient follow-up period after hospital discharge. It was found that longer follow-up period could reduce readmission. The findings of this study could be applied in clinic by doctors, nurses, or other professional bodies in order to take care of patients with heart failure and develop suitable program for such patients in Thailand.

Suggestions for nursing practices

Readmission in patients with heart failure came from several factors. Most factors were controllable. Several factors of readmission in patients with heart failure included: 1) patients factor such as not following planned eating and medication, not seeing the doctor as appointment, and lack of hospital visit when having symptoms, 2) healthcare and treatment system factor such as lack of patient referral to cardiology specialist, several kinds of medication, lack of efficiency in patient discharge and referral, and 3) social and family support factor such as lack of recognition. Each research study was different in terms of content, management method, and follow-up period. Knowledge application should be done appropriately for each patient and modified in line with organizational context. Besides, acquired knowledge from the literature review revealed that management for reducing readmission in patients with heart failure could be achieved through following nursing practices: 1) to provide self-care knowledge and skill practice for increasing self-care ability of patients and their caregivers, 2) to take care of patients continuously from the admission until after hospital discharge, and 3) to arrange patients caregivers consisting of health team members specialized in taking care of patients with heart failure.

Suggestions for next studies

1. To apply knowledge of management for reducing readmission in patients with heart failure to create practical guidelines verified by experts for reliability and conduct trial study to ensure its possibility before implementation.
2. To develop assessment form for risk factors of readmission in patients with heart failure to be a guideline for preventing readmission.

According to this literature review on management for reducing readmission in patients with heart failure, it came to understand several items regarding patients' characteristics, management for reducing readmission consisting of self-care education, continuing care, and health care team. It could indicate process, management methods, follow-up period, and outcomes of such management. Management had been developed progressively. Several components contributed to patient healthcare and were developed to be the standard guideline leading to healthcare quality for reducing readmission.

รายการอ้างอิง

- เกียรติชัย ฐิริปัญญา และชุนหะเกษม โชตินัยวัตรกุล. (2549). Nonpharmacologic treatment of congestive heart failure. ใน เกียรติชัย ฐิริปัญญา (บรรณาธิการ), *Update cardiology for internist*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เฮาแคนดู.
- ขจร เพ็ญสุพรรณ. (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- คณะอนุกรรมการ Evidence-Based Medicine & Clinical Practice Guidelines ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. (2544). คำแนะนำการสร้าง “แนวทางเวชปฏิบัติ” (Clinical Practice Guidelines). *สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย*, 18(6), 36-47.
- งานข้อมูลสถิติ ฝ่ายวิชาการ. (2548). โรงพยาบาลตากสิน สถิติผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2548. กรุงเทพฯ:โรงพยาบาลตากสิน.
- งานข้อมูลสถิติ ฝ่ายวิชาการ. (2549). โรงพยาบาลตากสิน สถิติผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2549. กรุงเทพฯ:โรงพยาบาลตากสิน.
- งานข้อมูลสถิติ ฝ่ายวิชาการ. (2550). โรงพยาบาลตากสิน สถิติผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2550. กรุงเทพฯ:โรงพยาบาลตากสิน.
- จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราพันธ์, ปุณยวีร์ ประเสริฐไทย, อรุณศรี จันทร์ประดิษฐ์, และวงรัตน์ ไสสุข. (2551). การดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. *วารสารสภาการพยาบาล*, 23(1), 35-47.
- จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, สมเกียรติ โพธิ์สัตย์, ยุพิน อังสุโรจน์, จารุวรรณ ธาดาเดช, และศรานุช โดมรศักดิ์. (2543). *เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล* (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ดีไซน์.
- จันทร์จิรา เกียรติสีสกุล. (2551). ผลของโปรแกรมการสนับสนุนให้ความรู้ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- นิภาพร ประจันบาน. (2550). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของผู้ป่วยและญาติในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อการกลับเข้ารับการรักษซ้ำในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

- เบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ.(2547). *การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาล*
ลำปาง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ประสาธ เหล่าถาวร ชาญ ศรีรัตนสถาวร ธนรัตน์ ชุนงาม และจรรยาไพศาล. (2541). การรักษาภาวะ
หัวใจวาย (management of heart failure mitigating approaches). ใน ถาวร สุทธิไชยากุล
(บรรณาธิการ), *Cardiology 1998*. กรุงเทพฯ: แซคอีเอ็น กราฟิคเพรส.
- ปิยะนุช รักพานิชย์. (2549). Exercise and heart disease. ใน เกียรติชัย ฐิริปัญญา (บรรณาธิการ),
Update cardiology for internist. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เฮาแคนดู.
- ปิยะมิตร ศรีธรา ก. (2549). Current management of CHF. ใน เกียรติชัย ฐิริปัญญา (บรรณาธิการ),
Update cardiology for internist. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เฮาแคนดู.
- ปิยะมิตร ศรีธรา ข. (2549). ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน. ใน ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ ศศิโสภัญ เกียรติ
บุรณกุล สมนึก สังฆานุภาพ (บรรณาธิการ), *อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน*. กรุงเทพฯ: สร้างสื่อ.
- ปิยะมิตร ศรีธรา ปิยทัศน์ ทศนาวิวัฒน์ และสายันห์ ชีพอุดมวิทย์. (2548). ปัจจัยเสี่ยงและระบาด
วิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจ Risk factors and epidemiology of coronary artery
disease. ใน วิศาล คันธารัตนกุล และระพีพล ภูญชร ณ อยุธยา (บรรณาธิการ), *เวชศาสตร์
ฟื้นฟูหัวใจ* (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: อภิสรา อินเตอร์กรุ๊ป.
- ปราณี กาญจนวรรณศรี. (2550). บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยโรคหัวใจ.
วารสารพยาบาลศาสตร์, 25(1), 24-34.
- ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2550). แนวคิดเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับพยาบาล: ภาวะหัวใจ
ล้มเหลว. *การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด* (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: โรงพิมพ์
คลังนานาวิทยา.
- พิกุล บุญช่วง. (2541). *การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว* (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พิมพ์ใจ นุจนะโปะ. (2547). ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่
ของร่างกายในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ไพศาล ลีละชัยกุล. (2550). พยาธิวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจและหลอดเลือด. ใน ชำรงจิ
จริยเวช (บรรณาธิการ), *พยาธิวิทยากายวิภาค เล่ม 1*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

เขาวภา บุญเที่ยง. (2545). การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพและการกลับเข้าพักรักษาใน
โรงพยาบาลของผู้สูงอายุหัวใจวายเลือดคั่ง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เขาวภา บุญเที่ยง, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, และอักรอนงค์ ปราโมช. (2546). การสนับสนุนทางสังคม
พฤติกรรมสุขภาพและการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุหัวใจวายเลือดคั่ง.
พยาบาลสาร, 30(1), 42-53.

รสสุคนธ์ วาริตสกุล. (2547). อาการอ่อนล้าในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว. วิทยาสารพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 29(2), 223-228.

รังสฤษฎ์ กาญจนะวนิชย์. (2546). แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดเรื้อรัง. ใน
วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข และอภิชาติ สุกนธสรพ์ (บรรณาธิการ), *อายุรศาสตร์ประยุกต์
เล่ม 1*. กรุงเทพฯ: ไอเอ็มเอเคในเซอร์แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิง.

วรินทร์ เวียงโสด. (2547). ประสิทธิภาพของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิศาล คันทรัตนกุล. (2548). การฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษcardiac rehabilitation in special
cases. ใน วิศาล คันทรัตนกุล และระพีพล ญูชรรณ อัยยยา (บรรณาธิการ), *เวชศาสตร์
ฟื้นฟูหัวใจ (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. นนทบุรี: อภิสร อินเทอร์เน็ต.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2528-2529). รายงานผู้ป่วยใน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ใน สุวิทย์ วิบุลผล
ประเสริฐ (บรรณาธิการ), *การสาธารณสุขไทย 2548-2550*. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก.

สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์. (2546). หัวใจล้มเหลว (Heart failure). ใน วิทยา ศรีมาดา (บรรณาธิการ),
ตำราอายุรศาสตร์ 4 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมจิต หนูเจริญกุล. (2544). ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม. ใน สมจิต หนูเจริญกุล (บรรณาธิการ),
การดูแลตนเอง: ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: วี เจ พรินติ้ง.

สมจิต หนูเจริญกุล. (2545). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. ใน สมจิต หนูเจริญกุล
(บรรณาธิการ), *การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 13)*. กรุงเทพฯ: วี เจ พรินติ้ง.

สมชาย ทรัพย์คุณาชัย. (2546). Cardiomyopathy. ใน ววุฒิเดช โอภาสเจริญสุข และอภิชาติ สุกนธสรพ์
(บรรณาธิการ), *อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1*. กรุงเทพฯ: ไอเอ็มเอเคในเซอร์แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิง.

- สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ). (2549). การวัดผลด้านการดูแลผู้ป่วย. ใน อนุวัฒน์ ศุภชุตีกุล (บรรณาธิการ), *นวัตกรรมตามรอยและวัดคุณภาพ*. กรุงเทพฯ: ดีไซน์.
- สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2547). *ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล*. ใน กฤษดา แสงดี (บรรณาธิการ), *ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล*. กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิชย์.
- อมราวดี บุญยรัตน์. (2550). *การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลนครพิงค์*. สารนิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อนุวัฒน์ ศุภชุตีกุล. (2545). เครื่องชี้วัด. ใน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (บรรณาธิการ), *Simplicity จาก web HA*. นนทบุรี: โฮลิสติกพับลิชชิง.
- อุพาร วงศ์เกล้า และสุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล. (2542). ภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้สูงอายุ. *จุฬารายการศาสตร์*, 12(4), 151-158.
- Adams, C. D., & Bennett, S. (2000). Exercise in heart failure: A synthesis of current research. *The Online Journal of Knowledge Synthesis for Nursing*, 7(5), 1-10.
- American Heart Association. (2008). Heart disease and stroke statistic-2008 update. *Circulation*, 117, e25-e146.
- Ammar, K. A., Jacobsen, S. J., Mahoney, D. W., Kors, J. A., Redfield, M. M., & Burnett, J. C., et al. (2007). Prevalence and prognostic significance of heart failure stages. *Circulation*, 115, 1563-1570.
- Anderson, J. H. (2007). Nursing presence in a community heart failure program. *The nurse Practitioner*, 7(9), 14-21.
- Armola, R. R., & Topp, R. (2001). Variable that discriminate length of stay and readmission within 30 day among heart failure patient. *Lippincott's Case Management*, 6(6), 246-255.
- Bennett, S. J., Codes, D. K., Westmoreland, G., Castro, R., & Donnelly, E. (2000). Self-care strategies for symptom management in patient with chronic heart failure. *Nursing Research*, 49(3), 139-145.
- Blue, L., Lang, E., McMurray, J. J., Davie, A. P., McDonagh, T. A., & Murdoch, D. R., et al. (2001). Randomised controlled trial of specialist nurse intervention in heart failure. *BMJ*, 322, 715-718.

- Boonyapiphat, T. (2007). Effect of a comprehend heart failure treatment program on heart failure readmission and quality of life. *Thai heart Journal*, 20(3), 117-124.
- Bryant, P. K. (2002). Congestive heart failure performance-improvement project. *Lippincott's Case Management*, 7(4), 152-162.
- Chin, M. H., & Goldman, L. (1997). Factor contributing to the hospitalization of patients with congestive heart failure. *American Journal Publish Health*, 87(4), 634-638.
- Cline, C. M. Israelsson, B. Y., Willenheimer, R. B. Broms, H., & Erhardt, L. R. (1998). Cost effective management programme for heart failure reduces hospitalization. *Heart*, 80, 442-446.
- Creason, H. (2001). Protocols in practice congestive heart failure telemanagement clinic. *Lippincott's Case Management*, 6(4), 146-156.
- Dahl, J., & Penque, S. (2000). The effects of an advance practice nurse-directed heart failure program. *The nurse practitioner*, 25(3), 61-77.
- Draus, C., Walblay, A., & Barraco, D. (2002). Partnering for congestive heart failure: clinic without walls. *Outcomes Management*, 6(1), 40-43.
- Dunbar, S. B., Clark, P. C., Quinn, C., Gary, R. A., & Kaslow, N. J. (2008). Family influences on heart failure self-care and outcomes. *Journal of Cardiovas vascular Nursing*, 23(3), 258-265.
- Dykes, K. A., Acevedo, K. A., Boldrighini, J., Boucher, C., Frumento, K., & Gray, P., et al. (2005). Clinical practice guideline adherence before and after implementation of the HEARTFELT (Heart Failure Effectiveness & Leadership Team Intervention). *Journal of Cardiovascular Nursing*, 20(5), 306-314.
- Eastwood, C. A., Travis, L., Morgenstern, T. T., & Donaho, E. K. (2007). Weight and symptom diary for self-monitoring in heart failure clinic patients. *Journal of cardiovascular nursing*, 22(5), 382-389.
- Fonarow, G. C., Stevenson, L. W., Walden, J. A., Livindton, N. A., Steimle, A. E., & Hamilton, M. A., et al. (1997). Impact of a comprehensive heart failure management program on Hospital readmission and functional Status of patients with advanced Heart failure. *Journal American College Cardiol*, 30, 725-732.

- Fonarow, G. C., Abraham, W. T., Albert, N. M., Stough, W. G., Gheroghiade, M. & Greenberg, B. H., et al. (2008). Factors identified as precipitating hospital admissions for heart failure and clinical outcomes. *Archives of Internal Medicine*, 168(8), 847-854.
- Ghali, J. K., Kadakia, S., Cooper, R., & Ferlinz, J. (1988). Precipitating factors leading to decompensation of heart failure: Traits among urban blacks. *Archives of Internal Medicine*, 148(9), 2013-2016.
- Gwadry-Sridher, F. H., Flintoft, V., Lee, D. S., Lee, H., & Guyatt. (2004). A systematic review and Meta-analysis of studies comparing readmission rates and mortality rates in patients with heart failure. *Archives of Internal Medicine*, 164(22), 2315-2320.
- Hamner, J. B., & Ellison, K. J. (2005). Predictors of hospital readmission after discharge in patient with congestive heart failure. *Heart and Lung*, 34(4), 231-239.
- Harrington, C. C. (2008). Evidence-base guideline assessing heart failure in long-term care facilities. *Journal of Gerontology Nursing*, 34(2), 9-14.
- Holland, R., Brooksby, L., Lenaghan, E., Ashton, K., Hay, L., & Smith, R., et al. (2007). Effectiveness of visit from community pharmacists for patients with heart failure: HeartMed randomised controlled trial. *BMJ*, 334, 1066-1077.
- Hoskins, L. M., Clark, H. M., Schroeder, M. A., Walton-Moss, B., & Thiel L. (2001). a clinical pathway for congestive heart failure. *Home Healthcare Nurse*, 19(4), 207-217.
- Hoyt, R. E., & Bowling, L. S. (2001). Reducing readmissions for congestive heart failure. *American Family Physician*, 63(8), 1593-1598.
- Hunt, S. A., Baker, D. W., Chinquegrani, M. H., Feldman, A. M., Francis, G. S., & Ganiats, T.G., et al. (2001). ACC/AHA guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult: executive summary: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the 1995 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure). *Journal of the American College of Cardiology*, 38(7), 2101-2113.
- Hunt, S. A., Baker, D. W., Chin, M. H., Francis, G. S., & Ganiats, T. G., et al. (2005). ACC/AHA 2005 Guideline Update for the diagnosis and management of chronic heart failure in the adult: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the

- Evaluation and Management of Heart Failure). *Circulation*, 20(9), e154-e235.
- Inglis, S. C., Pearson, S., Treen, S., Gallasch, T., Horowitz, J. D., & Stewart, S. (2006). Extending the horizon in chronic heart failure effects of multidisciplinary, home-base intervention relative to usual care. *Circulation*, 114, 2466-2473.
- Jaarsma, T., vander der wal, M. H., Lesman-Leegte, I., Luttik, M., Hogenhuis, J., & Veeger, N. J., et al. (2008). Effect of moderate or intensive disease management program on outcome in patients with heart failure. *Archives of Internal Medicine*, 168(3), 316-324.
- Jerant, A. F., Azari, R., & Nesbitt, T. S. (2001). Reducing the cost of frequent hospital admissions for congestive heart failure a randomized trial of home telecare intervention. *Medical Care*, 39, 1234-1245.
- Jong, P., Gong, Y., Liu, P. P., Austin, P. C., Lee, D. S., & Tu, J. V. (2003). Care and outcomes of patients newly hospitalized for heart failure in the community treated by cardiologists Compared with other specialists. *Circulation*, 108, 184-191.
- Kim, Y. J., & Soeken, K. L. (2005). A meta-analysis of the effect of hospital-based case management on hospital length-of-stay and readmission. *Nursing Research*, 54(4), 255-264.
- Koelling, T. M., Jhonson, M. L., Cody, R. J., & Aaronson, K. D. (2005). Discharge education improves clinical outcomes in patients with chronic heart failure. *Circulation*, 111, 179-185.
- Koenig, H. G. (2006). Depression outcome in inpatients with congestive heart failure. *Archives of Internal Medicine*, 166, 991-996.
- Krantz, M. J., Havranek, E. P., Haynes, D. K., Smith, I., Bucher-Bratelson, B., & Long, C. S. (2008). Inpatient initiation of β -blockade plus nurse management in vulnerable heart failure patient: A randomized study. *Journal of Cardiac Failure*, 14(4), 303-309.
- Koshman, S. L., Charrois, T. L., Simpson, S. H., McAlister, F. A., & Tsuyuki, R. T. (2008). Pharmacist care of patients with heart failure: A systematic review of randomized trial. *Archives of Internal Medicine*, 168(7), 687-694.
- Krumholz, H. M., Parent, E. M., Tu, N., Vaccarino, V., Wang, Y., Radford, M. J., & Hennen, J. (1997). Readmission after hospitalization for congestive heart failure among Medicare beneficiaries. *Archives of Internal Medicine*, 157, 99-104.

- Kwok, T., Lee, J., Woo, J., Lee, D. TF., & Griffith, S. (2008). A randomized controlled trial of a community nurse-supported hospital discharge programme in older patient with chronic heart failure. *Journal of Clinical Nursing*, 17, 109-117.
- Lagoe, R. J., Noetscher, C. M., & Murphy, M. P. (2001). Hospital readmission: Predicting the risk. *Journal of Nursing Care Quality*, 15(4), 69-83.
- Landrum, L., & Weinrich, S. (2006). Readmission data for outcome measurement: Identifying and strengthening the empirical base. *Quality Management in Health Care*, 15(2), 83-95.
- Lee, R., Chan, Y., Wong, J., Lau, D., & Ng, K. (2006). The 6-minute walk test predicts clinical outcome in Asian patients with chronic congestive heart failure on contemporary medical therapy: A study of the multiracial population in Singapore. *International Journal of Cardiology*, 119, 168-175.
- Lobmeyer, M. T., Gong, Y., Terra, S. G., Beitelshes, A. L., Langaee, T. Y., & Pauly D.F., et al. (2007). Synergistic polymorphisms of beta-1 and alpha-2C- adrenergic receptors and the influence on left ventricular ejection fraction response to beta-blocker therapy in heart failure. *Pharmacogenetics and Genomics*, 17(4), 277-282.
- Luthi, J., Lund, M. J., Sampietro-Colom, L., Kleinbaum, D. G., Ballard, D. J., & McClellan, W. M. (2003). Readmissions and the quality of care in patients hospitalized with heart failure. *International Journal for Quality in Health Care*, 15(5), 413-421.
- Luttik, M. L., Jaarsma, T., veeger, H., & van Veldhuisen, D. J. (2006). Marital status, quality of life, and clinical outcome in patient with heart failure. *Heart and Lung*, 35(1), 3-8.
- Mariotti, R., Castrogiovanni, F., Canale, M. L., Borelli, G., & Rondinini, L. (2008). Weight loss and quality of life in chronic heart failure patients. *Journal of Cardiovascular Medicine*, 9(6), 576-580.
- Martens, K. H. (2000). Home care nursing for person with congestive heart failure: Description and relationship to the hospital readmission. *Home Healthcare Nurse*, 18(6), 404-409.
- Naylor, M. D., Brooten, D., Campbell, R., Jacobsen, B. S., Mezey, M. D., Pauly, D.C, & Schwartz, S. (1999). Comprehensive discharge planning and home follow-up of hospitalized elders a randomized clinical trial. *JAMA*, 281(7), 613-620.

- Opasich, C., Febo, O., Riccardi, P. G., Traversi, E., Forni, G., & Pinna, G., et al., (1996).
Concomitant factors of decompensation in chronic in heart failure. *American Journal Cardiol*, 78(3), 354-357.
- Oxberry, S. G., & Johnson, M. J. (2008). Review of the evidence for the management of
dyspnoea in people with chronic heart failure. *Current Opinion in Supportive and Palliative Care*, 2, 84-88.
- Parashall, M. B., Welsh, J. D., Brokorp, D. Y., Heiser, R. M., Schooler, M. P., & Casidy, K. B.
(2001). Dyspnea duration, distress, and intensity in emergency department visit for
heart failure. *Heart and Lung*, 30, 47-56.
- Phillips, C.O., Wright, S.M., Kren, D. E., Singa, R. M., Shepperd, S., & Rubin, H. R. (2004).
Comprehensive discharge planning with postdischarge support for older patients
with congestive heart failure. *JAMA*, 291(11), 1358-1367.
- Phillips, L., Harrison, T., & Houck, P. (2005). Return to work and the person with heart failure.
Heart and Lung, 34(2), 79-88.
- Polit, D. F., Beck, C. T., & Hungler, B. P. (2001). *Essentials of nursing research: Method, Appraisal, and utilization* (pp. 429-456). Philadelphia: Lippincott.
- Prasun, M. A., Kocheril, A. G., Klass, P. H., Dunlap, S. H., & Piano, M. R. (2005). The effects
of a sliding scale diuretic titration protocol in patients with heart failure. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 20(1), 62-70.
- Proctor, E. K., Howell, N. M., Li, H., & Dore, P. (2000). Adequacy of home care and hospital
readmission for elderly congestive heart failure patient. *Health and social work*, 25(2),
87-96.
- Redeker, N. S., & Stein, S. (2006). Characteristic of sleep in patients with stable heart failure
versus a comparison group. *Heart and Lung*, 35(4), 252-261.
- Rich, M W., Vinson, J. M., Sperry, J. C., Shas, A. S., Spinner, L. R., & Chung, M. K., et al. (1993).
Prevention and readmission in elderly patients with congestive heart failure: Results of a
prospective, Randomized pilot study. *Journal Gen Intern medicine*, 8(11), 585-590.
- Rich, M. W., Beckham, V., Wittenberg, C., Leven, C. L., Freedland, K. E., & Carney, R. B. (1995).
A multidisciplinary intervention to prevent the readmission of elderly patients with
congestive heart failure. *New England Journal of Medicine*, 333(18), 1190-1195.

- Riegel, B., Carlson, B., Copp, Z., LePetri, B., Glaser, D., & Unger, A. (2002). Effect of a standardized nurse case-management telephone intervention on resource use in patient with chronic heart failure. *Archives of Internal Medicine*, 162, 705-712.
- Riegel, B., Dickson, V. V., Goldberg, L. R., & Deatrick, J. A. (2007). Factor associated with the development of expertise in heart failure self-care. *Nursing Research*, 56(4), 235-243.
- Riegel, B., & Dickson, V. V. (2008). A Situation-Specific theory of heart failure self-care. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 23(3), 190-196.
- Romualdo, B., Demetrios, G., Giovanni, C., & Augusto, P. (1999). Randomized, controlled trial of long-term moderate exercise training in chronic heart failure; Effects on functional capacity, quality of life, and clinical outcome. *Circulation*, 99(9), 1173-1182.
- Schwarz, K. A., & Elman, C. S. (2003). Identification of factors predictive of hospital readmissions for patients with heart failure. *Heart and Lung*, 32(2), 88-99.
- Shah, N. B., Der, E., Ruggerio, C., Heidenreich, P. A., & Massie, B. M. (1998). Prevention of hospitalizations for heart failure with an interaction home monitoring program. *American Heart Journal*, 135, 373-378.
- Stewart, S., Pearson, S., & Horowitz, J. D. (1998). Effects of a Home-Based intervention among patients with congestive heart failure discharge from acute hospital care. *Archives of Internal Medicine*, 158(25), 1067-1072.
- Stewart, S., & Marley, J. E., & Horowitz, J. D. (1999). Effect of a multidisciplinary, home-based intervention on planned readmission and survival among patients with chronic congestive heart failure: a randomized controlled study. *Lancet*, 354, 1077-1083.
- Stewart, S., Vandenbrock, A. J., Pearson, S., & Horowitz, J. D. (1999). Prolonged beneficial of a home-based intervention on unplanned readmission and mortality among patients with congestive heart failure. *Archives of Internal Medicine*, 159(8), 257-261.
- Stewart, S., & Horowitz, J. D. (2002). Home-based intervention in congestive heart failure long-term implications on readmission and survival. *Circulation*, 105, 2861-2866.
- Stull, D. E., Starling, E. C., Haas, G., & Young, J. B. (1999). Becoming a patient with heart failure. *Heart and Lung*, 28(4), 284-292.
- Tendera, M., & Ochala, A. (2001). Overview of the results of recent beta blocker trials. *Current Opinion Cardiology*, 16, 180-185.

- van der Wal, Martje, H. L., Jaarsma, T., Moser, D. K., van Gilst, W. H., & van Veldhuisen, D. J. (2007). Unraveling the mechanisms for heart failure patient' beliefs about compliance. *Heart and Lung*, 36(4), 253-261.
- Vinson, J. M., Rich M. W., Sperry, J. C., Shan, A. S., & McNara, T. (1990). Early readmission of elderly patients with congestive heart failure. *Journal of American Geriatrics Society*, 38(12), 1290-1295.
- Wingate, S. (2007). Caring for the persons with advanced heart failure. *Home Healthcare Nurse*, 25(8), 511-522.
- Woodend, A. K., Sherrard, H., Fraser, M., Stuewe, L., Cheung, T., & Struthers, C. (2008). Telehomemonitoring in patients with cardiac disease who are at high risk of readmission. *Heart and Lung*, 37(1), 36-45.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	นางสาวรพีพันธุ์ สุ่มหิรัญ
วัน เดือน ปีเกิด	23 พฤษภาคม 2516
สถานที่เกิด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ประวัติการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ. 2536-2539: พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2547: ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2550-2552: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล ผู้ใหญ่)
ตำแหน่ง	พ.ศ. 2539-2552 พยาบาลวิชาชีพระดับ 7 วช พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
ที่อยู่	ที่ทำงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลตากสิน โทรศัพท์ 02-4370123 ต่อ 2206-07 ที่บ้าน: 3/22 ถนนปัญญาอินทรา รามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 02-1753279 E-mail: soomhirun@gmail.com