

**THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS
SELF-ESTEEM AND SOCIAL SUPPORT ON
MATERNAL GRIEF AFTER
PREGNANCY LOSS**

CHITRALADDA WONGWIGGAN

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF NURSING SCIENCE
(MATERNITY AND NEWBORN NURSING)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2003**

**ISBN 974-04-3454-1
COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY**

อิทธิพลของปัจจัยคัดสรร ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม ต่อความเศร้าโศกจากการสูญเสียทารกในครรภ์ของมารดา (THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS SELF-ESTEEM AND SOCIAL SUPPORT ON MATERNAL GRIEF AFTER PREGNANCY LOSS)

จิตรลดา ว่องวิทย์การ 4136504 RAMN/M

พ.ย.ม.(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: มาลี เลิศมาลีวงศ์, M.N., อรพันธ์ เจริญผล, ค.ม. (บริหารการพยาบาล)

บทคัดย่อ

การสูญเสียสิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตมนุษย์ แต่การสูญเสียทารกในครรภ์เป็นสิ่งที่มารดาไม่คาดคิด ไม่ต้องการให้เกิดและสามารถทำให้เกิดความเศร้าโศกแก่มารดาได้ การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปัจจัยคัดสรร ได้แก่ อายุของมารดา อายุครรภ์ และการสูญเสียทารกในครรภ์ครั้งก่อน ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความเศร้าโศกจากการสูญเสียทารกในครรภ์ของมารดา กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่มีการสูญเสียทารกในครรภ์และเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 4 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / FW version 9.05

ผลการวิจัยพบว่ามารดาที่มีการสูญเสียทารกในครรภ์มีคะแนนรวมของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับสูง ($M = 32.49$, $S.D. = 4.08$) แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับค่อนข้างสูง ($M = 46.29$, $S.D. = 7.70$) และความเศร้าโศกในระดับปานกลาง ($M = 80.47$, $S.D. = 18.01$) อายุครรภ์และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสามารถร่วมทำนายความเศร้าโศกได้ร้อยละ 26.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .01$) แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ ($r = -.20$, $p < .01$) กับความเศร้าโศกแต่ไม่สามารถทำนายความเศร้าโศกได้ ส่วนอายุของมารดาและประสบการณ์การสูญเสียทารกในครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความเศร้าโศก

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียทารกในครรภ์ก่อให้เกิดความเศร้าโศกแก่มารดา ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรตระหนักและประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความเศร้าโศกเช่น อายุครรภ์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และให้การดูแลมารดาที่สูญเสียบุตรเพื่อลดความเศร้าโศกเป็นพิเศษ เพื่อให้มารดาสามารถปรับตัวและเผชิญกับความเศร้าโศกจากการสูญเสียได้

THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS SELF-ESTEEM AND SOCIAL SUPPORT ON MATERNAL GRIEF AFTER PREGNANCY LOSS

CHITRALADDA WONGWIGGAN 4136504 RAMN/M

M.N.S. (MASTER OF NURSING SCIENCE)

THESIS ADVISORS : MALEE LERDMALEEWONG, M.N., ORAPIN CHAREONPOL, M.Ed.

ABSTRACT

Loss of any kind is a normal life experience, but pregnancy loss, in particular, is a primary cause of maternal grief and one which is not desired by any mother. The purpose of this descriptive research was to study the influence of selected factors, i.e. maternal age, gestational age and previous pregnancy loss, self-esteem and social support on maternal grief. Purposive sampling was used to select 100 mothers and who were admitted to the high-risk ward in Ramathibodi hospital, Bangkok, Thailand after pregnancy loss. Data were collected for 4 months from March to June 2000 using self-administered questionnaires, namely the Demographic Questionnaire, the Rosenberg Self-esteem Scale (Suphanee Soomlek, B.E. 2538), the Social Support Questionnaire (Chularuk Kaveevivitchai, B.E. 2536) and the Perinatal Grief Scale (Gahnnyarak Nguycharoen, B.E. 2541). Data were analyze using SPSS/FW version 9.05.

The results of this study revealed that the subjects had a high score for self-esteem ($M = 32.49$, $S.D. = 4.08$), a rather high score for social support ($M = 46.23$, $S.D. = 7.65$) but only a moderate score for maternal grief ($M = 80.47$, $S.D. = 18.01$). Gestational age and self-esteem are two factors that when combined could significantly explain 26.4% of the variance of maternal grief ($p < .01$). However, social support had only a low negative relationship with maternal grief ($r = -.20$, $p < .05$) and could not explain maternal grief. Other factors such as maternal age and previous pregnancy loss were not statistically correlated with maternal grief.

The results of the study clearly suggest that pregnancy loss can, indeed, lead to maternal grief. Thus, health-care providers should better understand the effects of the lost on the mother's life. Before caring for the mother that had suffered from pregnancy loss, health-care providers should assess such factors that affect maternal grief as gestational age, self-esteem and social support. Only then can they better provide special care to help these mothers manage throughout the grieving process.

KEY WORDS : SELF-ESTEEM / SOCIAL SUPPORT / MATERNAL GRIEF / PREGNANCY LOSS

62 p. ISBN 974-04-3454-1