

**CHILD ABUSE BY FAMILY CAREGIVERS AND PHYSICAL,
PSYCHOLOGICAL, AND BEHAVIORAL HEALTH
CONSEQUENCES AMONG 7th – 9th GRADERS**

RATCHANEEPORN CHAIMING

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH)
MAJOR IN PUBLIC HEALTH NURSING
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

2005

ISBN 974-04-6123-9

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

การถูกระทำรุนแรงโดยผู้ปกครอง ต่อผลทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ในเด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (CHILD ABUSE BY FAMILY CAREGIVERS AND
PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL, AND BEHAVIORAL HEALTH CONSEQUENCES
AMONG 7th-9th GRADERS)

รัชนีพร ไชยมิ่ง 4336063 PHPH/M

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : สมพร เตรียมชัยศรี, Ph.D., อภาพร เผ่าวัฒนา,
Ph.D.(NURSING), ขวัญใจ อานาจสัตย์เชื้อ, Ph.D. (NURSING)

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราความชุกของการกระทำ ความรุนแรงในเด็ก และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้ดูแลเด็กในครอบครัว ครอบครัว และของเด็ก กับการกระทำ ความ
รุนแรงในเด็ก โดยผู้ดูแลในครอบครัว ซึ่งทำการศึกษาในประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กรุงเทพฯ จำนวน 350 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระหว่างวันที่ 14 - 28 กันยายน 2545 ซึ่งเครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ แบบสอบถามข้อมูลจากเด็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลจากการวิจัยพบว่า เด็กร้อยละ 88.0 ถูกกระทำรุนแรงโดยผู้ดูแลในครอบครัว รูปแบบของการกระทำ
รุนแรงที่พบมากที่สุด ด้านร่างกาย คือ ตีหรือทุบด้วยมือ ด้านจิตใจ คือ คำว่าคำข่มขู่ และ การทอดทิ้ง
ละเลย คือ ไม่สนใจดูแลเรื่องการได้รับประทานอาหารของเด็ก โดยผลทางด้านสุขภาพต่อเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง
นั้น ด้านร่างกายที่พบมากที่สุดคือ บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีรอยหรือบาดแผล ในด้านจิตใจพบว่า เด็กส่วนใหญ่
เสียใจ และข้อคำถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ตนเองไม่สำคัญ ไม่เด่นในชั้นเรียน
ในผลด้านพฤติกรรมพบว่า ข้อคำถามความก้าวร้าวของเด็กที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เด็กได้กลับอย่างเดียวกันกับผู้
ที่มาข่มขู่ด้วย และพบว่ามีเด็กร้อยละ 34.7 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ 19.5 ใช้สารเสพติด จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูล การกระทำรุนแรงเด็กมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามความแตกต่างของ อาชีพ เพศ
ผู้ดูแลเด็กในครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ดูแลเด็กในครอบครัว สถานภาพสมรส การดื่มแอลกอฮอล์ การ
เล่นการพนันของผู้ดูแลเด็กในครอบครัว (p -value < 0.05) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำรุนแรง
เด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว และภาวะวิกฤตในครอบครัว (p -value < 0.01)

ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ให้ข้อเสนอแนะสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ ซึ่งควรตระหนักถึงปัญหาการกระทำ
รุนแรงในเด็ก โดยการเยี่ยมบ้าน การให้คำปรึกษา การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กในครอบครัว รวมถึงการส่งเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นแนวทางที่สามารถจะลดการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว รวมถึงลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดังกล่าว และตัดวงจรการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัวได้

**CHILD ABUSE BY FAMILY CAREGIVERS AND PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL,
AND BEHAVIORAL HEALTH CONSEQUENCES AMONG 7th – 9th GRADERS**

RATCHANEEPORN CHAIMING 4336063 PPH/M

M.Sc.(PUBLIC HEALTH) MAJOR IN PUBLIC HEALTH NURSING

THESIS ADVISOR : SOMPORN TRIAMCHAISRI, Ph.D.,
ARPAPORN POWWATTANA, Ph.D.(NURSING),
KWANJAI AMNATSATSUE, Ph.D.(NURSING)**ABSTRACT**

This descriptive research aimed to determine the prevalence of child abuse and related factors concerning family caregivers, family, children, and elaborate the health consequences in children. The sample consisted of 350 students studying in 7th-9th grade in Bangkok Metropolis. They were selected by multistage random sampling method. Data were collected from 14th to 28th September 2002. The instrument in this study was a questionnaire which included characteristics of children and family caregivers; family type; family relationship; family crisis; child physical, emotional, and neglected abuse; and the physical, psychological, and behavioral health consequences in abused children. The data analysis was performed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's Product Moment Correlation Coefficient, t-test, and One-way ANOVA.

Results revealed that 88.0 percent of the children were abused by their family caregivers. The most common form of physical abuse by family caregivers was spanking with the bare hand/hitting with a fist. The most common form of emotional abuse was scolding with rude language, and of neglect was inattention to provide necessary food, or lack of appropriate supervision. In physical consequence, the most common form of injury/physical complaints in abused children was minor injury and no lesion. Regarding psychological consequences, the most reported emotional complaint was sadness, and the lowest mean score item in child self-esteem was unpopular in class ($X = 2.88$, $S.D. = 1.01$). Regarding behavioral consequences, the highest mean score item of child aggression was reflection in the same manner ($X = 1.21$, $S.D. = 0.94$). 34.7 percent of abused children drank alcohol and 19.5 percent of them experienced substance use. Among child abuses, there were significant differences in factors of family caregivers, including gender, occupation, educational level, marital status, alcohol consumption, and gambling (p -value < 0.05). The significant factors correlated to child abuse included family relationship and family crisis (p -value < 0.01).

It is suggested that health professionals should raise awareness and concern of child abuse problems. Interventions, including home visiting, counseling, educating family caregivers, and promoting family relationships could be an effective strategy to reduce child abuse, risks, and eliminate a cycle of violence in a family.

KEY WORDS : FAMILY CAREGIVER / CHILD ABUSE / HEALTH CONSEQUENCES

94 P. ISBN 974-04-6123-9