

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2555

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

THE QUALITY OF LIFE OF STROKE PATIENTS IN LANGSUAN DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE

ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ 5338847 PHMP/M

ส.ม.

คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : อรุณ ภาชีน, Dr.P.H., นวีวรรณ บุญสุยา, M.S.P.H.

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วย จำนวน 90 คน ประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบสอบถามเอสเอฟ-36 ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบถอยหลัง

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.2 และร้อยละ 32.1 มีคุณภาพชีวิตในระดับต่ำ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ( $p < .05$ ) ได้แก่ กลุ่มอายุ สถานะการทำงาน สถานะในครอบครัว ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลและแรงสนับสนุนจากบุคคลากรสุขภาพ โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 55.6 ( $R^2 = 0.556$ ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระตุ้นให้มีการเพิ่มความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต/โรคหลอดเลือดสมอง/การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน/การรับรู้ความสามารถในการดูแล/แรงสนับสนุนทางสังคม

93 หน้า

THE QUALITY OF LIFE OF STROKE PATIENTS IN LANGSUAN DISTRICT,  
CHUMPHON PROVINCE

SAKSIT MAHARATTANAWONG 5338847 PHMP/M

M.P.H.

THEMATIC PAPER ADVISORY COMMITTEE: ORANUT PACHEUN, Dr.P.H,  
CHAWEEWON BOONSHUYAR, M.S.P.H.

ABSTRACT

This cross-sectional study aimed to assess quality of life of stroke patients in Langsuan District, Chumphon Province and its related factors. The sample consisted of 90 respondents. Data were collected using an interview form and quality of life was assessed using the SF-36 rating scale. Descriptive statistics, one- way ANOVA, Pearson product- moment correlation, and backward multiple regression were applied for the analysis.

The results showed that 51.2% of stroke patients had an overall quality of life at a moderate level, while 32.1% were at a low level. One- way ANOVA showed age, working status, status in the family, ability to perform daily living activities, and perceived capability of care giver were statistically related to quality of life. Backward multiple regression showed that the ability to perform daily living activities, and perceived capability of care giver had a positive relationship to quality of life while social support from health professional had a negative relationship to quality of life. These variables could explain the variation, 55.6 % (  $R^2=0.556$ ) of the quality of life among stroke patients .It is recommended that strengthening the capability of care givers should be encouraged.

KEY WORDS: QUALITY OF LIFE/STROKE/ DAILY LIVING ACTIVITY/  
PERCEIVED CAPABILITY OF CARE GIVER/SOCIAL SUPPORT

93 pages