

ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการทำนาย
ความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น



พรรณทิพา บัวคล้าย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2557

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
PERSONAL FACTORS AND SOCIAL SUPPORT IN PREDICTING INTIMATE PARTNER
VIOLENCE AMONG PREGNANT ADOLESCENTS

พรรณทิพา บัวคล้าย 5337327 NSAM/M

พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: นันทนา ธนาโนวรรณ, Ph.D. (Nursing), นิตยา สิ้นสุกใส,
Ph.D. (Nursing), นพพร ว่องสิริมาศ, Ph.D. (Nursing)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจทำนายของปัจจัยส่วนบุคคล (ประวัติการได้รับความรุนแรงในวัยเด็ก การใช้สารเสพติด อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำนวนคู่นอน) และการสนับสนุนทางสังคมต่อการได้รับความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรส กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 4 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก จำนวน 151 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอด แบบคัดกรองความรุนแรงและแบบวัดความช่วยเหลือทางสังคมแบบพหุมิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยโลจิสติก

ผลการวิจัยพบว่า ประวัติการได้รับความรุนแรงในวัยเด็ก การใช้สารเสพติด อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำนวนคู่นอน และการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ร้อยละ 14.1 ($R^2 = 0.141$, $p < .05$) การใช้สารเสพติดสามารถทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสได้ 2.628 เท่า และการสนับสนุนทางสังคมสามารถทำนายได้ 0.958 เท่า

ผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรคัดกรองการใช้สารเสพติดและการสนับสนุนทางสังคมในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ทุกรายเพื่อให้การดูแลและสืบค้นเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสต่อไป

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล / การสนับสนุนทางสังคม / สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น / ความรุนแรง

PERSONAL FACTORS AND SOCIAL SUPPORT IN PREDICTING INTIMATE PARTNER VIOLENCE AMONG PREGNANT ADOLESCENTS

PANTIPA BUAKHAI 5337327 NSAM/M

M.N.S. (ADVANCED MIDWIFERY)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: NANTHANA THANANOWAN, Ph.D. (NURSING),
NITTAYA SINSUKSAI, Ph.D. (NURSING), NOPPORN VONGSIRIMAS, Ph.D. (NURSING)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the relative contribution of personal factors (history of child abuse, substance abuse, age at having first sexual intercourse, number of partners), and social support regarding intimate partner violence among pregnant adolescents. The sample comprised of 151 pregnant adolescents in antenatal clinics in 4 hospitals in Phitsanulok, Kamphaengphet and Tak Provinces. The instruments used to collect data include the Demographic Data Questionnaire, Pregnancy and Delivery Data Record, the Abuse Assessment Screen, and a Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Data were analyzed by descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation and logistic regression.

The results reveal that history of child abuse, substance abuse, age at having first sexual intercourse, number of partners and social support can explain 14.1% of variance in intimate partner violence ($R^2 = 0.141$, $p < .05$) among pregnant adolescents. Substance abuse can predict intimate partner violence about 2.628 occasions and social support can predict 0.958 occasions.

The results suggest that nurses should screen for substance abuse and social support in all pregnant adolescents in order to study intimate partner violence.

KEY WORDS: PERSONAL FACTORS / SOCIAL SUPPORT / PREGNANT ADOLESCENTS / INTIMATE PARTNER VIOLENCE

121 pages