

ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน
จากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภาวะแทรกซ้อน
และความพึงพอใจของผู้ป่วย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2558

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภาวะแทรกซ้อน และความพึงพอใจของผู้ป่วย

EFFECT OF TRANSITIONAL CARE PROGRAM FOR STROKE PATIENTS AND FAMILY
CAREGIVERS ON PATIENT' S ACTIVITIES OF DAILY LIVING, COMPLICATIONS, AND
SATISFACTION

วาสนา มุลลิจี 5436801 RAAN/M

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : : สุปรีดา มั่นคง, Ph.D. (GERONTOLOGICAL NURSING)

ยุพาพิน ศิริโพธิ์งาม, D.S.N. (ADULT HEALTH NURSING), สิริรัตน์ ลีลาจารย์, Ph.D. (NURSING)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความสามารถการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภาวะแทรกซ้อนและความพึงพอใจของผู้ป่วย โดยใช้กรอบแนวคิดของเนลเลอร์ (Naylor, 2004) ร่วมกับการนำญาติมาเป็นส่วนร่วมในการดูแล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลจำนวน 60 คู่ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คู่และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คู่ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองได้รับการดูแลปกติร่วมกับการดูแลด้วยโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน แบบประเมินภาวะแทรกซ้อน และแบบประเมินความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย สถิติที และไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) ส่วนภาวะแทรกซ้อนพบว่าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม ด้านความพึงพอใจของผู้ป่วย พบว่า คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$)

จากผลการวิจัยโปรแกรมนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน

คำสำคัญ: โปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ญาติผู้ดูแล / ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน / ภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจ / โรงพยาบาล / บ้าน

EFFECT OF TRANSITIONAL CARE PROGRAM FOR STROKE PATIENTS AND FAMILY CAREGIVERS ON PATIENT'S ACTIVITIES OF DAILY LIVING, COMPLICATIONS, AND SATISFACTION

WASANA MOONTHEE 5436801 RAAN/M

M.N.S. (ADULT NURSING)

THESIS ADVISORY COMMITTEE :SUPREEDA MONKONG, Ph.D. (GERONTOLOGICAL NURSING), YUPAPIN SIRAPO-NGAM, D.S.N. (ADULT HEALTH NURSING), SIRIRAT LEELACHARAS, Ph.D. (NURSING)

ABSTRACT

The purpose of this quasi-experimental research was to ascertain the effect of transitional care program for stroke patients and family caregivers on patient's activities of daily living, complications, and satisfaction. The conceptual framework of the study was derived from the Naylor's Transition Care Model and family participation. The purposive sample consisted of sixty dyads of acute ischemic stroke patients and their family caregivers. The subjects divided equally between the control group and experimental group. The control group received only conventional nursing care, whereas the experimental group received conventional nursing care coupled with the transitional care program for stroke patients and family caregivers. Data were obtained from semi-structured interview by using questionnaires: the demographic data, the patient's activities of daily living, the patient's complications, and the patient's satisfaction. The data were analyzed using descriptive statistic, Chi-square test, and dependent t-test.

The finding of this study revealed that at the one month after patient discharge, the mean scores of patient's activities daily living and the patient's satisfaction of the subject in experimental group were statistically significantly higher than those of the control group ($p < .05$), the patients all group are no complications.

As for the implication of study, it could be used as guideline for acute ischemic stroke patients during transition from hospital to home.

KEY WORDS: TRANSITIONAL CARE PROGRAM / STROKE PATIENTS / FAMILY CAREGIVERS / ACTIVITIES OF DAILY LIVING / COMPLICATIONS / SATISFACTION / HOSPITAL / HOME

139 pages

Copyright by Mahidol University