

การถูกระทำความรุนแรงในคู่รักและปัญหาสุขภาพของกลุ่มชายรักชาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2560

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การถูกระทำความรุนแรงในคูรัักและปัญหาสุขภาพของกลุ่มชายรัักชายในเขตกรุงเทพมหานคร
 INTIMATE PARTNER VIOLENCE VICTIMS AND HEALTH PROBLEMS AMONG MEN WHO
 HAVE SEX WITH MEN IN BANKOK, THAILAND

อัญญา ลีญา 5637727 PHCN/M

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: นฤมล เอื้อมณีกุล, Ph.D. (NURSING), วันเพ็ญ แก้วปาน, Dr.P.H. (PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION), อภาพร เผ่าวัฒนา, Ph.D.(NURSING),ปรารธนา สถิตย์วิภาวี, Ph.D. (PUBLIC HEALTH)

บทคัดย่อ

ปัญหาการถูกระทำความรุนแรงจากคูรัักในกลุ่มชายรัักชายเป็นปัญหาสำคัญ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถูกระทำความรุนแรง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และปัจจัยทำนายการถูกระทำความรุนแรงจากคูรัักและปัญหาสุขภาพของกลุ่มชายรัักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มชายรัักชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้วิธีการสุ่มแบบลูกโซ่ จำนวน 382 คน เก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติไคสแควร์ ค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ และสถิติการถดถอยโลจิสติก

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยถูกระทำความรุนแรงด้านจิตใจมากที่สุด (ร้อยละ 77.5) รองลงมาคือด้านร่างกาย (ร้อยละ 58.1) และน้อยที่สุดคือด้านเพศ (ร้อยละ 57.3) ปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิตที่พบมากที่สุดคือมีความรู้สึกเครียดและวิตกกังวล (ร้อยละ 45.5) และเคยเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 34.8) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการถูกระทำความรุนแรงจากคูรัักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p\text{-value} < 0.05$) ได้แก่ อายุ (OR=3.00, 95%CI 1.43-6.29) ระดับการศึกษา (OR=1.92, 95%CI 1.12-3.30) รายได้ (OR=2.52, 95%CI 1.46-4.37) และการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (OR=2.14, 95%CI 1.23-3.72) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า อายุ ทักษะคิดเชิงบวกต่อความรุนแรงในคูรััก การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลรักร่วมเพศ และรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ระดับต่ำ สามารถร่วมทำนายการถูกระทำความรุนแรงจากคูรัักได้

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมนโยบาย และจัดทำโครงการป้องกันการถูกระทำความรุนแรงจากคูรัักในกลุ่มชายรัักชายที่เริ่มจากพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในระดับครอบครัว และการยุติการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลรักร่วมเพศในระดับชุมชนและสังคม

คำสำคัญ : ความรุนแรงในคูรััก/ ปัญหาสุขภาพ/ ชายรัักชาย

INTIMATE PARTNER VIOLENCE VICTIMS AND HEALTH PROBLEMS AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN BANGKOK, THAILAND

AJCHARA SEEYA 5637727 PHCN/M

M.N.S. (COMMUNITY NURSE PRACTITIONER)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: NARUEMON AUEMANEEKUL, Ph.D. (NURSING), WONPEN KEAWPAN, Dr.P.H. (PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION), ARPAPORN POWWATTANA, Ph.D. (NURSING), PRATANA SATITVIPAWEE, Ph.D. (PUBLIC HEALTH)

ABSTRACT

This research was a cross – sectional study aimed to examine prevalence, correlated factors and predictive factors of intimate partner violence (IPV) victims and health problems among men who have sex with men (MSM) in Bangkok, Thailand. The samples were 382 MSM greater than or equal to 18 years of age, resident of the Bangkok metropolitan recruited by snowball sampling technique. The data were collected in 8 weeks, by a set of self – administered questionnaires, and they were analyzed using descriptive statistics, Chi – square, Odds ratio and Binary Logistic Regression Analysis.

Overall, the participants reported emotional/ verbal abuse 77.5%, physical abuse 58.1% and sexual abuse 57.3%. The study also found stress and anxiety (45.5%) and STDs (34.8%) among the participants due to violence. The factors correlated to IPV victims with significant statistically (p -value<0.05) as age (OR=3.00, 95%CI 1.43-6.29), education (OR=1.92, 95%CI 1.12–3.30), incomes (OR=2.52, 95%CI 1.46–4.37) and neglectful parenting style (OR=2.14, 95%CI 1.23–3.72). In addition binary logistic regression statistics revealed that lower age, positive attitude toward IPV, lower authoritative parenting style and perception of homophobic discrimination can predict IPV among MSM victims.

Recommendation from the results of the study may be used a basis for policy advocacy and create the programs for preventing violence against homosexual and should be support authoritative parenting and good attitude in family level and anti – homophobic discrimination in community and society level in the future.

KEY WORDS: INTIMATE PARTNER VIOLENCE/ HEALTH PROBLEM/ MEN WHO HAVE SEX WITH MEN

181 pages