

ปัจจัยทำนายนการเลือกใช่วิธีการคุมกำเนิดระยะยาวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
ที่มารับการคุมกำเนิด



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2559

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยทำนายการเลือกใช่วิธีการคุมกำเนิดระยะยาวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่มารับการคุมกำเนิด
FACTORS PREDICTING LONG-ACTING REVERSIBLE CONTRACEPTION USE IN
POSTPARTUM ADOLESCENT MOTHERS RECEIVING CONTRACEPTION

เด่นละออง นาเสงี่ยม 5437230 NSAM/M

พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: นิตยา สีนสุกใส, Ph. D. (NURSING), จรรยา เจริญสุข, Ph. D. (NURSING), กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์, (M. D., Msc.)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive study) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของ ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การได้รับความรุนแรงจากคู่สมรส และการสนับสนุนทางสังคม ต่อการเลือกใช่วิธีการคุมกำเนิดระยะยาวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่มารับการคุมกำเนิด ที่หน่วยอนามัยเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาวัยรุ่นอายุ 12-19 ปี จำนวน 96 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า แบบคัดกรองความรุนแรง แบบวัดความช่วยเหลือทางสังคมแบบพหุมิติ และแบบสอบถามการคุมกำเนิดหลังคลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การได้รับความรุนแรงจากคู่สมรส และการสนับสนุนทางสังคม ไม่สามารถทำนายการเลือกใช่วิธีการคุมกำเนิดระยะยาวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดได้ ($p > .05$) พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.9 เลือกใช้การฝังยาคุมกำเนิด เนื่องจากได้รับคำแนะนำ และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่มีสุขภาพ ทั้งในระยะฝากครรภ์ และภายหลังคลอด

ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรที่จะมีการศึกษาติดตามการใช่วิธีการคุมกำเนิดระยะยาวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดตั้งแต่อยู่ที่หอผู้ป่วยหลังคลอด

คำสำคัญ : ปัจจัย/ มารดาวัยรุ่นหลังคลอด / ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด / ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด / ความรุนแรงจากคู่สมรส / วิธีการคุมกำเนิดระยะยาว

**FACTORS PREDICTING LONG-ACTING REVERSIBLE CONTRACEPTION
USE IN POSTPARTUM ADOLESCENT MOTHERS RECEIVING
CONTRACEPTION**

DENLAONG NASA-NGIEM 5437230 NSAM/M

M.N.S. (ADVANCED MIDWIFERY)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: NITTAYA SINSUKSAI, Ph. D. (NURSING),
JANYA CHAROENSUK, Ph. D. (NURSING), KITIRAT TECHATRAISAK,
M.D., M.sc.

ABSTRACT

The present study was a descriptive study aimed at investigating the predictive power of knowledge about contraception, postpartum depression, domestic violence, and social support on long-acting reversible contraception use in postpartum adolescent mothers receiving contraception at Siriraj Hospital. The participants consisted of 96 postpartum adolescent mothers. Six instruments were used to collect data, including; the demographic characteristics questionnaire, the knowledge about contraception questionnaire, the The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, the Abuse Assessment Screen, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and a postpartum contraception use questionnaire. Percentage, mean, standard deviation and logistic regression analysis were used to analyze data. The finding revealed that knowledge about contraception, postpartum depression, domestic violence, and social support could not predict long-acting reversible contraception use in the postpartum adolescent mothers ($p > 0.05$). The results also revealed that 72.9% of the participants used contraceptive implants due to receiving suggestions and support from health care team both pre and post – natal. Therefore, further study should follow the long-acting reversible contraception use in postpartum adolescent mothers while they are in postpartum ward.

**KEY WORDS : FACTORS / POSTPARTUM ADOLESCENT MOTHERS /
KNOWLEDGE ABOUT CONTRACEPTION / POSTPARTUM
DEPRESSION / DOMESTIC VIOLENCE / LONG-ACTING
REVERSIBLE CONTRACEPTION.**