

**STIGMA AND DISCRIMINATION OF METH USERS:
A CASE STUDY OF A PROVINCE IN CENTRAL
THAILAND**



LAMPUAN JAISAN

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
(ADDICTION STUDIES)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

Copyright by Mahidol University

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

STIGMA AND DISCRIMINATION OF METH USERS: A CASE STUDY OF A PROVINCE IN CENTRAL THAILAND

LAMPUAN JAISAN 5737491 ADAD/M

M.A. (ADDICTION STUDIES)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: BANG-ON THEPHTHIEN, Ph.D.,
NATE HONGKRAILERT, Ph.D.**ABSTRACT**

This was a descriptive research whose objectives were to study the general information, stigma, discrimination and to compare stigma, discrimination and the population characteristics. A sample of 950 individuals from the general public considered to be carriers and meth users, aged from 18-65 years, were selected using simple random sampling and systematic sampling. Data were collected by questionnaires between 4 January 2016 and 31 March 2016 and analyzed using SPSS Version 21 and presented in percentage, mean and standard deviation. The information characteristic of stigma and discrimination was analyzed using descriptive statistics and displayed in range, minimum, average and standard deviation. Data distribution, stigma and discrimination were analyzed through Kolmogorov - Simonov test and to compare the mean score of stigma and discrimination, bio-social T-test and Mann-Whitney U test were used. The results of the study were divided into three general groups: individuals and families in the community who abuse, amphetamines were mostly females. The average age was over 44 year's old with elementary school level of education. Service providers were mostly female, average age 44, who graduated from high school. Both groups mostly did not drink alcohol and did not smoke. The amphetamine users were almost entirely male. The Mean age was 31 years who completed primary and secondary education in the same proportion, first started using amphetamine at the average age of 23 years along with other amphetamine. The results also showed that stigma and discrimination was more felt from service providers and law enforcement than the other groups. Those who used drugs including, amphetamines, stigma and discrimination against their own were quite a few. The groups did not differ much. The study compared the stigma and discrimination in the social life of the group and the people in the community, females suffered from stigma and discrimination more than men. Among those who do not smoke, it was found that stigma and discrimination was higher than those who smoke. Meanwhile, the family of the amphetamine users, those with a secondary education suffered stigma and discrimination than those with primary education. The majority in the amphetamine group who were affected by stigma and discrimination were male than females. Therapies were found to differ, treatment with medication did not suffer stigma and discrimination against themselves rather than receive medication alone. This study considered reflections views, attitudes, stigma and discrimination of those involved in drug use the society

KEY WORDS: STIGMA / DISCRIMINATION / METH USER

140 pages

การตีตราและการเลือกปฏิบัติของผู้ใช้ยาเสพติด : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง, ประเทศไทย
 STIGMA AND DISCRIMINATION OF METH USERS: A CASE STUDY OF A PROVINCE IN CENTRAL THAILAND

ลำพวน ใจแสน 5737491 ADAD/M

ศศ.ม. (วิทยาการเสพติด)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : บังอร เทพเทียน, ปร.ด., เนตร หงษ์ไกรเลิศ, ปร.ด.

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ลักษณะการตีตราและการเลือกปฏิบัติ และเปรียบเทียบการตีตราและการเลือกปฏิบัติลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป ผู้ให้บริการ และผู้เสพยาบ้า มีอายุตั้งแต่ 18-65 ปี จำนวน 950 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และการสุ่มแบบเจาะจงในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ให้บริการ และใช้การสุ่มอย่างเป็นระบบในกลุ่มผู้เสพยาบ้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS Version 21 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลลักษณะการตีตราและการเลือกปฏิบัติใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าพิสัย ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลการตีตราและการเลือกปฏิบัติใช้สถิติ Kolmogorov - Simonov test และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตีตราและการเลือกปฏิบัติลักษณะทางชีวสังคมใช้สถิติ t-test และ Mann-Whitney U test ผลการศึกษาลักษณะทั่วไปแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนในชุมชนและครอบครัวผู้เสพยาบ้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 44 ปี จบระดับประถมศึกษา กลุ่มผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 44 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ และผู้เสพยาบ้าเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 31 ปี จบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกอายุเฉลี่ย 23 ปี มีการใช้สารเสพติดตัวอื่นร่วมกับการเสพยาบ้า และผลการศึกษาลักษณะการตีตราและการเลือกปฏิบัติพบว่า กลุ่มผู้ให้บริการที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมีการตีตราและการเลือกปฏิบัติมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนผู้เสพยาบ้ามีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อตนเองค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอื่นไม่แตกต่างกันมากนัก และผลการศึกษาเปรียบเทียบการตีตราและการเลือกปฏิบัติในลักษณะทางชีวสังคมของแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มประชาชนในชุมชนที่เป็นเพศหญิงมีการตีตราและการเลือกปฏิบัติมากกว่าเพศชาย และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มีการตีตราและการเลือกปฏิบัติมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ ส่วนกลุ่มครอบครัวของผู้เสพยาบ้าพบว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการตีตราและการเลือกปฏิบัติมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และกลุ่มผู้เสพยาบ้าที่เป็นเพศชายมีการตีตราและการเลือกปฏิบัติมากกว่าเพศหญิง และการบำบัดรักษาที่ได้รับต่างกันพบว่า การบำบัดรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยา มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อตนเองมากกว่าการได้รับยาเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นมุมมองทัศนคติการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสังคมและผู้เสพยา