



ท.002821

ผลการเตรียมคลอดควยวิธีของลามาดอ
พดดิกรรมาการ เชนิณความเจีบปากของมารดาในระยะ
คลอดและสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาและทารก
The Effect of Lamaze Method for
Childbirth on Pain Coping During Labour and
Maternal-Newborn Attachment

นางสาวรสสุคนธ์ ลิ้มทะวงศ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2530

ISBN 974 - 586 - 200 - 2

© สงวนลิขสิทธิ์

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก China Medical Board of New York, Inc..

อธินันทนากการ

จาก

นักทอสนพุด ม.มหิดล

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผลการเตรียมคลอดด้วยวิธีของลามามาซตอพติกรรมการเผชิญ
ความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอด และสัมพันธ์ภาพ
ระหว่างมารดาและทารก

นักศึกษา

นางสาวรสสุคนธ์ ลิ้มทะวงศ์

ระดับปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)

สาขาวิชาเฉพาะ

การพยาบาลแม่และเด็ก

สถาบัน

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร. กอบกุล พันธุ์เจริญวรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอัยก อูมรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ

วัน เดือน ปี

8 มิถุนายน 2530

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลการเตรียมคลอดด้วยวิธีของลามามาซตอพติกรรมการเผชิญต่อความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอดและสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาและทารก กลุ่มตัวอย่าง เป็นหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์และมาคลอดที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ จำนวน 40 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง หมายถึงกลุ่มที่ได้รับการเตรียมคลอดด้วยวิธีของลามามาซตอพติการผู้วิจัยตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ กลุ่มควบคุม หมายถึงกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติจากเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยประเมินพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอดและสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาและทารกในระยะหลังคลอด โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญ

ความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอด และแบบวัดกับแบบสังเกตพฤติกรรมสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาและทารก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองใช้การทดสอบที (T-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอดของผู้คลอดที่ได้รับการเตรียมคลอดด้วยวิธีของลามาสสูงกว่่าผู้คลอดที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .001$)
2. คะแนนสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาและทารกของผู้คลอดที่ได้รับการเตรียมคลอดด้วยวิธีของลามาสสูงกว่่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .001$)

Thesis Title The Effect of Lamaze Method for Childbirth on
Pain Coping During Labour and Maternal-Newborn
Attachment.

Author Miss Rossukon Limtavong

Degree Master of Science (Nursing)

Nursing Specialty Maternal and Child Health Nursing.

Institute Graduate Study Program, Faculty of Nursing.
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

Major Advisor Dr. Kobkul Phancharoenworakul

Co-Advisor Assistant Professor La-iad Udomratana
Assistant Professor Kaimook Wichiencharoen

Date of Graduate June 8, 1987

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of Lamaze method for childbirth on pain coping during labour and maternal-newborn attachment. Quasi-experimental design was used. The sample was composed of 40 primigravidas, who attended at prenatal clinic and admitted at Labour and Delivery Unit in Maharaj-Nakorn-Chiangmai hospital. They were selected by the purposive sampling technique and equally assigned into either control or experimental groups. There were 20 subjects in each group. The experimental group received Lamaze method for childbirth preparation during prenatal period from the researcher, whereas the control group received the routine care

procedure from nursing personnel. Each subject was observed pain coping behavior during labour. Maternal-newborn attachment behavior was observed by the researcher within 48 hours after delivery, and each subject was also requested to complete maternal-newborn attachment questionnaire. Data was analyzed by using t-test.

The result showed that there were statistically significant differences in pain coping behavior during labour and in maternal-newborn attachment between the experimental group and control group ($P < .001$)