

ท.000717



ความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

Patients' Opinions Towards Health Information
Before Discharge from Ramathibodi Hospital

นางสาวสรายุจิตต์ กาญจนภา

อธิบดี

จาก


มีมติที่ประชุมที่... มติที่ประชุมที่...

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2528



ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากรายได้คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

1. ความคิดเห็นของผู้ป่วยด้านการได้รับคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำแนกตามแผนก พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ร้อยละ 20.60 - 31.82 จำนวนผู้ที่เข้าใจคำแนะนำดังกล่าวร้อยละ 38.83 - 58.19 และจำนวนผู้ที่เห็นความสำคัญของคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ร้อยละ 85.88 - 88.89 และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าแผนก นรีเวชกรรม เป็นแผนกที่ได้รับ มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมากที่สุด


2. ความคิดเห็นของผู้ป่วยด้านการได้รับ ความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำแนกเป็นรายข้อระหว่างแผนกและระหว่างระดับอายุ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ ระดับการศึกษา ศาสนา รายได้ ครอบครัว ภูมิภาค พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน

3. ความคิดเห็นของผู้ป่วยด้านการได้รับ ความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำแนกเป็นรายข้อ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพสมรส และเปรียบเทียบระหว่างจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าความคิดเห็นด้านการได้รับและความเข้าใจไม่มีความแตกต่างกัน แต่ความคิดเห็นด้านความสำคัญนั้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 - .001

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับและความเข้าใจของคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำแนกเป็นรายหมวด และแผนกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับและการเห็นความสำคัญของคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำแนกเป็นรายหมวด และแผนกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.001

6. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของคำแนะนำ
ก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำแนกเป็นรายหมวด 5 หมวด พบว่าคำแนะนำ
3 หมวดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อจำแนกตามแผนกที่ผู้ป่วย
เข้าพักรักษาตัว พบว่า 3 ใน 4 แผนก ผู้ป่วยมีความคิดเห็นด้านความเข้าใจและการ
เห็นความสำคัญไม่มีความสัมพันธ์กัน



Thesis Title Patients' Opinions Towards Health
Information before Discharge from
Ramathibodi Hospital

Author Miss Sarachit Kanjanabha

Degree Master of Science (Nursing)

Nursing Specialty Ambulatory Nursing Care

Institute Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Major Advisor Assistant Professor Suntaree Panuthat

Co-Advisor Assistant Professor Yuwadee Luecha
Assistant Professor Prapai Burintramart

Date of Graduation 20 November 1985

Abstract

The purposes of this study were to explore the patients' opinions towards the health information before discharging from the hospital in three aspects : receiving, understanding and recognizing the importance of the health information. Data was collected from six hundred patients in four departments : Surgical, Medical, Gynaecological and Eye, Ear Nose and Throat departments in Ramathibodi Hospital. Each item concerning health information of individual aspect of opinions was compared among departments, socio-demographic factors and numbers of admissions. The relationships of these three aspects were analyzed in relation to groups of health information in each department by Chi-Square Test. The data was

collected by interviewing. The results of this study were as follows :

1. The patients' opinions towards receiving health information were compared among four departments. It was found that the percentage of patients who received health information are varried from 20.62 to 31.82 and their understanding were at 38.83 - 58.19 percentage, but the recognition of its inportance were at 85.88 - 88.89 percentage. Among than the gynaecological patients were at the highest percentage in all aspects.

2. Each aspect of opinions at 0.05 level was significantly different when comparing among four departments and range of ages. But there was no significantly different when comparing among various socio-demographic factors.

3. At 0.05 - .001 level, there was no significantly different between two aspects of opinions towards receiving and understanding of health information, when comparing to different marital status and the number of admissions. But the other aspect was significantly different.

4. Significant relationship between two aspects of opinions of receiving and understanding regarding health information, when categorize into groups of receiving activities and departments was at 0.001 level.

5. Significant relationship between two aspects of opinions, receiving and recognizing the importance of health information, was found when classify by groups health information and by departments at 0.01 and 0.001 levels respectively.

6. There was significant relationship between two aspects of understanding and recognizing the importance of health information in 3 out of 5 groups of health information. But there was no significant relationship between these two aspects in 3 out of 4 departments.