



27 ซี.ศ. 2532

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและจิตสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF PHYSICAL AND
PSYCHOSOCIAL CHANGE AND SELF CARE BEHAVIOR
IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER

นาลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2531

อธิบดี

จาก

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

15505

Copyright by Mahidol University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่บริเวณศีรษะและคอ
ผู้วิจัย	นางสาว นวลชนันธุ์ ลิ้มประเสริฐ
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ระเบียบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรณีย์ สัตยวัณณ์
วันที่สำเร็จการศึกษา	10 พฤศจิกายน 2530

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง หรือหนึ่งศึกษาปัจจัยทางด้านอายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และระยะเวลาที่เป็นโรค ที่มีผลต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จิตสังคม และการดูแลตนเอง

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสี ณ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามธิบดี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 100 ราย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย แบบสัมภาษณ์การรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตสังคม การดูแลตนเองทางกายภาพและจิตสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จิตสังคม กับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อย่างมีนัยสำคัญ ($P < .001$) ผู้ป่วยที่มีอายุและระยะเวลาของการป่วยเป็นโรคแตกต่างกัน มีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจิตสังคมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญ ($P < .05$) และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P < .01$ และ $P < .05$ ตามลำดับ) ส่วนผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จัดสิ่งคมไม่แตกต่างกัน ($P > .05$) และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่แตกต่างกัน ($P > .05$)



Thesis title : Study of the relationship between Perception
of Physical and psychosocial change and Self
Care behavior in patients with head and neck
cancer

Author : Miss Nuankanit Limpanavas

Degree : Master of Science (Nursing)

Thesis Supervisory : Assistant Professor Dr. Tassana Boontong
Committee : Assistant Professor Pensri Rabiab
Assistant Professor Wannee Satayawiwat

Date of Graduation : November 10, 1987

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the relationship between perception of physical, psychosocial change and self care behavior in patients with head and neck cancer. Some factors influencing the perception of physical psychosocial change and self care behavior, i.e., age, education, economic status, and duration of sickness were also studied in this study.

The sample was composed of 100 patients admitting in Siriraj hospital, Ramathibodi hospital, and the National Cancer Institute. The questionnaire included the demographic data, and data concerning the perception of physical psychosocial change and self care be-

havior. Data were analysed by using Pearson product moment correlation coefficient and one way analysis of variance.

The result showed that perception of physical-psychosocial change had a positively statistical correlation with self care behavior ($P < .001$).

There were statistically significant difference of perception of physical and psychosocial change among groups who were different in age, duration of sickness at the .05 level. This perception of change was, however, not correspondent to education and economic status of patients. ($P > .05$). Considering the self care behavior, it was found that there were statistically significant differences of self care behavior among patients who were different in age and duration of sickness ($P < .01$ and $P < .05$) Nevertheless, there was no statistically significant differences of patients' self care behavior who were different in education and economic status.