

27 ส.ย. 2528

มาตรฐานการพยาบาลในห้องฟื้น  
สำหรับผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย  
Establishment of a Standard Postoperative Care  
Under General Anesthesia in Recovery Room



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคำหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2528	
กองห้องสมุด	

17115

Copyright by Mahidol University

- เรื่อง : มาตรฐานการพยาบาลในท้องพักพื้นสำหรับผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย
- ผู้วิจัย : นางสาว เรณู อาจสาส์
- ระดับปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล)
- สาขา : การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
- คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้ควบคุมการวิจัย : รองศาสตราจารย์ สมพันธ์ พิญชีระนันท์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรณี สัตย์วิวัฒน์  
รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา ไก่สาสนนท์
- วันที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ : 25 พฤศจิกายน 2528

บทคัดย่อ

การศึกษารายการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างมาตรฐานการพยาบาลในท้องพักพื้นสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย การศึกษารายการนี้ผู้วิจัยได้สร้างมาตรฐานการพยาบาลโดยอาศัยหลักการจากการค้นคว้าและได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท้องพักพื้นจำนวน 33 ท่าน ตามเทคนิคเดลฟาย ผลของการวิจัยได้มาตรฐานการพยาบาลในท้องพักพื้นสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย รวมทั้งหมด 8 มาตรฐาน ซึ่งในแต่ละมาตรฐานการพยาบาลประกอบด้วยกิจกรรมการพยาบาลและผลของการพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยภายหลังได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานที่สร้างขึ้น ดังนี้

- มาตรฐานที่ 1 ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ
- มาตรฐานที่ 2 ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนโลหิต
- มาตรฐานที่ 3 ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท
- มาตรฐานที่ 4 ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะตกเลือด
- มาตรฐานที่ 5 ผู้ป่วยมีความสมดุลย์ของน้ำและอิเล็คโตรลัยท์
- มาตรฐานที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายและปลอดภัย
- มาตรฐานที่ 7 ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
- มาตรฐานที่ 8 ผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะย้ายออกจากท้องพักพื้น

ผู้วิจัยได้นำมาตรฐานการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ชำนาญการพยาบาลผู้ป่วย หลังผ่าตัดในท้องพักฟื้น จำนวน 67 ท่าน ไปปฏิบัติกับผู้ป่วยในท้องพักฟื้นตามมาตรฐานที่สร้างขึ้น เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานนี้ไปใช้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ผลของการสำรวจ พบว่ากิจกรรมการพยาบาลส่วนใหญ่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและของ กระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีส่วนน้อยของกิจกรรมการพยาบาลที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างของโรงพยาบาลแต่ละแห่งแตกต่างกันทั้งในด้าน เครื่องมือ เครื่องใช้และบุคลากร ในส่วนผลของการพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังได้รับการ พยาบาลตามมาตรฐานพบว่าในส่วนน้อยไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากภาวะสุขภาพและการ รักษาของผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน

Thesis Title : Establishment of a Standard Postoperative  
Care under General Anesthesia in Recovery  
Room

Author : Miss Ranoo Assalee


Degree : Master of Science (Nursing)

Department : Graduate Studies in Medical and Surgical  
Nursing

Faculty : Faculty of Graduate Studies,  
Mahidol University

Advisors : Associate Professor Sompan Hinjiranan  
Assistant Professor Wannee Satayawiwat  
Associate Professor Pricha Ophasanond, M.D.

Date of Graduation : November 25, 1985.



Abstract

The study was carried out with a view to establishing a standard postoperative care under general anesthesia in recovery room. They were formulated with nursing principles gained from documental research and the Delphi technique was used in the verification of the accuracy of the essence by 33 specialists in the field of patient care in recovery room. As a result, 8 standards of nursing care were obtained, each of which consisted of nursing activities and the effect expected on patients after being cared for in accordance with the formulated standard of nursing care. The 8 standards are as follow:-

- Standard 1      The patients were freed from the respiratory complication.
- Standard 2      The patients were freed from the cardiovascular complication.
- Standard 3      The patients were freed from the neurological complication.

- Standard 4 The patients were freed from the hemorrhage.
- Standard 5 The patients show fluid and electrolyte balanced.
- Standard 6 The promotion of comfort and safety for patients.
- Standard 7 The patients were fulfilled in psychosocial need.
- Standard 8 The patient was prepared to be transferred from the recovery room.

The complete standards of nursing care were presented to 67 recovery room nursing experts who were asked to experiment with them in order to study the feasibility of putting them into practical use in the real situation. The results of the survey showed that most of the designated nursing activities were applicable in central and rural hospitals of both the university hospital and the Ministry of Public Health. The minority of the nursing activities were impractical due to individual hospital structural differences in instruments and personnel. As for the expected effectiveness, only a minor portion failed to achieve the anticipated results, mainly due to the differences in each individual's treatment and health condition.