



๒ ๘ ส.ค. ๒๕๒๘

การศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างอัทึมโนทัศน์และปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู

A Study of The Relationship Between Self-Concept
Selected Factors and Self-Care in Epileptic Patients



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ทามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๒๗
กองห้องสมุด

17118

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอัครโมโนทันและปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู
- ผู้วิจัย : นางรัตนา มาศเกษม
- ระดับปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล)
- สาขา : การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะ : มัธยมศึกษาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้ควบคุมการวิจัย : รองศาสตราจารย์ สมพันธ์ ใหญ่ธีระเนมพน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิพนธ์ พวงวรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย สุขุมวิท วิจัยรเจริญ
- วัน เดือน ปี : 11 มีนาคม 2528

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอัครโมโนทันและปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู ชนิดชักทั้งตัว มีอาการเกร็งและหมดสติรวมทวย ที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยประสาทวิทยา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช รามาธิบดี และสถานีประสาทวิทยา จำนวน 100 คน เป็นชาย 50 คน หญิง 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัว แบบสัมภาษณ์ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง แบบสอบถามเกี่ยวกับอัครโมโนทันของเพนเนสส์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ พร้อมกับทดสอบค่าสถิติเอฟ และเลือกตัวทำนายที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์พหุคูณ ซึ่งใช้วิธี ฟอว์เวอร์ค อินคลูชัน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ ในด้านเอกลักษณ์ ด้านความพึงพอใจในตนเอง ด้านพฤติกรรม ด้านร่างกาย ด้านศีลธรรมจรรยา ด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว และด้านสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ส่วนปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ ในด้านวิพากษ์วิจารณ์ตนเองนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเอง

2. ปัจจัยด้านความบ่อยครั้งของการซัก มีความสัมพันธ์ทางลบกับการดูแลตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ปัจจัยด้านระยะเวลาของโรค ไม่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเอง

4. ปัจจัยด้านฐานะเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองกับ ตัวทำนายทั้ง 4 ตัว คือ อัตมโนทัศน์ ความบ่อยครั้งของการซัก ระยะเวลาการเป็นโรค และฐานะเศรษฐกิจ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มตัวทำนายที่ดีที่สุดประกอบด้วย ฐานะเศรษฐกิจ และอัตมโนทัศน์ ซึ่งกลุ่มตัวทำนายนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ ดูแลตนเองได้ร้อยละ 78.64

มีสมการทำนายดังนี้

$$Y = -4.914 + 3.051X_4 + 0.076X_1$$

6. คะแนนเฉลี่ยของระดับความสามารถของการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู อยู่ในระดับต่ำ

7. คะแนนเฉลี่ยอัตมโนทัศน์โดยรวมของผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูอยู่ในระดับต่ำ

Thesis Title : A Study of The Relationship Between Self-Concept,
Selected Factors and Self-Care in Epileptic Patients

Author : Mrs. Ratana Maskasame

Degree : Master of Science (Nursing)

Department : Graduate Student in Medical-Surgical Nursing
Faculty of Nursing

Faculty : Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Advisors : Associate Professor Sompan Hinjiranan
Associate Professor Niphon Pongvarin
Assistant Professor Kaimook Wichiencharoen

Date of Graduation : 11 March 1985

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between self-concept, selected factors and self-care in epileptic patients. The samples were 100 grand-mal type epileptic out patients, 50 of whom were male and 50 female, who recieved treatment at neurological clinics of Siriraj, Ramathibodi and Neurological Institute hospitals.

Tools for the study were interviews and questionnaires. The interviews questionnaires were for biographical data and for the evaluation of self-care performance. The questionnaires concerned Tennessee self-concept scale. Data were analysed by the determination of

arithmetic means, standard deviations, Pearson's product moment correlation coefficient, multiple correlation coefficient, and the stepwise multiple regression analysis.

Results

1. Except for self-criticism, there was a positive relationship between the total self-concept score (identity, self-satisfaction, behavior, physical self, moral-ethical-self, personal self, family self and social self) and self-care performance in epileptic patients and was significant at the .01 level.
2. There was a negative relationship between the frequency of convulsion and self-care performance in epileptic patients and was significant at .01 level.
3. There was no relationship between the difference in the duration of convulsion and self care performance in epileptic patients.
4. There was a positive Relationship between the economic status and self-care performance in epileptic patients and was significant at .01 level.
5. The multiple correlation coefficient between self-care performance and four predictors ; ie. self-concept (X_1), frequency of convulsion (X_2), differences in the duration of convulsion (X_3) and economic status (X_4) had been analysed. The result of the

multiple correlation coefficient between those four predictors and self-care performance in epileptic patients was significant at .01 level. The better predictors were economic status and self concept which accounted for 78.64 percent of variance in self-care ability. The regression equations respectively in raw scores were :

$$Y = - 4.914 + 3.051 X_4 + 0.076 X_1$$

6. The mean score of self-care performance in epileptic patients was at the low level.

7. The mean score of self-concept in epileptic patients was at the low level.