



ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  
Patients' Pre-operative Anxiety and Information Needs



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2534

ISBN 974-586-998-8

สงวนลิขสิทธิ์

ชื่อวิทยานิพนธ์	ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ผู้วิจัย	ชนิษฐา นาคะ
ปริญญา	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	สุภาณี วคินอมร, วท.บ.(พยาบาล), M.S. เยาวลักษณ์ เลาะห์จินดา, วท.บ.(พยาบาล), ค.ม.(บริหารการพยาบาล)
วันที่สำเร็จการศึกษา	5 มีนาคม พ.ศ. 2534

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณศีรษะและคอ ช่องท้อง และอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ในโรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน 120 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ความวิตกกังวลวัดโดยแบบประเมินความวิตกกังวลแฝง และความวิตกกังวลขณะเผชิญของสไปล์เบอร์เกอร์และคณะ (1970) ความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดวัดโดยแบบประเมินความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยผลการวิจัยของดอดจ์ (1969) และเพ็ญเตอร์ (1974)

ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมีความวิตกกังวลแฝงและความวิตกกังวลขณะเผชิญก่อนผ่าตัดในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ แต่มีความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดในระดับสูง ความวิตกกังวลแฝงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความวิตกกังวลขณะเผชิญ ความวิตกกังวลแฝงมีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด แต่ความวิตกกังวลขณะเผชิญไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีเพศ อายุ และการศึกษาแตกต่างกัน มีความวิตกกังวลแฝงและความวิตกกังวลขณะเผชิญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความวิตกกังวลแฝงและความวิตกกังวลขณะเผชิญมากกว่าเพศชาย ผู้ป่วยที่มีอายุ 21-40 ปี มีความวิตกกังวลแฝง และความวิตกกังวลขณะเผชิญมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 61-80 ปี และผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีความวิตกกังวลแฝงมากกว่าผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และพบว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง มีความวิตกกังวลแฝงมากกว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดบริเวณช่องท้องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผู้ป่วยที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วย ประสบการณ์ผ่าตัดที่เคยได้รับ และการวินิจฉัยโรคแตกต่างกัน มีความวิตกกังวลแฝง และความวิตกกังวล

ขณะเผชิญไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในเรื่องความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มีความต้องการข้อมูลมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผู้ป่วยที่มีเพศ อายุ การศึกษา ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วย ประสบการณ์ผ่าตัดที่เคยได้รับ และบริเวณผ่าตัดแตกต่างกัน มีความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการมากเป็นอันดับหนึ่งคือ หมดการให้ยาสภาพ





different in trait and state anxiety. Female had higher trait and state anxiety than male. Patients whose age between 21-40 years had higher trait and state anxiety than those at the age 61-80 years. But those who had only elementary education or lower had higher trait anxiety than those who had higher education. And those who had surgery of the female-reproductive organs also had significantly higher trait anxiety than those who had abdominal surgery. It was found that those who were differences in economic problems, previous surgical experiences and diagnosis had no significant difference in both trait and state anxiety. Pre-operative information needs among cancer patients was significant higher than non-cancer patients, but no significant differences were found among the patients who had difference in sex, age, educational level, economic problem, previous surgical experience, and operative site. The information concerning rehabilitation was needed the highest by the patients.