



๑๘ พ.ย. ๒๕๓๗

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารับการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดสิงห์บุรี

FACTORS RELATED TO REGULARITY OF ATTENDANCE TO
TREATMENT IN ESSENTIAL HYPERTENSIVE PATIENTS :
SINGBURI PROVINCE

ภ. แพทย์
จาก
“สิงห์บุรีวิทยานิติเวช”
๑. ๒๕๓๖

ศรีสตา วีระอากาศาไพบลย์
๑

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการระบาด

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๓๘

34450

ชื่อวิทยานิพนธ์	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารับการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ: จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้วิจัย	ศรียุตา วัชรอุภาไพบูลย์
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	พันธ์ทิพย์ รามสูต Dr.P.H. ดลิต สุจิรารัตน์ วท.ม. (ชีวสถิติ) รัตนชัย จุลเนตร พ.บ., สม.
วันที่สำเร็จการศึกษา	10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

บทคัดย่อ

การศึกษาแบบ Case-Control Study มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารับการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่มารับการรักษาที่คลินิกความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาสมาเสมอ 120 ราย และผู้ป่วยที่มารับการรักษาไม่สม่ำเสมอ 120 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Multiple Logistic Regression Analysis ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการดูแลสุขภาพตนเอง การรับรู้ถึงอุปสรรคในการรักษา และความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาของผู้ป่วย โดยร้อยละ 75.15 ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาสมาเสมอ จะมีการดูแลสุขภาพตนเองดี รับรู้ว่ามีอุปสรรคในการรักษา และมีความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงในระดับสูง

Thesis Title Factors Related to Regularity of Attendance
to Treatment in Essential Hypertensive
Patients : Singburi Province

Name Srisuda Watcharaarpibul

Degree Master of science (Epidemiology)

Thesis Supervisory Committee

 Pantyp Ramasoota B.S., M.P.H., Dr.P.H.
 Dusit Sujirarat M.Sc. (Biostat)
 Ratranachai Junranatr M.Sc.

Date of Graduation 10 February B.E. 2538 (1995)

ABSTRACT

A Case-Control Study was conducted to identify factors related to regularity of attendance to treatment, among essential hypertensive patients, in 6 hospitals of Singburi Province. The cases were 120 regular attendant and controls were 120 irregular attendant. Data were collected by structured interview using questionnaire. Multiple Logistic Regression was used for conclusive analysis. The results revealed that self-care factors, perception of less barrier, and knowledge of hypertension were related to regularity of attendance to treatment. 75.15 % of regular attendants were those with good level of self-care, perceived less barrier and had good level of knowledge on hypertension.