



610892722

พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนหญิงโสด
ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2541

ISBN 974-661-157-7

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

3836097 RAHP/M : สาขาวิชา : การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร : วท.ม (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร)

: พฤติกรรมทางเพศ / การมีเพศสัมพันธ์ / เยาวชน

ขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์ : พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนหญิงโสด ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี (Sexual behavior and factors predicting coitus among single female youth of Udonthani Provincial Non-Formal Education Centre
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ประทีภัส โอประเสริฐสวัสดิ์, พ.บ., ว.ว.(สูติ-นรีเวช), Dip in Clin Epidemiology. สุวัชัย อินทรประเสริฐ, พ.บ., ว.ว.(สูติ-นรีเวช), Dip in Clin Pop Growth Studies. สุมาลี สิงหนิยม, วท.ม.(ชีวสถิติ). 152 หน้า. ISBN 974-661-157-7.

วัยรุ่นเป็นช่วงสำคัญวัยหนึ่งของชีวิต เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประกอบกับวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเพศ ดังที่พบว่าวัยรุ่นบางส่วนมีการร่วมเพศก่อนเวลาอันสมควร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา การทำแท้งและการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการร่วมเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับการร่วมเพศ และปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายการร่วมเพศของเยาวชนหญิงโสด เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาหญิงอายุ 15-24 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ และเรียนแบบทางไกล ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 433 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2541 โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test และ Stepwise multiple regression analysis

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยร่วมเพศร้อยละ 25.4 อายุเฉลี่ยของการร่วมเพศครั้งแรก คือ 17.27 ปี คู่ร่วมเพศส่วนใหญ่เป็นคู่อริก จำนวนคู่อริก 1-2 คน ความถี่ของการร่วมเพศเป็นครั้งคราว (1-2 ครั้งต่อเดือน) และยังคงพบว่าการร่วมเพศที่เฉลี่ยร้อยละ 29.1 เคยตั้งครรภ์ ซึ่งในกลุ่มตั้งครรภ์ร้อยละ 65.5 เคยทำแท้ง สำหรับการคุมกำเนิดส่วนใหญ่ใช้เป็นบางครั้ง เหตุผลที่ไม่ใช้เพราะคิดว่าเป็นช่วงที่ปลอดภัยไม่ทำให้ตั้งครรภ์ วิธีการคุมกำเนิดที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ ถุงยางอนามัย ซึ่งใช้เป็นบางครั้ง จึงพบว่าร้อยละ 25.5 ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยร่วมเพศเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองพบว่า ร้อยละ 31.2 เคยสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง โดยความถี่ของการกระทำนานๆ ครั้ง (น้อยกว่าเดือนละครั้ง)

สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการร่วมเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ทักษะคิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ที่พักอาศัย ความมีอิสระในการออกจากที่พักอาศัย การมีคู่อริก การดื่มสุรา การใช้สื่อปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ การมีเพื่อนสนิทที่เคยร่วมเพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา และการปรึกษาปัญหากับครอบครัว

เมื่อทดสอบการวิเคราะห์พหุแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายการร่วมเพศของเยาวชนหญิงโสดในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ที่พักอาศัย การมีคู่อริก การมีเพื่อนสนิทที่เคยร่วมเพศ ทักษะคิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การดื่มสุรา อายุ และ ความมีอิสระในการออกจากที่พักอาศัย ซึ่งทำนายการร่วมเพศของเยาวชนหญิงได้ร้อยละ 29.2

3836097 RAHP/M : MAJOR : HUMAN REPRODUCTION AND POPULATION PLANNING
: M.SC (HUMAN REPRODUCTION AND POPULATION PLANNING)
: SEXUAL BEHAVIOR / COITUS / YOUTH

KWANCHANOK SIRIWATTANAKAN : SEXUAL BEHAVIOR AND FACTORS
PREDICTING COITUS AMONG SINGLE FEMALE YOUTH OF UDONTHANI PROVINCIAL
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE. THESIS ADVISOR : PRATAK O- PRASERTSAWAT,
M.D., THAI BOARD OF OB & GYN, DIP IN CLIN EPIDEMIOLOGY, SUWACHAI
INTARAPRASERT, M.D., THAI BOARD OF OB & GYN, DIP IN POP GROWTH STUDIES,
SUMALEE SINGHANIYOM, M.SC. (BIOSTATISTICS). 152 P. ISBN 974-661-157-7

Adolescence is the important period in the life which is characterized by changing physical, emotion and social demands. Adolescence is a period of curiosity, especially sexual, and therefore there are consequens of coitus at an inappropriate age, for example, unwanted pregnancy, abortion and sexually transmitted diseases.

The objectives of this survey research are to study coital behavior and the relationship of predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors and factors predicting coitus among single female youth of Udonthani Provincial Non-Formal Education centre. Purposive sampling technique was performed to select 433 female students with age of 15-24 years who were studying in secondary school and self-studying at Udonthani Provincial Non-Formal Education centre. The data was collected during Febuary 1st-28th, 1998 by using a self-administered questionnaire and analyzed by percentage, mean, standard deviation, Chi-square test and stepwise multiple regression.

The results show that 25.4% of female youth had coitus. The mean age at first coitus was 17.27 years old. Most of the partners were boyfriends and the number of partners were 1-2. The frequency of coitus was 1-2 times per month. 29.1% of female youth who had coitus got pregnant, and 65.5% of these had an abortion. Contraception was occasionally used and a non-use reason was safe period. Condom was used as the contraceptive of choice. The findings showed that the partners occasionally used condom. 25.5% of female youth who had coitus were infected with sexually transmitted diseases. 31.2% of female youth masturbated with frequency of less than once a month.

Factors which were significantly associated with coitus were age, knowledge about AIDS, attitude toward sexuality, place of residence, freedom, having boyfriend, alcohol use, exposure to pornography, going to entertainment places, having close friends who had coitus, marriage status of parents and family relationship.

Using stepwise multiple regression analysis, predictable factors of coitus among single female youth of Udonthani Provincial Non-Formal Education Centre were place of residence, having boyfriend, having close friends who had coitus, attitude towards sexuality, knowledge about AIDS, alcohol used, age and freedom which had the ability to predict 29.2% of coital rate.