

22 JUL 2002



**MARITAL RELATIONSHIP AND GRIEF OF WOMEN  
PREGNANCY LOSS**

**PRAPASRI BENCHASIRILUCK**

๒

ฉบับนี้เป็นการ

จาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS FOR  
THE DEGREE OF MASTER OF NURSING SCIENCE  
(MATERNAL AND CHILD NURSING)  
FACULTY OF GRADUATE STUDIES  
MAHIDOL UNIVERSITY**

**2002**

**ISBN 974-04-1725-6**

**COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY**

TH  
P899m  
2002  
C.2

4137037 NSMC/M : MAJOR: MATERNAL AND CHILD NURSING; M.N.S.  
(MATERNAL AND CHILD NURSING)

KEY WORDS : MARITAL RELATIONSHIP/ GRIEF/ WOMEN  
PREGNANCY LOSS

PRAPASRI BENCHASIRILUCK : MARITAL RELATIONSHIP AND  
GRIEF OF WOMEN PREGNANCY LOSS. THESIS ADVISORS: YAOWALAK  
SERISATHIEN, D.N.S., SUPRANEE ATHASERI, M.Ed., ATIRAT  
WATTANAPAILIN, Ed.D. 98 P. ISBN 974 – 04 –1725 -6

Women grieve over pregnancy loss and as a result, this severe grief has great effects on pregnant women's physical, psychological and family dimensions. This study was a descriptive research to study the grief of women over pregnancy loss and to determine the predictive power of predictor variables such as marital relationship, age, gestational age, intention to become pregnant and relatives visiting to predict grief of women over pregnancy loss. The sample consisted of 170 women who had lost a pregnancy and who were admitted at Obstetrics and Gynecology wards of Siriraj Hospital, Police's General Hospital, Rhajavithi Hospital, B.N.A. Medical College and Vajira Hospital, and Samutsakorn Hospital. The data were collected using three questionnaires which included demographic data, marital relationship and grief of women over pregnancy loss. Data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.

The findings of this study showed that marital relationship, overall and in each aspect, was at a rather good level and there was a moderate level of grief overall. However, the aspects level, except the existential concern aspect, were at a rather low level. Five influential factors on grief, marital relationship, age, gestational age, intention to become pregnant and relatives visiting, could not predict the grief of women over pregnancy loss.

The results suggested that, although the grief of women over pregnancy loss was at a moderate level in this study, nurses who work in the delivery unit and postpartum unit should be given the nursing care for dealing with their grief and helping women could appropriately cope with this grief.

4137037 NSMC/M: สาขาวิชา: การพยาบาลแม่และเด็ก; พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)

ประกาศี เบนจิสริลักษณ์ : สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและความเศร้าโศกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตร (MARITAL RELATIONSHIP AND GRIEF OF WOMEN PREGNANCY LOSS) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: เขวาลักษณ์ เสรีเสถียร, พย.ค., สุปราณี อัทธเสรี, ค.ม., อติรัตน์ วัฒนไพลิน , กศ.ด. 98 หน้า. ISBN 974-04-1725-6

ความเศร้าโศกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตร จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความเศร้าโศกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตรและศึกษาอำนาจการทำนายของสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส อายุ อายุครรภ์ การมาเยี่ยมของญาติ และความตั้งใจในการตั้งครรภ์ ที่มีต่อความเศร้าโศกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตร กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตร ที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยสูติกรรมและนรีเวชของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 170 ราย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และแบบสอบถามความเศร้าโศกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างดี และมีความเศร้าโศกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความกังวลใจในการดำเนินชีวิต อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส อายุ อายุครรภ์ การมาเยี่ยมของญาติ และความตั้งใจในการตั้งครรภ์ ไม่สามารถร่วมทำนายความเศร้าโศกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตรได้

ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ถึงแม้ว่าผลการศึกษานี้ระดับความเศร้าโศกจะอยู่ในระดับปานกลาง พยาบาลทั้งในหน่วยห้องคลอด และหน่วยหลังคลอด ก็ควรให้การพยาบาลเพื่อลดความเศร้าโศก และให้หญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียบุตรสามารถปรับตัวเผชิญกับความเศร้าโศกได้อย่างเหมาะสมต่อไป