

11 JUL 2000



**NEEDS AND RESPONSE TO NEEDS OF FAMILY MEMBERS  
OF CRITICALLY ILL PATIENTS**

**MONTHIP PATITAS**

๔

อภิวัฒน์ ทนถาวร

จาก

มือต่อกรทอกลีฬ ม.มหิดล

**THE THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENTS FOR  
THE DEGREE OF MASTER OF NURSING SCIENCE  
(ADULT NURSING)  
FACULTY OF GRADUATE STUDIES  
MAHIDOL UNIVERSITY**

2000

ISBN 974 - 663 - 969 - 2

**COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY**

TH  
M 7897  
2000

Copyright by Mahidol University

44607 e.๔

4137085 NSAN/M : MAJOR : ADULT NURSING; M.N.S.(ADULT NURSING)

KEY WORDS : NEED / RESPONSE TO NEED / FAMILY MEMBERS /  
CRITICALLY ILL PATIENTS

MONTHIP PATTAS : NEEDS AND RESPONSE TO NEEDS OF FAMILY  
MEMBERS OF CRITICALLY ILL PATIENTS. THEMATIC PAPER ADVISORS :  
SOMPAN HINJIRANAN, M.S., MAYUREE KAEWCHANTR, M.Sc., 70 P.  
ISBN 974-663-969-2

The purposes of this descriptive study were to find out needs and response to needs of family members of critically ill patients and who responds to the needs of these family members. The study was conducted in the Medical and Surgical Intensive Care unit at Thammasart Chalermprakiat Hospital during the period of December, 1999 to March, 2000. The 50 purposive samples of family members consisted of father / mother / spouse / children of the critically ill patients. The questionnaire was outlined to serve the purpose of this study by applying knowledge from the related literature and Molter's Critical Care Family Need Inventory (CCFNI). Their reliability was tested by Cronbach's Alpha Coefficient which was 0.76. The data were analyzed by computer using the SPSS / PC.

The results of this study showed the most important needs were to release anxiety, secondly to obtain information, and personal needs were the least important need. Firstly most of the needs that were responded to of that the family members of critically ill patients were the need to release anxiety, secondly, the need of information and the least were personal needs. Persons who mostly responded to the needs of family members of critically ill patients' were nurses (88%). The investigator recommends that nurses use results of this study as a guideline to fully respond to the real needs of the family members of critically ill patients' especially the need to release anxiety, need of information, and need to be with the patients and participate in caring for the patient. Lastly the nurses should have a care plan according to the real needs required by the family members of critically ill patients.

4137085 NSAN/M : สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่; พช.ม (การพยาบาลผู้ใหญ่)

มณฑิพย์ ปฏิทัศน์ : ความต้องการและการได้รับการตอบสนองของญาติในผู้ป่วยวิกฤต (NEEDS AND RESPONSE TO NEEDS OF FAMILY MEMBERS OF CRITICALLY ILL PATIENTS). คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ : สมพันธ์ หิญชีระนันท์ M.S, มชรี แก้วจันทร์, พช.ม., 70 หน้า ISBN 974 – 663 – 969 – 2

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความต้องการ ของญาติผู้ป่วยวิกฤต การตอบสนองความต้องการและบุคคลที่ตอบสนองความต้องการ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุกรรม และศัลยกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเป็น บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร จำนวน 50 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยศึกษาจากร วมคดีที่เกี่ยวข้องและ ประชูดเครื่องมือวัดความต้องการของญาติผู้ป่วยของมอลเตอร์ นำไปหา ความเที่ยงของเครื่องมือด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.76 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / PC

ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการรายด้านที่ญาติมีความต้องการมากที่สุดคือ ความต้องการลด ความวิตกกังวล รองลงมาคือ ความต้องการข้อมูล ส่วนความต้องการที่ญาติต้องการน้อยที่สุดคือ ความต้องการส่วนบุคคล ส่วนความต้องการที่ญาติได้รับการตอบสนองมากที่สุดคือ ความต้องการ ลดความวิตกกังวล รองลงมาคือ ความต้องการข้อมูล และส่วนที่ได้รับการตอบสนองน้อยที่สุดคือ ความต้องการส่วนบุคคล บุคคลที่ตอบสนองความต้องการของญาติมากที่สุดคือ พยาบาล ร้อยละ 88 ผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ ของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤต ได้ตรงกับความต้องการจริง