



31 OCT 2002



**WOMEN'S CARING NEEDS AND NURSING CARE RESPONDING
TO THE NEEDS DURING LABOR
AT CHAROENKRUNG PRAJARAK HOSPITAL**

JINDAWAN BUNGTHIANG

๙



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF NURSING SCIENCE
(MATERNAL AND CHILD NURSING)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

2002

ISBN 974-04-2115-6

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

TH
J61M
2002
C.2

Copyright by Mahidol University

4237274 NSMC/M: MAJOR: MATERNAL AND CHILD NURSING; M.S.N.

(MATERNAL AND CHILD NURSING)

KEYWORDS : CARING NEEDS / NURSING CARE / DURING LABOR

JINDAWAN BUNGTHIANG: WOMEN'S CARING NEEDS AND NURSING CARE RESPONDING TO THE NEEDS DURING LABOR AT CHAROENKRUNG PRAJARAK HOSPITAL. THESIS ADVISORS: SUPRANEE ATHASERI, M.Ed., YUPIN CHANDARAGGA, M.Ed., YAOWALAK SERISATHIEN, D.N.S., 111 P.
ISBN 974-04-2115-6

Childbirth is traditionally recognized as a period of physical and emotional stress. Generally, the woman should have her needs met for help and care, which enables her to cope with and to complete the labor and the birth successfully. That is, the woman experiences the childbirth as a meaningful event, which can potentially lead to more positive effects on the woman, herself, and the baby. The purpose of this study was to explore the needs of labor nursing care and the nursing care response to those needs. The sample was 400 postpartal women, recruited from Charoenkrung Prajarak Hospital. The instrument, 'The care needs and nursing care response to those needs during labor' was designed by the researcher. Data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.

The results revealed that the care needs were at a fairly high level, as well as the nursing care response being at a fairly good level. However, the women's care needs were higher than the nursing care response to the needs ($p < .001$). Furthermore, the primiparas had greater care needs than the multiparas. The women who were younger than 20 years old, and those 20 – 29 years old, possessed higher labor care needs than those older or equal to 30 years old ($p < .05$). The women who had a vocational/university degree and secondary education possessed higher care needs than those who had only completed primary school or had no formal education ($p < .05$).

The results suggested that the labor nurses should enhance the nursing care response to the women's needs. Moreover, the labor nurses should provide care, by taking the personal factors of the women into consideration in order to meet their needs.

4237274 NSMC / M: สาขาวิชา: การพยาบาลแม่และเด็ก; พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)

จินดาวรรณ บุ่งเที่ยง: ความต้องการการดูแลและการได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองตามความต้องการในระยะคลอด ของผู้คลอด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (WOMEN'S CARING NEEDS AND NURSING CARE RESPONDING TO THE NEEDS DURING LABOR AT CHAROENKRUNG PRAJARAK HOSPITAL) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: สุปราณี อัทธเสรี, ค.ม., ยุพิน จันทรัคคะ, ค.ม., เขียวลักษณ์ เสรีเสถียร, พย.ค. 111 หน้า. ISBN 974-04-2115-6

การคลอดเป็นสถานการณ์ที่มีความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตอารมณ์ ผู้คลอดย่อมต้องการการดูแลช่วยเหลือจากพยาบาล เพื่อให้สามารถเผชิญและผ่านพ้นการคลอดไปได้ด้วยดี ทำให้การคลอดเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิต อันจะเป็นผลดีต่อทั้งมารดาและทารกต่อไป การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความต้องการการดูแลในระยะคลอด และการได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองตามความต้องการดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงหลังคลอดของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ความต้องการการดูแล และการได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองตามความต้องการในระยะคลอด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย พบว่า ผู้คลอดมีความต้องการการดูแลในระยะคลอดในระดับค่อนข้างมาก และได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองตามความต้องการในระดับค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ความต้องการการดูแลในระยะคลอดมีมากกว่าการได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองตามความต้องการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้คลอดที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง อายุ การศึกษา และการมีประสบการณ์การคลอด มีความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้คลอดครั้งแรกมีความต้องการการดูแลสูงกว่าครั้งหลัง ($p < .001$) ผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 – 29 ปี มีความต้องการการดูแลสูงกว่าผู้คลอดที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ($p < .05$) ผู้คลอดที่มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือปริญญา และระดับมัธยมศึกษา มีความต้องการการดูแลสูงกว่าระดับประถมศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา ($p < .05$)

ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า พยาบาลห้องคลอดควรเอาใจใส่และให้การพยาบาลตอบสนองความต้องการของผู้คลอดให้มากขึ้น ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้คลอดซึ่งได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และการมีประสบการณ์การคลอด เพื่อให้ผู้คลอดได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ