




24 ธ.ค. 2538

ความวิตกกังวล ความต้องการ และการตอบสนองความต้องการที่ได้รับ  
ของญาติผู้ป่วยหนักในหน่วยบำบัดพิเศษ

ANXIETY, NEEDS AND RECEIPT OF NEEDS' RESPONSE  
OF CRITICALLY ILL FAMILIES



ลารีย์ บุญบรรทัดกุล

ได้รับรองการ  
จาก  
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2538

ISBN 974-588-123-6

สงวนลิขสิทธิ์

๑๙  
๐๖๖๒ค  
๘๕๓๘

Copyright by Mahidol University

36124

ชื่อวิทยานิพนธ์ ความวิตกกังวล ความต้องการ และการตอบสนองความต้องการที่ได้รับ  
 ของญาติผู้ป่วยหนักในหน่วยบำบัดพิเศษ  
 ผู้วิจัย อารีย์ บุญบรรรินทกุล  
 ปริญา พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
 เชาวลักษณ์ เลาะห์จินดา, วท.บ., ค.ม.  
 พรรณวดี พุทธิวัฒนะ, วท.บ., วท.ม.  
 วันที่สำเร็จการศึกษา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความวิตกกังวล ความต้องการ และการตอบสนองความต้องการที่ญาติผู้ป่วยหนักในหน่วยบำบัดพิเศษได้รับ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการเกิดภาวะวิกฤตของอควิลล่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นญาติของผู้ป่วยหนักที่ เข้ารับการรักษาในหน่วยบำบัดพิเศษศัลยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา- วิทยาลัยมหิดล โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 90 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดความวิตกกังวลของสไปล์เบอร์เจอร์ ซึ่งแปลเป็นไทยโดย รอง ศาสตราจารย์แพทย์หญิง นิตยา ศุภภัคคี และคณะ ทดสอบความสอดคล้องภายในโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.88 และแบบสำรวจความต้องการและการตอบสนอง ที่ญาติได้รับตัดแปลงมาจากแบบสอบถามของมอลเตอร์ ซึ่งแปลโดยสุไรพร พงษ์พัฒนาภูมิ ได้รับ การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล ทดสอบความสอดคล้องภายใน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.94 และ 0.92

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลค่อนข้างสูงได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 59.69 และความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ความต้องการกับการตอบสนองที่ญาติได้รับ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ความต้องการรายด้านที่ญาติให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ลดความวิตกกังวล รองลงมาคือต้องการ ข้อมูล ส่วนด้านที่ต้องการน้อยที่สุดคือ กำลังใจและระบายความรู้สึก และพบว่าความต้องการ ของญาติที่มีบทบาทความสัมพันธ์เป็น บิดามารดา คู่สมรส และบุตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ .05 ความต้องการด้านที่ญาติได้รับการตอบสนองมากที่สุดคือ ลดความวิตกกังวล รองลงมาคือ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย ความต้องการด้านที่ได้รับการตอบสนองน้อยที่สุดคือ กำลังใจและระบายความรู้สึก ผลการศึกษาที่ได้ ช่วยให้เห็นแนวทางในการให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤต ได้ตรงกับความต้องการจริงและเพียงพอต่อไป



Thesis Title            Anxiety, Need and Receipt of Needs' Response of  
Critically Ill Families

Name                     Aree Boonbarwornrattanakul

Degree                    Master of Nursing Science (Adult Nursing)

Thesis Supervisory Committee

                              Yauwaluk Lauhachinda, B. Sc.(Nursing), M. Ed.  
                              Panwadee Putwatana, B.Sc. (Nursing), M.S. (Trop. Med.)

Date of Graduation    19 May B.E. 2538 (1995)

### Abstract

The purpose of this descriptive research was to determine the level of anxiety, needs and receipt of needs' response of the critically ill families. The conceptual framework for this study is Aguilera's Crisis Theory. The study was conducted in the surgical intensive care unit of Ramathibodi hospital, during the period of December 1994 to February 1995. Ninety purposive samples consisted of parents, spouses, and children of the critically ill patients. Anxiety level was measured by the State-Trait Anxiety Inventory form X-1 developed by Spielberger. The reliability, tested by Cronbach alpha coefficient was .88. The needs and the receipt of needs' response were assessed by The Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) developed by Molter. Content validity was established by submitting the questionnaire to three clinical nursing expertists. Their reliability tested by Cronbach alpha coefficient were .94 and .92 respectively.

The result of the study show that the anxiety level of the critically ill families was high ( $M = 59.69 \pm 9.52$ ) and was significantly positive related with needs ( $p < .01$ ). The parents, spouses and children reported no significant differences for all six

categories of needs. The most important needs was to reduce anxiety, the secondly was to obtain information, and the least important need was the for support and ventilation. The most of the receipt of needs response was to be helpful to the patient and the least was support and ventilation. The result of this study can guide the nurse to provide the care plan for the critically ill families to meet their real needs.

